

ZW  
12

# Beiheft 7

Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen  
in Zeitschriften des

Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe  
(ehem. Badische Landessammlungen für Naturkunde)

1936 - 1997

zusammengestellt von DAGMAR ANSTETT

OZB  
20  
Bei  
1999  
7

# Carolinea

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 16.3.1999

# Beiheft 7

Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen  
in Zeitschriften des

Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe  
(ehem. Badische Landessammlungen für Naturkunde)

1936 - 1997

zusammengestellt von DAGMAR ANSTETT

# carolinea

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

16.3.1999

# Beiheft 7

Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen  
in Zeitschriften des

Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe  
(ehem. Badische Landessammlungen für Naturkunde)

1936 - 1997

zusammengestellt von **DAGMAR ANSTETT**

# carolinea

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

16.3.1999

---

carolinea, Beiheft 7	119 S.	Karlsruhe, 16. 3. 1999
----------------------	--------	------------------------

BIO I 90.128/Beiheft 7

Inw. 1999/10.221

ISSN 0176-4004

Herausgeber: Prof. Dr. SIEGFRIED RIETSCHEL,  
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe  
Dr. ELSA NICKEL, Bezirksstelle für Naturschutz und  
Landschaftspflege Karlsruhe  
Prof. Dr. GEORG PHILIPPI, Naturwissenschaftlicher  
Verein Karlsruhe  
Schriftleitung des Hefes: Prof. Dr. LUDWIG BECK,  
Dipl. Biol. MONIKA BRAUN, Dr. HANS-WALTER MITTMANN

Gesamtherstellung: Heinz W. Holler,  
Druckerei und Verlag GmbH, Karlsruhe  
© Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe



**Inhalt**

Vorwort .....5

Einleitung .....7

1. Verzeichnis der Zeitschriften .....9

2. Verzeichnis der Veröffentlichungen in Zeitschriften nach Verfassern .....13

3. Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Sachgebieten .....66

- Astronomie, Meteorologie, Klimatologie.....66
- Allgemeine Biologie, Phylogenie.....66
- Botanik.....66
  - Floristik und Systematik.....66
  - Algen.....66
  - Pilze.....66
  - Flechten.....67
  - Moose.....67
  - Gefäßpflanzen.....68
- Vegetationskunde.....69
  - Allgemeines und Kartierung.....69
  - Gebietsmonographien.....70
  - Vegetationskarten.....70
  - Wasser- und Ufervegetation.....70
  - Moore und Niedermoore.....71
  - Trockenrasen.....71
  - Grünlandgesellschaften.....71
  - Ruderal- und Ackervegetation.....72
  - Wälder und Gebüsche.....72
  - Alpine Vegetation.....73
  - Kryptogamengesellschaften.....73
  - Übrige Pflanzengesellschaften.....73
- Floren- und Vegetationsgeschichte.....74
- Allgemeine Botanik.....74
- Geowissenschaften.....74
  - Geomorphologie, Tektonik, Vulkanismus...74
  - Geophysik und Erdbebenwarte Karlsruhe.74
- Paläontologie.....75
  - Fossile Vertebrata.....75
  - Fossile Invertebrata.....75
  - Paläobotanik.....76
- Südwestdeutsche Fossilfundstätten.....76
  - Fossilfundstätten Öhningen und Höwenegg.....77
  - Fossilfundstätte Messel.....77
- Stratigraphie.....77
- Mineralogie und Bodenschätze.....77
- Zoologie.....78
  - Tiergruppen.....78
    - Vertebrata: mehrere Gruppen.....78
    - Mammalia.....78
    - Aves.....78
    - Amphibia, Reptilia, Pisces.....79

- Invertebrata: mehrere Gruppen .....79
- Arthropoda: mehrere Gruppen.....79
- Insecta: Allgemeines und mehrere Gruppen.....79
  - Insecta: Apterygota.....79
  - Insecta: Coleoptera.....79
  - Insecta: Diptera.....80
  - Insecta: Heteroptera.....81
  - Insecta: Hymenoptera.....81
  - Insecta: Lepidoptera.....82
  - Insecta: Odonata.....85
  - Insecta: Orthoptera.....85
  - Insecta: Neuroptera.....85
  - Insecta: Trichoptera.....85
  - Insecta: übrige Gruppen.....85
- Crustacea: Allgemeines und mehrere Gruppen.....86
  - Crustacea: Phyllopora.....86
  - Crustacea: Ostracoda.....86
  - Crustacea: Copepoda.....86
  - Crustacea: Malacostraca.....86
- Arachnida: Araneae.....87
- Arachnida: Opiliones.....87
- Arachnida: Pseudoscorpiones.....87
- Arachnida: Acari.....87
- Myriapoda.....88
- Annelida.....88
- Mollusca.....88
- Nemathelminthes: Nematoda.....88
- Nemathelminthes: Rotatoria.....88
- Plathelminthes: Turbellaria.....89
- Coelenterata: Hydrozoa.....89
- Limnologie.....89
- Terrestrische Ökologie und Biologie der Tiere.....90
- Bodenbiologische Untersuchungen im „Stadtwald Ettlingen“ (Schlüttenbach).....92
- Hydrologie.....93
- Landeskunde.....93
- Vor- und Frühgeschichte.....93
- Natur- und Umweltschutz.....93
- Medizin.....94
- Reiseberichte.....94

4. Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Regionen.....95

- Südwestdeutschland insgesamt.....95
  - Oberrheingebiet.....97
  - Bodenseegebiet mit Alpenvorland und Hegau.....102
  - Schwarzwald.....103
  - Vogesen und Pfälzer Wald.....105
  - Kraichgau und Neckarland.....105
  - Baar-Wutach-Gebiet.....106
  - Odenwald mit Bauland und Taubergebiet.....106

Schwäbische Alb.....	107
Nordbaden .....	107
Baden.....	108
Alpen.....	108
Süddeutschland .....	108
Mitteleuropa .....	108
Südeuropa .....	109
Übriges Europa .....	110
Holarktis, Paläarktis .....	110
Asien.....	110
Vorderasien.....	110
Iran.....	111
Afghanistan .....	111
Südostasien .....	113
Afrika.....	113
Kanaren und Kapverden .....	113
Nordamerika .....	113
Südamerika.....	113
Tropen allgemein.....	114
5. Biographisches, Nachrufe .....	115
6. Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe ...	116
Geschichte .....	116
Berichte.....	116
Bibliothek .....	116
Sammlungen.....	116
Ausstellungen und Vivarium.....	117
Museales.....	117
7. Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe.....	118
Geschichte .....	118
Berichte der Arbeitsgruppen .....	118
8. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschafts- pflege Karlsruhe .....	119
9. Museumsführer und sonstige Schriften des Museums.....	119
Führer zu Ausstellungen - Museum am Friedrichsplatz.....	118
Geschichte .....	118

## Vorwort

Naturkundemuseen befinden sich in vielerlei Hinsicht noch auf der merkantilen Stufe des Tauschhandels. Das zeigt sich nicht nur beim gegenseitigen Austausch von Wissen, wissenschaftlichen Ergebnissen und Sonderdrucken zwischen den Wissenschaftlern. Es zeigt sich auch hinsichtlich der Veröffentlichungen der Museen. Diese kommen nur selten in den Buch- und Zeitschriftenhandel, spielen aber eine bedeutende Rolle im Tauschverkehr zwischen den Institutionen. Die „Tauschzeitschriften“ sind Fachzeitschriften, deren Inhalte und Ansprüche sich zwischen streng wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Aufsätzen bewegen. Neue Forschungsergebnisse sind in ihnen ebenso zu finden wie scheinbar banale Aufzeichnungen beiläufiger Beobachtungen, wissenschaftliche Leitartikel ebenso wie populär aufgemachte Wissensvermittlung. Bei meist nur kleiner Auflage weisen die Zeitschriften somit inhaltlich eine sehr große Breite auf. Sie haben keine spezielle Zielgruppe, sondern eine Vielfalt von Adressaten, sind gleichzeitig Berichts- und Mitteilungsorgan des Museums und seiner Mitarbeiter. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht ein Satz, der zwischen 1936 und 1944 in den „Richtlinien für die Verfasser“ steht. Er beginnt: „Die einzelnen Arbeiten - es werden im allgemeinen nur solche von Beziehern der Zeitschrift angenommen - sollen“

Die wissenschaftliche Bedeutung der Tauschzeitschriften der Museen ist weniger im einzelnen Heft oder Band begründet; sie ergibt sich erst durch die Kontinuität, mit der sich durch die Jahrgänge hindurch thematische Schwerpunkte herauskristallisieren sowie durch den zeitlichen Abstand, der viele der scheinbar beiläufigen Notizen früherer Jahre zu wichtigen Zeitdokumenten werden läßt.

Die geringe Auflage und das Verteilungsprinzip des Tauschweges bringen es mit sich, daß die Tauschzeitschriften zwar in vielen Museen und Instituten vorhanden, aber nicht in allen öffentlichen Bibliotheken zugänglich sind. Die inhaltliche Vielfalt mindert beim Fachpublikum gelegentlich auch die Bereitschaft, in älteren Heften und Bänden nach den langfristig wichtigen Informationen zu suchen, denn: „Was der Forscher nicht kennt, zitiert er nicht“ (alte Bauernweisheit). Deshalb ist es nicht nur hilfreich, sondern sogar notwendig, die Tauschzeitschriften in größeren Intervallen durch Verzeichnisse gut zu erschließen.

Dies geschieht hiermit für die 1936 erstmals erschienenen „Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland“. Sie wurden damals von den Badischen Landessammlungen für Naturkunde und der Landesnaturschutzstelle Karlsruhe herausgegeben; verlegt hat sie damals die „Macklotsche Druckerei und Verlag, Karlsruhe i.B.“

Sechs Jahrzehnte sind seit dem ersten Erscheinen der „Beiträge“ vergangen. Die Natur hat in Südwestdeutschland während dieses Zeitraumes einschneidende Veränderungen erfahren. Auch die Menschen, ihre Ein- und Ansichten, haben sich teilweise geändert. Viele Aufsätze und Bilder in den „Beiträgen“ dokumentieren dies. Aber das heißt nicht, daß die alten Beiträge deshalb zum alten Eisen gehören. Nicht die Patina der, auf inzwischen brüchigem Papier gedruckten, Aufzeichnungen macht sie für uns interessant, obwohl auch nostalgische Empfindungen das Blättern in alten Zeitschriften begleiten. Vielmehr sind manche Aufsätze heute aktueller als damals, als sie verfaßt wurden. Andere Aufsätze bilden wertvolle Dokumentationen zu den Veränderungen, die in Natur und Landschaft, bei Flora und Fauna in diesen 60 Jahren stattgefunden haben.

Wahrscheinlich können in vielen Fällen Autor/in und Zeitgenoss(in)en die langfristige Bedeutung einer Veröffentlichung gar nicht richtig einschätzen. Manches ist schneller „Schnee von gestern“ als man denkt, anderes steigt in seinem dokumentarischen Wert mit jeder

Pflanze, jedem Tier, jedem Steinbruch und jedem Biotop, die verschwinden; beiläufige Beschreibungen und Bilder werden zu Augenzeugenberichten über Vergangenes und Verlorenes. Manches wächst auch in seiner Bedeutung, wenn sich die Blickrichtung der Forschung wieder einmal dreht und Neuland sucht.

Die „Beiträge“ selbst, wie ihre Herausgeber, haben sich verändert, und das nicht nur vom Namen her. Seit 1982 steht „Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland“ nur noch im Untertitel - die Zeitschrift heißt nun „Carolinea“, benannt nach einer Pflanze (*Carolinea princeps* L. = *Pachira aquatica* AUBL. 1775), der LINNÉ 1781 diesen Namen zu Ehren der Markgräfin Caroline Luise gab. Auf das Naturalienkabinet der Caroline Luise von Baden geht das heutige Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zurück, das die Zeitschriften gemeinsam mit dem Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e.V. und der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe herausgibt. „Carolinea“ hat seit 1981 einen Bruder, „Andrias“, der das Erbe der zwischen 1972 und 1981 mit 4 Bänden erschienenen „Beihefte“ der „Beiträge“ fortführt. Sein Name erinnert an SCHEUCHZER's tertiären Riesensalamander, der als „homo diluvii testis“ in die Geschichte der Naturwissenschaft Einzug hielt. Das Museum besitzt einige der schönsten Exemplare vom vermeintlichen „Beingerüst des in der Sündfluth ertrunkenen Armen Sünders“. Eine neue Generation von Beiheften, die als „Beihefte zu Carolinea“ neue Aufgaben wahrnimmt, ist inzwischen herangewachsen. Indem sie dieses Gesamtverzeichnis aufnimmt, schließt sich ein Kreis.

Freilich erschließt das Gesamtverzeichnis 1936-1997 nur einen zeitlich begrenzten Wissensschatz, denn die „Beiträge“ hatten Vorfahren: Ab 1864 erschienen die „Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Carlsruhe“. Sie stellten 1935 mit dem 31. Band ihr Erscheinen ein, nicht ohne den Hinweis, daß sie 1936 durch die neu erscheinenden „Beiträge“ als Vereinszeitschrift fortgeführt werden. Welche finanziellen oder politischen Hintergründe dieser Wechsel hatte, wäre noch zu klären. Ebenso wäre es interessant zu wissen, warum in den Bänden VI (1941) und VII (1942) im Titel der Begriff „Südwestdeutschland“ in „Oberrheingebiet“ geändert wurde. War dies ein Vorbote jener politischen Entscheidungen, mit denen nicht nur Badens „Gauhauptstadt“ nach Straßburg gelegt, sondern auch das bereits ausgebombte Naturkundemuseum von Karlsruhe dorthin verbracht werden sollte? Jedenfalls war, nach 7jähriger Unterbrechung, ab Band VIII (1948/49) der alte Titel der nun im Selbstverlag erscheinenden Zeitschrift wieder gebräuchlich.

Der Wissensschatz, der in der in der Vorgängerzeitschrift während etwa 70 Jahren angewachsen ist, soll demnächst ebenfalls durch ein Gesamtverzeichnis erschlossen werden.

Mühevoll arbeitete an diesem Gesamtverzeichnis neben Frau Dipl.Bibl. Dagmar Anstett, insbesondere Dr. Hans Walter Mittmann und Prof. Dr. Ludwig Beck. Letzterer hat auch die Drucklegung besorgt und das Sachverzeichnis unter Mithilfe von Dipl.Biol. Monika Braun, Prof. Dr. Georg Philippi, Prof. Dr. Lászlo Trunkó, Dipl.Biol. Manfred Verhaagh und dem Herausgeber bearbeitet. Den Mitarbeitern, dem Verlag und der Druckerei gilt ein herzlicher Dank. Zwei Generationen von überwiegend regional tätigen, engagierten Forschern haben in den Zeitschriften des Karlsruher Naturkundemuseums wissenschaftliche Ergebnisse festgehalten. Vieles davon ist noch oder wieder aktuell. Es einem besseren Zugriff zu öffnen, ist die Aufgabe des Gesamtverzeichnisses 1939-1997, dem viele Nutznießer, weit über die Grenzen Südwestdeutschlands hinaus, zu wünschen sind.

## Einleitung

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe geht zurück auf die Gründung eines eigenständigen Naturalienkabinetts durch den Markgrafen und späteren Großherzog Karl Friedrich von Baden 1784/85. Seit dieser Zeit entwickelte es sich unter wechselnden Namen und auch verschiedener Trägerschaft zum heutigen Naturkundemuseum. In seiner Tradition als Schaumuseum fußt es wesentlich auf seinen wissenschaftlichen Sammlungen und ist zugleich ein Forschungsinstitut, an dem im Gesamtbereich der beschreibenden Naturwissenschaften wissenschaftlich gearbeitet wird.

Die wissenschaftliche Tätigkeit der Mitarbeiter des Museums fand seit 1861 ihren Niederschlag in der damals gegründeten eigenen Zeitschrift des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe mit dem Titel „Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe“

Die wissenschaftlich aktiven Mitglieder des Vereins gehörten anfangs überwiegend der damaligen Technischen Hochschule an. Nach und nach verschob sich die Gewichtung zwischen den Vereinsmitgliedern. Angehörige der Technischen Hochschule traten in den Hintergrund, Museumsmitarbeiter wurden zu den tragenden Personen des Vereins. Dies wird zum ersten Mal sichtbar in der Übernahme des Vereinsvorsitzes durch C. Hilger nach 1930.

In den Veröffentlichungen des Vereins und Museums wurden daraus die Konsequenzen gezogen und 1936 eine eigene Zeitschrift des Museums eingerichtet; gleichzeitig erlosch die Vereinszeitschrift. Die „Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland“ erschienen mit einem Jahresband, von Band 1 an in zwei Halbjahresheften bis zum Jahre 1942. Die Kriegs- und Nachkriegsereignisse ließen die weitere Herausgabe nicht zu. Erst im Jahre 1949 konnte die Zeitschrift mit dem Band 8 unter der Jahreszahl 1943/49 fortgeführt werden.

Sie erschien nun ab 1950 wieder regelmäßig mit einem Jahresband, der bis zu Band 30 (1971) noch in 2 Halbjahresheften ausgeliefert wurde; die Bände 19 (1961) und 26 (1967) wurden jeweils durch ein drittes Heft ergänzt, das sich in beiden Fällen mit den entomologischen Ausbeuten der Afghanistan-Expeditionen des Museums befaßt. Ab Band 31 (1972) bis heute erscheint jährlich ein geschlossener, nicht in Hefte unterteilter Band.

Im Jahre 1981 erhielt die Zeitschrift vor allem aus Gründen der leichteren Zitier- und Merkbarkeit einen kürzeren Titel, „carolinea“, benannt nach der maßgeblichen Förderin des ehemaligen Naturalienkabinetts, der Markgräfin Caroline Luise von Baden; der bisherige Titel „Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland“ wird seitdem als Untertitel aufgeführt. Um der Zeitschrift ein klares Profil zu geben, wurde dabei die Forschung über den Naturraum Südwestdeutschland in den Mittelpunkt gestellt und damit der Tendenz begegnet, die im Titel genannte „Forschung in Südwestdeutschland“ als Forschung, die *in* Südwestdeutschland stattfindet, zu interpretieren. Der Naturraum Südwestdeutschland wurde großzügig umgrenzt, so daß naturräumliche Einheiten wie der Oberrheingraben mit seinen angrenzenden Gebirgen, die Alb und der Fränkische Jura, das Vor-alpenland oder die das Oberrheintal im Norden begrenzenden Mittelgebirge Gegenstand der veröffentlichten Arbeiten und Aufsätze sein können.

Für umfangreichere wissenschaftliche Arbeiten, die nicht sich nicht auf Südwestdeutschland beziehen, wurde mit „andrias“ eine zweite, unregelmäßig erscheinende Zeitschrift geschaffen. Soweit es sich nicht um umfangreichere Monografien handelt, werden dort die Aufsätze nach Themengebieten zusammengefaßt als Einzelbände und unperiodisch publiziert.

Die genannten Zeitschriften werden ergänzt durch „Beihefte“ zu *Carolinea*, die in unregelmäßiger Folge Kataloge, Tagungsberichte oder rasch zu veröffentlichende Mitteilungen und kleinere Monographien in variablem Layout herausbringen. Sie decken auch Themenbereiche ab, die wie der Naturschutz mit der wissenschaftlichen Arbeit am Museum verwandt sind, aber nicht im Mittelpunkt derselben stehen. Die „Beihefte“ wurden bereits 1972 als Monographien begonnen und den „Beiträgen“ zugeordnet.

Neben den genannten, überwiegend wissenschaftlich orientierten Zeitschriften bringt das Museum mit den „Führern zu Ausstellungen“ eine Publikationsreihe heraus, die sich an die breitere Öffentlichkeit wendet. Diese „Führer“ befassen sich überwiegend mit Sonderausstellungen, behandeln aber auch einzelne Abteilungen der ständigen Ausstellungen wie beispielsweise das Vivarium, oder erschließen Themen für bestimmte Besucherkreise wie Kinder oder Schüler.

Schließlich erschien außerhalb der genannten Schriftenreihen zum 200jährigen Jubiläum des Museums der Band „Vom Naturalienkabinett zum Naturkundemuseum 1795-1985 – Geschichte der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe“

Das Gesamtverzeichnis ist folgendermaßen gegliedert:

- Zunächst werden alle seit 1936 erschienenen Veröffentlichungen zusammengestellt.
- Die wissenschaftlichen Arbeiten, die den Großteil der Aufsätze und Mitteilungen ausmachen, werden in einem weiteren Verzeichnis alphabetisch nach Verfassern geordnet aufgeführt. Dabei werden auch alle Zweit- und Folgeautoren nochmals getrennt mit einem Verweis auf die entsprechende Arbeiten ins Autorenverzeichnis eingeordnet.
- An das Autorenverzeichnis schließt sich ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Sachgebieten an. Hier können Arbeiten, je nach Thematik und Inhalt, mehrfach aufgeführt sein.
- Ein weiteres Verzeichnis schlüsselt die wissenschaftlichen Arbeiten nach regionalen Bezügen auf. Hier wurde, um Mehrfachnennungen einzuschränken, eine hierarchisch aufsteigende Abfolge der Regionen gewählt, bei der eine bereits erwähnte Arbeit in der nächsthöheren Kategorie nicht mehr erscheint. Ein Aufsatz, der z.B. unter „Oberrhein“ aufgeführt ist, fehlt in der übergeordneten Kategorie „Südwestdeutschland“
- Die in den beiden erstgenannten Verzeichnissen thematisch nicht aufgeschlüsselten übrigen Aufsätze und Mitteilungen, die Biographisches, Museumsmitteilungen, Museumsführer und sonstige Schriften des Museums sowie Angelegenheiten des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe und der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe betreffen, werden abschließend in eigenen Verzeichnissen aufgeführt.

## 1. Verzeichnis der Zeitschriften

### **Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland**

Herausgegeben von den Badischen Landessammlungen für Naturkunde und der Landesnaturschutzstelle Karlsruhe im Auftrage des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

- Band 1, Heft 1 (1936): 1-162, 10 Taf., 2 Abb.,  
Heft 2 (1936): 163-304, 24 Taf., 4 Abb.
- Band 2, Heft 1 (1937): 1-164, 9 Taf., 1 Porträt  
Heft 2 (1937): 165-285, 4 Taf.
- Band 3, Heft 1 (1938): 1-148, 7 Taf., 10 Abb.  
Heft 2 (1938): 150-270, 8 Taf., 11 Abb., 1 Kt. als Beilage
- Band 4, Heft 1 (1939): 1-116, 9 Taf., 1 Abb.  
Heft 2 (1939): I-VI, 117-178, 8 Taf.
- Band 5 (1940): 1-106, 6 Taf.

### **Beiträge zur naturkundlichen Forschung im Oberrheingebiet**

Herausgegeben von den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B.

- Band 6 (1941): 1-402, 5 Karten, 7 Taf., 7 Tab. als Beilage  
Band 7 (1942): 1-360, 13 Taf., 37 Abb.

### **Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland**

Herausgegeben von den Badischen Landessammlungen für Naturkunde und der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege

- Band 8 (1943/49): 1-73, 2 Taf., 4 Abb., 1 Kt.
- Band 9, Heft 1 (1950): 1-75, 2 Taf., 1 Abb.  
Heft 2 (1950): 1-98, 12 Taf.
- Band 10, Heft 1 (1951): 1-68, 3 Taf., 25 Abb.  
Heft 2 (1951): 69-141, 3 Taf., 4 Abb.
- Band 11, Heft 1 (1952): 1-58, 8 Abb.  
Heft 2 (1952): 59-129, 7 Taf., 6 Abb.
- Band 12, Heft 1 (1953): 1-70, 3 Taf., 3 Abb.  
Heft 2 (1953): 71-133, 1 Taf., 3 Abb.
- Band 13, Heft 1 (1954): 1-63, 2 Taf., 7 Abb.

### **Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland**

Herausgegeben von den Landessammlungen für Naturkunde und der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Karlsruhe

- Band 13, Heft 2 (1954): 67-110, 4 Taf., 9 Abb., 1 Kt. als Beilage
- Band 14, Heft 1 (1955): 1-79, 7 Taf., 13 Abb.  
Heft 2 (1955): 83-139, 6 Taf., 7 Abb.
- Band 15, Heft 1 (1956): 1-64, 4 Taf., 6 Abb.  
Heft 2 (1956): 67-128, 2 Taf., 12 Abb.
- Band 16, Heft 1 (1957): 1-44, 5 Taf., 2 Abb.  
Heft 2 (1957): 47-109, 2 Taf., 15 Abb.
- Band 17, Heft 1 (1958): 1-84, 6 Taf., 11 Abb.

- Heft 2 (1958): 87-179, 1 Taf., 10 Abb.  
 Band 18 (1959): 1-182, 11 Taf., 74 Abb., 1 Porträt; MAX - AUERBACH - Festschrift  
 Band 19, Heft 1 (1960): 1-111, 2 Taf., 22 Abb.  
     Heft 2 (1960): 115-190, 2 Taf., 6 Abb.  
     Heft 3 (1961): 195-435, 11 Taf., 61 Abb., Afghanistan-Heft  
 Band 20, Heft 1 (1961): 1-73, 1 Taf., 19 Abb.  
     Heft 2 (1961): 77-124, 2 Taf., 13 Abb.,  
 Band 21, Heft 1 (1962): 1-80, 4 Taf., 22 Abb.  
     Heft 2 (1962): 83-225, 22 Abb.  
 Band 22, Heft 1 (1963): 1-69, 5 Taf., 9 Abb.  
     Heft 2 (1963): 73-140, 2 Taf., 3 Abb.  
 Band 23, Heft 1 (1964): 1-84, 4 Taf., 13 Abb.  
     Heft 2 (1964): 87-191, 4 Taf., 20 Abb.  
 Band 24, Heft 1 (1965): 1-115, 9 Taf., 23 Abb.  
     Heft 2 (1965): 119-196, 2 Taf., 16 Abb.  
 Band 25, Heft 1 (1966): 1-102, 4 Taf., 11 Abb.  
     Heft 2 (1966): 105-159, 10 Abb., 5 Kt.  
 Band 26, Heft 1 (1967): 1-72, 2 Taf., 17 Abb.  
     Heft 2 (1967): 75-159, 2 Taf., 20 Abb.  
     Heft 3 (1967): 1-169, 21 Taf., 34 Abb., 2. Afghanistan-Heft  
 Band 27, Heft 1 (1968): 1-58, 14 Abb., 3 Kt.  
     Heft 2 (1968): 61-124, 8 Abb.  
 Band 28, Heft 1 (1969): 1-84, 2 Taf., 16 Abb., 1 Porträt  
     Heft 2 (1969): 87-138, 5 Taf., 12 Abb.  
 Band 29, Heft 1 (1970): 1-99, 5 Taf., 15 Abb.  
     Heft 2 (1970): 103-165, 9 Abb. [auf Umschlag versehentlich als „Band 28 Heft 2“]

### **Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland**

Herausgegeben von den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in Verbindung mit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe und dem Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e. V.

- Band 30, Heft 1 (1971): 1-90, 1 Taf., 11 Abb., 1 Porträt  
     Heft 2 (1971): 95-174, 6 Abb., 2 Porträts  
 Band 31 (1972): 1-206, 6 Taf., 19 Abb., 1 Porträt  
 Band 32 (1973): 1-226, 66 Abb.  
 Band 33 (1974): 1-264, 1 Taf., 77 Abb., 2 Porträts  
 Band 34 (1975): 1-476, 58 Abb., 1 Porträt,  
     Festschrift zum 70. Geburtstag von ERICH OBERDORFER  
 Band 35 (1976): 1-203, 48 Abb., 2 Porträts  
 Band 36 (1977): 1-266, 16 Taf., 65 Abb., 3 Porträts  
 Band 37 (1978): 1-224, 7 Taf., 148 Abb.  
 Band 38 (1979): 1-160, 57 Abb., 2 Kt. als Beilage  
 Band 39 (1980): 1-188, 49 Abb., 3 Porträts



**Carolinea** - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland  
Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - ISSN 0005-8122

- Band 40 (1982): 1-128, 64 Abb., 1 Porträt (29.10.1982)  
 Band 41 (1983): 1-152, 1 Taf., 96 Abb. (1.12.1983).- ISSN 0176-3997  
 Band 42 (1985): 1-148, 2 Taf., 66 Abb., 1 Porträt (29.3.1985)  
 Band 43 (1985): 1-132, 1 Farbtaf. als Beilage, 105 Abb. (20.12.1985)  
 Band 44 (1986): 1-184, 1 Taf., 7 Farbtaf., 93 Abb., 2 Porträts (29.12.1986)  
 Band 45 (1987): 1-168, 4 Taf. als Beilage, 4 Farbtaf., 82 Abb. (18.12.1987)  
 Band 46 (1988): 1-160, 2 Taf. als Beilage, 77 Abb. (31.10.1988)  
 Band 47 (1989): 1-192, 5 Taf. als Beilage, 8 Farbtaf., 135 Abb., 1 Porträt (30.10.1989)  
 Band 48 (1990): 1-176, 3 Taf., 2 Farbtaf., 112 Abb. (30.10.1990)  
 Band 49 (1991): 1-172, 8 Farbtaf., 100 Abb., 1 Porträt (30.10.1991)  
 Band 50 (1992): 1-208, 5 Farbtaf., 95 Abb., 2 Porträts (22.12.1992)  
 Band 51 (1993): 1-160, 75 Abb., 1 Porträt (30.11.1993)  
 Band 52 (1994): 1-152, 2 Farbtaf., 67 Abb., 1 Porträt (30.12.1994)  
 Band 53 (1995): 1-288, 8 Farbtaf., 126 Abb., 1 Porträt (15.12.1995);  
 Festband ERICH OBERDORFER  
 Band 54 (1996): 1-216, 8 Farbtaf., 128 Abb., 1 Porträt (30.12.1996)  
 Band 55 (1997): 1-152, 8 Farbtaf., 90 Abb. (15.11.1997)

**Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland - Beihefte**

Herausgegeben von den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in Verbindung mit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe und dem Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e. V.

- Beiheft 1 (1972): 1-103, 197 Abb.  
 Beiheft 2 (1974): 1-144, 18 Abb., 9 Taf., 2 Kt. als Beilage  
 Beiheft 3 (1979): 1-249, 7 Abb., 36 Taf. (1. 3. 1979)  
 Beiheft 4 (1981): 1-282, 4 Abb., 42 Taf. (1. 2. 1981)

**Carolinea, Beihefte**

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe; ISSN 0721-4004

- Beiheft 5 (1989): 1-433, 2 Abb. (13. 11. 1989)  
 Beiheft 6 (1990): 1-84, 35 Abb. (30. 4. 1990)  
 Beiheft 7 (1999): Dieses Heft  
 Beiheft 8 (1993): 1-86, 3 Abb. (15. 12. 1993)  
 Beiheft 9 (1995): 1-64, 75 Abb. (13. 4. 1995)  
 Beiheft 10 (1996): 1-146, 25 Karten, (31. 10. 1996)

**Andrias**

Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe; ISSN 0721-6513

- Band 1 (1981): 1-102, 19 Abb. (30. 10.1981)  
 Band 2 (1983): 1-64, 17 Abb. (31. 3. 1983)  
 Band 3 (1983): 1-104, 152 Abb. (30. 11. 1983)  
 Band 4 (1985): 1-171, 49 Abb., 17 Taf. (30. 12. 1985)  
 Band 5 (1986): 1-224, 114 Abb. (27. 3. 1986)  
 Band 6 (1989): 1-128, 97 Abb., 6 Taf., 1 Taf. als Beilage (30. 6. 1989)

**Andrias**

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe; ISSN 0721-6513

Band 7 (1990): 1-172, 80 Abb. (28. 12. 1990)

Band 8 (1991): 1-64, 28 Abb., 1 Porträt (8. 4. 1991)

Band 9 (1992): 1-210, 127 Abb. (30. 12. 1992)

Band 10 (1997): 1-230, 252 Abb., 1 Porträt (30. 9. 1997)

Band 11 (1993): 1-171, 24 Abb., 81 Taf. (10. 12. 1993)

Band 12 (1994): 1-94. 48 Abb. (29. 7 1994)

Band 13 (1994): 1-224, 82 Abb., 16 Farbtaf. (30. 9. 1994)

## 2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Verfassern

- ABRAHAM, R. (1971): siehe ABRAHAM, R. & ABRAHAM, R. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 49-56.
- ABRAHAM, R. (1972): Die Wirkung verschiedener Kulturmaßnahmen auf den Fang flugaktiver Insekten im Botanischen Garten der Universität Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 145-149.
- ABRAHAM, R. (1974): Über landlebende Turbellarien *Rhynchodemus bilineatus* (MECZNIKOW) und *Bipalium kewense* MOSELEY. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 229-232.
- ABRAHAM, R. (1977): Ein Beitrag zur Bionomie von *Brachygaster minuta* OLIVIER (Hymenoptera, Evaniidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 173-175.
- ABRAHAM, R. & ABRAHAM, R. (1971): Beobachtungen an gallbildenden Wanzen *Copium cornutum* THUNB. und *Copium teucarii* (HOST) (Hem., Tingidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 49-56.
- ABRAHAM, R. & SCHMIDT, K. (1977): Ein Beitrag zur Faunistik und Phänologie einiger Chalcididae (Chalcidoidea, Hymenoptera) aus der Umgebung von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 177-183.
- ADIS, J. (1994): siehe VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. - Andrias, **13**: 161-168.
- ADIS, J. (1994): siehe MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. - Andrias, **13**: 17-22.
- AHRENS, M. (1993): *Gymnostomum viridulum* BRID., ein für Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der Bergstraße. - Caroleinea, **51**: 75-82.
- AHRENS, M. (1995): Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* CULM. am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutschland). - Caroleinea, **53**: 229-241.
- AMSEL, H. G. (1950): Kleinschmetterlinge aus dem badischen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 26-28.
- AMSEL, H. G. (1953): Über einen tiergeographisch interessanten Kleinschmetterling Süddeutschlands. Die Unterart-Bildung bei *Pristophora florella* MN. (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 12-16, Taf. I.
- AMSEL, H. G. (1955): Irakische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 119-129, Taf. VI.
- AMSEL, H. G. (1955): Eine neue *Dysmasia*-Art aus Portugal (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 130-131.
- AMSEL, H. G. (1956): Kleinschmetterlinge vom mittleren Jordantal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 56-62, Taf. IV.
- AMSEL, H. G. (1957): Die Deutsche Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 5-29, Taf. I-III.
- AMSEL, H. G. (1957): Neue Microtineiden aus Portugal (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 30-33.
- AMSEL, H. G. (1957): Pyraliden-Studien I (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 105-109.
- AMSEL, H. G. (1958): Kleinschmetterlinge aus Nordost-Arabien der Ausbeute A. S. TALHOUK. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 61-82, Taf. V.
- AMSEL, H. G. (1958): Eine neue *Anarsia*-Art aus den Bassen-Alpes in Frankreich (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 179.

- AMSEL, H. G. (1961): Microlepidopteren aus SW.-Arabien der Ausbeuten H. SCOTT und E. B. BRITTON 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 49-61.
- AMSEL, H. G. (1961): Über einige bemerkenswerte Kleinschmetterlinge des Naturschutzgebietes von Unteruhldingen am Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 93-98.
- AMSEL, H. G. (1961): Zwei neue *Evippe*-Arten aus Afghanistan, Iran und Nord-Syrien (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 99-103, Taf. II.
- AMSEL, H. G. (1961): Zur Systematik von *Margaretania superba* AMSEL 1961 (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 105.
- AMSEL, H. G. (1964): Zur Herausgabe der "Microlepidoptera Palaeartica" - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 73-80.
- AMSEL, H. G. (1964): Ein neuer Kleinschmetterling als Pistazien-Schädling aus Iran (Lepidoptera: Oinophilidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 107-109.
- AMSEL, H. G. (1965): Neue Prinzipien bei der Gestaltung entomologischer Schausammlungen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 105-110, Taf. VIII-IX.
- AMSEL, H. G. (1967): Die zweite Deutsche Afghanistan-Expedition 1966 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Ein Reisebericht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 3-14.
- AMSEL, H. G. (1967): Eine neue afghanische *Stenoptilia*-Art (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 15-16.
- AMSEL, H. G. (1967): siehe TOLL, S. v. & AMSEL, H. G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 5-16.
- AMSEL, H. G. (1967): Die afghanischen Arten des *Anarsia*-Komplexes. Zugleich eine vorläufige Revision der sonstigen paläarktischen Arten (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 17-31.
- AMSEL, H. G. (1968): Über Homonymien bei afghanischen Coleophoriden (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 49-50.
- AMSEL, H. G. (1969): Eine neue chinesische *Ethmia*-Art (Lepidoptera: Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 75-76.
- AMSEL, H. G. (1969): Die afghanischen *Ethmia*-Arten (Lepidoptera: Ethmiidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Deutschen Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 115-119.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische Pyraustinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 25-66, Taf. I-IV.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische quadrifine Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse d. 1. u. 2. Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 67-89, Taf. V.
- AMSEL, H. G. (1972): Depressarien aus Afghanistan, Iran, Irak und Arabien (Lepidoptera, Oecophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 133-144, Taf. I-V.
- AMSEL, H. G. (1974): Neue iranische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 197-203.
- AMSEL, H. G. (1977): Vier neue Kleinschmetterlinge aus Iran (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 227-236.
- AMSEL, H. G. (1978): Eine neue Carposinide aus West-Iran (Lepidoptera: Carposinidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 215-216.
- AMSEL, H. G. (1983): Die Gattungen *Lymira* RAGONOT 1888 und *Hosidia* HAMPSON 1901 (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Peorini). - Andrias, **3**: 55-58.
- ANGST, R. (1976): Das Endocranialvolumen der Pongiden (Mammalia: Primates). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 181-188.

- ANGST, R. (1980): KURT SILBER †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 183-185.
- ANGST, R. (1985): Beitrag zur Kenntnis des Elefantenschädels (Mammalia: Proboscidea) - Stoßzahnlose afrikanische Elefanten in den Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe. - *Carolinea*, **42**: 129-137
- ANGST, R. (1985): HERMANN POHLE †. - *Carolinea*, **42**: 138.
- ANGST, R. (1985): Beitrag zur Kenntnis des Hirnschädelsvolumens bei Tupaiiden und der Variabilität der Schädelmaße von *Tupaia glis* (Mammalia: Scandentia). - *Carolinea*, **43**: 113-116.
- ANGST, R. (1986): Das Gemälde „Elefanten flüchten vor einem Steppenbrand“ von WILHELM KUHNERT im Museum am Friedrichsplatz in Karlsruhe. - *Carolinea*, **44**: 173-176.
- ARENBERGER, E. (1972): Eine neue *Agdistis*-Art aus Kleinasien (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 151-152.
- ARENBERGER, E. (1973): Eine neue *Agdistis*-Art von den Kanarischen Inseln (Lep., Pterophoridae) *Agdistis pseudocanariensis* spec. nov. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 179-180.
- ARENBERGER, E. (1977): Die palaearktischen *Agdistis*-Arten (Lepidoptera, Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 185-226.
- ARENBERGER, E. (1983): Ergänzungen zur Gattung *Agdistis* (Lepidoptera, Pterophoridae). - *Andrias*, **3**: 51-54.
- ARNOLD, A. (1997): siehe KLIESCH, C., ARNOLD, A. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **55**: 57-64.
- ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. (1997): Rheinbrücke bei Mannheim als Fledermausfalle. - *Carolinea*, **55**: 81-93, 1 Farbtaf.
- ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. (1996): Zur Rauhhauffledermaus (*Pipistrellus nathusii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) in den nordbadischen Rheinauen. - *Carolinea*, **54**: 149-158.
- ASAL, K. (1936): Das Reichsnaturschutzgesetz. Vortrag gehalten beim Badischen Naturschutztag am 14. Januar 1936 im Studentenhaus der Technischen Hochschule Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 167-176.
- ASPÖCK, H. & ASPÖCK, U. (1965): Die Neuropteren Vorderasiens 1. Coniopterygidae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 159-181.
- ASPÖCK, U. (1965): siehe ASPÖCK, H. & ASPÖCK, U. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 159-181.
- AUERBACH, G. (1937): Studien an Cruciferenblättern. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 49-53, Taf. III.
- AUERBACH, M. (1936): Naturschutz in Baden und badische Naturschutzgebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 177-189, Taf. 1-5.
- AUERBACH, M. (1937): Die badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 16-21, Taf. I.
- AUERBACH, M. (1940): Die Wirbeltiere Badens in ihrer Beziehung zur Umwelt und zur Landschaftsform. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 3-54.
- AUERBACH, M. (1940): Zwanzig Jahre Anstalt für Bodenseeforschung der Stadt Konstanz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 55-61.
- AUERBACH, M. (1949): Prof. Dr. MAX SCHWARZMANN †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 10-13.
- AUERBACH, M. (1952): Der Wasserabfluß aus der Konstanzer Bucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 54-58.
- AUERBACH, M. (1952): Indirekte Temperaturschichtung im Bodensee (Obersee) im Frühjahr 1947 - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 72-74.

- AUERBACH, M. (1953): Ein quantitativer Bodengreifer. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 17-22, Taf. II-III.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 117-119, Taf. I-VII.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee) 1925-1931. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 120-162.
- BAISCH, G. (1969): siehe WALLNER, M. & BAISCH, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 133-134.
- BAISCH, G. (1970): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 161-162.
- BALDIZZONE, G. (1983): Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XXXIV. (Les taxa décrites par H. G. AMSEL). - Andrias, **3**: 37-50.
- BARANYI, I. (1980): Untersuchungen über die Veränderungen von Sedimentgesteinseinschlüssen im Suevit des Nördlinger Rieses. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 37-56.
- BAUER, E. (1983): siehe TRAUB, B. & BAUER, E. - Andrias, **3**: 59-70.
- BAUER, W. & MÜLLER, G. (1969): Zur Avifauna des Ewros-Delta. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 33-52.
- BAUMANN, K. (1986): siehe NEUBERT, H. & BAUMANN, K. - Carolinea, **44**: 61-66.
- BAUMANN, K. (1987): siehe NEUBERT, H. & BAUMANN, K. - Carolinea, **45**: 51-76.
- BAUMANN, K. (1989): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - Carolinea, **47**: 25-46.
- BAUMANN, K. (1991): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - Carolinea, **49**: 13-26.
- BAUMANN, K. (1992): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - Carolinea, **50**: 27-44.
- BEAUMONT, G. DE (1986): Les Carnivores (Mammifères) du Néogène de Höwenegg/Hegau, Baden-Württemberg. - Carolinea, **44**: 35-45.
- BEAUMONT, J. DE (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Sphecidae (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 271-276.
- BEAUMONT, J. DE (1962): Spheciden aus Zentral-Arabien der Ausbeute Dr. DIEHL (Hym.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 221-224.
- BECHYNÉ, J. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Chrysomelidae, Galerucidae und Altriciidae (Coleoptera, Phytophaga). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 255-257
- BECK, L. (1978): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 1. Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 93-101.
- BECK, L. (1983): siehe MAYER, E. & BECK, L. - Carolinea, **41**: 137-139.
- BECK, L. (1986): siehe BRAUN, M. & BECK, L. - Carolinea, **44**: 139-148.
- BECK, L. (1988): Bestandes- und Bodenklima eines Buchenwaldes im nördlichen Schwarzwaldvorland. - Carolinea, **46**: 141-144.
- BECK, L. (1990): Bodenzoologie und Taxonomie in Karlsruhe. - Andrias, **7**: 5-8.
- BECK, L. (1990): siehe BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. - Andrias, **7**: 61-90.
- BECK, L. (1990): siehe WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. - Andrias, **7**: 15-60.
- BECK, L. (1991): Zoologische Systematik - Forschung an einem Naturkundemuseum. - Carolinea, **49**: 5-8.
- BECK, L. (1992): siehe SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. - Carolinea, **50**: 145-170.
- BECK, L. (1994): siehe BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. - Carolinea, **52**: 61-74.

- BECK, L. (1996): siehe SCHEURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. - *Carolinaea*, **54**: 91-138.
- BECK, L. & MITTMANN, H.-W. (1982): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 2. Klima, Streuproduktion und Bodenstreu. - *Carolinaea*, **40**: 65-90.
- BECK, L. & RIETSCHEL, S. (1994): EDUARD MAYER † 1928-1993. - *Carolinaea*, **52**: 151-152.
- BECK, L. & WOAS, S. (1991): Die Oribatiden-Arten (Acari) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. I. - *Carolinaea*, **49**: 37-82.
- BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. (1994): Tropische Diversität, ihre Aufrechterhaltung und deren Mechanismen. - *Andrias*, **13**: 5-6.
- BECKER, N. (1979): siehe LUDWIG, H.W., BECKER, N. & RAMBOW, C. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 141-153.
- BEHR, O., HRUBY, J. & MACHULE, M. (1966): *Catalogus simul Monumentum Florae Germaniae Orientalis enumerans omnes stirpes Pteridophytas et Anthophytas in Bohemia et Moravia septentrionali, Borussia orientali et occidentali, Lusatia orientali, Neomarchia, Pomerania, provincia Posenia et Silesia sponte crescentes*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 3-41.
- BEIER, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Mantidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 267
- BEIER, M. (1967): Ein phoretischer *Allochernes* (Pseudoscorp.) aus Afghanistan. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 17-18.
- BEIER, M. (1969): Ein neuer *Allochernes* (Pseudoscorp.) vom Elbursgebirge. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 121-122.
- BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. (1990): Zur Taxonomie der *Phthiracarus*-Arten (Acari, Oribatei) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. - *Andrias*, **7**: 61-90.
- BERNARD, A. (1975): siehe CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. C. & MITTMANN, H.-W. (1997): *Hippotherium primigenium* (Equidae, Mammalia) from the late Miocene of Höwenegg (Hegau, Germany). - *Andrias*, **10**: 1-230.
- BESCH, W. (1966): Biologischer Zustand und Abwasserbelastung der Fließgewässer Nordbadens. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 141-154.
- BESCH, W. (1968): Zur Verbreitung der Arten des Genus *Rivulogammarus* in Fließgewässern Nordbadens und Südwürttembergs. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 27-33.
- BESSLER, J. (1936): Doggerfossilien aus dem oligozänen Konglomerat der Tongrube von Rot-Malsch. (Vorläufige Mitteilung). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 43-48.
- BESSLER, J. (1938): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B. Funde von *Hadrocheilus* TILL im oberen Lias Gamma (Davoei-Schichten) der Langenbrückener Senke. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **3**: 66-75.
- BETZ, M. (1965): Der trockene Juli 1964. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 127-136.
- BEURTON, P. J. (1993): Worauf beruht die Kohäsion der biologischen Art?. - *Carolinaea, Beih.*, **8**: 5-19.
- BIBINGER, H. (1987): siehe SCHINDLER, H. & BIBINGER, H. - *Carolinaea*, **45**: 77-88.
- BIELAWSKI, R. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Coccinellidae (Coleoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 227-230.

- BLANKE, R. (1974): Der Zusammenhang zwischen Beuteangebot und Reproduktionsrate bei *Cyrtophora citricola* FORSKAL (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 223-228.
- BLANKE, R. (1976): Über das bisher unbekannte Männchen von *Cyrtophora stellata* SIMON (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 125-127
- BLESZYNSKI, S. (1959): Materialien zur Kenntnis der Crambinae. 21. Teil. Studien über einzelne Crambinae aus dem Nahen Osten (Lepidoptera, Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 112-116, Taf. III.
- BLÜTHGEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Diptera und Apoidae (partim) (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 277-287
- BOGENRIEDER, A. (1995): siehe KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. - Caroline, **53**: 113-125.
- BOGENRIEDER, A. & STIETENCRON, A. v. (1985): Morphologische und cytologische Untersuchungen an *Anthoxanthum alpinum* A. & D. LÖVE und *Anthoxanthum odoratum* L. vom Feldberg im Schwarzwald. - Caroline, **42**: 51-56.
- BOGENRIEDER, A. & WERNER, H. (1979): Experimentelle Untersuchungen an zwei Charakterarten der Eisseggenflur des Feldberges (*Carex frigida* ALL. und *Soldanella alpina* L.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 61-69.
- BOGENRIEDER, A., BÜHLER, M. & HÄRRINGER, P. (1993): *Anthoxanthum odoratum* L. und *Anthoxanthum alpinum* (A. & D. LÖVE) am Feldberg (Schwarzwald). Ein Beispiel für Höhenvi-karianz. - Caroline, **51**: 41-50.
- BOGENRIEDER, A., RASBACH, H. & RASBACH, K. (1989): Neufund von *Botrychium matricariifolium* im Schwarzwald. - Caroline, **47**: 149-150.
- BÖHLING, N. (1996): *Poa alpina* L. in Südwestdeutschland. - Caroline, **54**: 177-180.
- BÖHLING, N. (1997): siehe SCHOLZ, H. & BÖHLING, N. - Caroline, **55**:
- BÖHM, R. (1995): siehe KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. - Caroline, **53**: 113-125.
- BOMMER, K. (1994): siehe HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. - Caroline, **52**: 119-121.
- BON, M. (1994): siehe WINTERHOFF, W. & BON, M. - Caroline, **52**: 5-10.
- BONALDO, A. B. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Revision of the neotropical spider genus *Stethor-rhagus* (Araneae, Corinnidae). - Andrias, **13**: 33-64.
- BORNKAMM, R. (1975): Some observations on weed communities in the city of Durham, North Carolina, U.S.A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 15-24.
- BÖTTGER, M. (1983): Die Böschungsgestaltung in Baggerseen der Sand-Kiesvorkommen des mittleren Oberrheingebietes. - Caroline, **41**: 21-32, 1 Taf.
- BOURSIN, C. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Noctuidae-Trifinae (Lep.) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae - Trifinae", 111). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 373-398, Taf. V-X+ 2 S.
- BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - Caroline, **52**: 61-74.
- BRAUN, M. (1985): Zum Vorkommen der Breitflügel-Fledermaus *Eptesicus serotinus* SCHREBER, 1774 (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - Caroline, **43**: 126-127
- BRAUN, M. (1985): Erstnachweis einer Nordfledermaus *Eptesicus nilssonii* (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - Caroline, **43**: 127-128.



- BRAUN, M. (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **43**: 129-132.
- BRAUN, M. (1986): Funde der Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* LINNAEUS, 1758 (Mammalia, Chiroptera) in Nordbaden. - *Carolinea*, **44**: 169-170.
- BRAUN, M. (1987): Der Feldhamster in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **45**: 160-161.
- BRAUN, M. (1988): Der Große Abendsegler in Nordbaden. - *Carolinea*, **46**: 151-152.
- BRAUN, M. (1989): siehe HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **47**: 117-132.
- BRAUN, M. (1991): Zum Vorkommen der Mopsfledermaus in Nordbaden. - *Carolinea*, **49**: 133-135.
- BRAUN, M. (1991): siehe BRÜNNER, H. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **49**: 115-120.
- BRAUN, M. (1991): siehe HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **49**: 101-114.
- BRAUN, M. (1996): Die Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus* LINNÉ, 1758) in Nordbaden. - *Carolinea*, **54**: 167-173.
- BRAUN, M. (1996): siehe HEINZ, B. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **54**: 159-166.
- BRAUN, M. (1996): siehe ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **54**: 149-158.
- BRAUN, M. (1997): siehe ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHHEL, G. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- BRAUN, M. (1997): siehe DIETZ, C. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **55**: 65-80.
- BRAUN, M. (1997): siehe HEINZ, B. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **55**: 49-56.
- BRAUN, M. (1997): siehe KLIESCH, C., ARNOLD, A. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **55**: 57-64.
- BRAUN, M. & BECK, L. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 9. Die Pseudoskorpione. - *Carolinea*, **44**: 139-148.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1990): Fortpflanzungsnachweis der Nordfledermaus im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **48**: 153-154.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1993): Der Kleine Abendsegler in Nordbaden. - *Carolinea*, **51**: 101-106.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1997): Funde der Großen Bartfledermaus in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **55**: 113-116.
- BRAUN, M. & KISCHNICK, P. (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - *Carolinea*, **45**: 159-160.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1975): Fragmenta Phytosociologica Raetica VI. Agropyro-Alnetum incanae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 25-36.
- BRECHTEL, F. (1996): siehe SCHEURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. - *Carolinea*, **54**: 91-138.
- BRECHTEL, F. & KOSTENBADER, H. (1994): Der Florentiner-Prachtkäfer *Coroebus florentinus* (HERBST, 1801) (Coleoptera, Buprestidae) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 75-81, 1 Farbtaf.
- BRECHTEL, F., EHRMANN, R. & DETZEL, P. (1996): Zum Vorkommen der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* (LINNÉ, 1758) in Deutschland. - *Carolinea*, **54**: 73-90, 1 Farbtaf.
- BRESCOVIT, A. D. (1994): siehe BONALDO, A. B. & BRESCOVIT, A. D. - *Andrias*, **13**: 33-64.
- BRESCOVIT, A. D. (1994): siehe HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. - *Andrias*, **13**: 99-112.
- BRESCOVIT, A. D. (1994): siehe HÖFER, H., BRESCOVIT, A. D. & GASNIER, T. - *Andrias*, **13**: 81-98.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Amazoromus*, a new genus of the spider family Gnaphosidae (Araneae) from central Amazonia, Brazil. - *Andrias*, **13**: 65-70.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Heidrunea*, a new genus of the spider subfamily Rhoicininae (Araneae, Trechaleidae) from central Amazonia, Brazil. - *Andrias*, **13**: 71-80.

- BRETFELD, G. & GAUER, U. (1994): Diagnostic description of the males of new Sphaeridia species (Insecta, Collembola) from South America. - *Andrias*, **13**: 113-136.
- BREUNIG, T. & HAISCH, B. (1988): Neufunde des Quirl-Tännels (*Elatine alsinastrum* L.) in der Offenburger Rheinebene. - *Carolinea*, **46**: 137
- BREUNIG, T. & PHILIPPI, G. (1988): Der Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) in der mittelbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **46**: 131-134.
- BREUNIG, T. & SCHACH, J. (1989): Ein Fund des Scheiden-Gelbsterns (*Gagea spathaceae*) in der nordbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **47**: 151-152.
- BRIGNOLI, P. M. (1978): Spinnen aus Brasilien IV. Zwei neue blinde Bodenspinnen aus Amazonien (Arachnida, Araneae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 143-147.
- BROSSMER, K. (1952): ROBERT BURGER (1868-1950). Ein führender badischer Schulmann. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 69-71.
- BRÜNNER, H. & BRAUN, M. (1991): Zur Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus*) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 115-120.
- BUCHMANN, H. (1994): siehe HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. (1979): Ausgewählte Kapitel zur Oberrheingraben-Tektogenese. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 17-51.
- BUCHWALD, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer *Cordulegaster bidentatus* (Odonata) in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **46**: 49-64.
- BÜCKING, W. (1977): Nährstoffverhältnisse im Bannwald „Greifenberg“ (Kraichgau). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 67-79.
- BÜCKING, W. (1995): Vegetationsstruktur des Bannwaldes „Bildhau“ (Gemeindewald Riederrich bei Reutlingen, Südwestdeutschland). - *Carolinea*, **53**: 127-146.
- BÜHLER, M. (1993): siehe BOGENRIEDER, A., BÜHLER, M. & HÄRRINGER, P. - *Carolinea*, **51**: 41-50.
- BURCHARDT, S. (1978): siehe WAGNER, G. & BURCHARDT, S. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 103-107.
- BÜRCELIN, H. (1937): ANDREAS KNEUCKER. Ein Lebensbild zu seinem 75. Geburtstag. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 3-15.
- BÜRCELIN, H. (1949): Prof. ANDREAS KNEUCKER zum Gedächtnis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **8** (1943/49): 13-15, 1 Taf.
- BURKHARDT, J. F. (1993): siehe SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. - *Carolinea*, **51**: 93-100.
- BURKHARDT, P. (1986): siehe STORCH, V. & BURKHARDT, P. - *Carolinea*, **44**: 149-152.
- BUTTLER, K. P. & STIEGLITZ, W. (1976): Floristische Untersuchungen im Meßtschblatt 6417 (Mannheim-Nordost). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 9-51.
- CAPUSE, I. (1974): Beiträge zum Studium der Familie Coleophoridae, IX (Lepidoptera). Über die von A. CARADJA beschriebenen Taxa der Gattung *Coleophora*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 179-195.
- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- CASPERS, N. (1980): Die Makrobenthos-Gesellschaften des Hochrheins bei Bad Säckingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 115-142.
- CEZANNE, R. & EICHLER, M. (1991): *Parmelia mougeotii* SCHAERER ex. DIETR. im badischen Odenwald. - *Carolinea*, **49**: 121-122.
- CHVALA, M. (1961): siehe MOUCHA, J. & CHVALA, M. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 313-315.

- COLLINGWOOD, C.A. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Formicidae (Hymenoptera Aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 289-298.
- DANIEL, F. (1958): Zwei neue *Rethera*-Arten aus Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 83-84, Taf. VI.
- DAUBER, A., mit Beiträgen von FIETZ, A. & LANG, G. (1955): Römische Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 43-56.
- DEMUTH, S. (1988): Über zwei bemerkenswerte Mauerfarne an der Bergstraße. - *Carolinea*, **46**: 135-136.
- DEMUTH, S. (1992): Über einige seltenen *Orobanche*-Arten (Orobanchaceae) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **50**: 57-66.
- DENÈGRE, M. (1986): siehe WAUTHY, G., VERA, H., LIONS, J.-C., SCHONNE, E. & DENÈGRE, M. - *Andrias*, **5**: 15-20.
- DETHIOUX, M. (1975): siehe SOUGNEZ, N. & DETHIOUX, M. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 345-356.
- DETZEL, P. (1987): Die Dornschröcke *Tetrix ceperoi* neu für Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **45**: 162.
- DETZEL, P. (1996): siehe BRECHTEL, F., EHRMANN, R. & DETZEL, P. - *Carolinea*, **54**: 73-91.
- DIEM, M. (1956): Messungen der Größe der Regentropfen in natürlichen Regen und bei künstlicher Beregnung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 75-90, Taf. I-II.
- DIENT, M. (1982): siehe KÄMMER, F. & DIENST, M. - *Carolinea*, **40**: 49-64.
- DIERSCHKE, H. (1995): Phänologischer Jahresrhythmus eines Tollkirschen (Atropion)-Waldsaumes. - *Carolinea*, **53**: 75-81.
- DIERSSEN, K. (1975): Zur Litoralvegetation oligotropher und mesotropher Gewässer in Island und Norwegen - ein Beitrag zur Soziologie und Verbreitung der Littorelletea in Nord-Europa. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 57-77.
- DIERSSEN, K. (1983): Zur Verbreitung und Soziologie von *Sphagnum riparium* ÅNGSTR. in Mitteleuropa. - *Andrias*, **2**: 9-22.
- DIETZ, C. & BRAUN, M. (1997): Zur Fledermausfauna im Landkreis Freudenstadt (Regierungsbezirk Karlsruhe). - *Carolinea*, **55**: 65-80, 1 Farbt. af.
- DILLMANN-VOGEL, H. (1976): siehe MUCKLE, R. & DILLMANN-VOGEL, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 81-94.
- DIRSH, V. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Acridoidea (Orthoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 263-266.
- DOCZKAL, D. & SCHMID-EGGER, C. (1992): Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera, Apoidea). - *Carolinea*, **50**: 173-176.
- DRISSNER, J., HAVELKA, P. & FUNKE, W. (1994): Dipterengesellschaften einer Streuobstwiese. 1. Ceratopogonidae. - *Carolinea*, **52**: 111-114.
- DUFFNER, K. (1994): siehe RIEDE, K. & DUFFNER, K. - *Andrias*, **13**: 151-160.
- DUMPERT, K. (1986): siehe SCHÖNBORN, W. & DUMPERT, K. - *Carolinea*, **44**: 129-138.
- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 4. Die Spinnenfauna. - *Carolinea*, **42**: 75-106.
- EBERMANN, E. (1986): Zur Kenntnis der Scutacariden Südamerikas (Acari, Tarsonemina). - *Andrias*, **5**: 15-14.
- EBERT, G. (1964): Die Macrolepidopteren-Sammlungen der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe und ihre Neugestaltung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 87-106.

- EBERT, G. (1967): Bemerkungen zur Verbreitung, Ökologie und Phaenologie afghanischer Schmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 109-135.
- EBERT, G. (1969): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 77-78.
- EBERT, G. (1969): GUSTAV REICH †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 79.
- EBERT, G. (1971): Drei neue Macrolepidoptera-Arten aus Iran. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 65-71, 1 Farbtaf.
- EBERT, G. (1971): Kleine Mitteilungen. Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 85-86.
- EBERT, G. (1972): Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 183-184.
- EBERT, G. (1974): In memoriam CHARLES BOURSIN. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 5-6.
- EBERT, G. (1974): KARL STROBEL †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 7-8.
- EBERT, G. (1974): Zwei neue Taxa der Gattung *Zygaena* (*Mesembrynus*) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 163-168.
- EBERT, G. (1974): Zur Taxonomie und Verbreitung der *Ocnogyna nordstroemi*-Artengruppe (Lep./Arct.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 169-176.
- EBERT, G. (1974): Kleine Mitteilungen. Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 253-254.
- EBERT, G. (1976): WALTER STRITT †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 7-8.
- EBERT, G. (1976): Kleine Mitteilungen. Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 189-191.
- EBERT, G. (1977): RUDOLPH KÜNNERT †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 43-44.
- EBERT, G. (1977): Die Macrolepidopteren-Sammlung der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe und ihre Neugestaltung (2. Teil). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 247-260.
- EBERT, G. (1977): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 261-262.
- EBERT, G. (1978): Neue Taxa paläarktischer Noctuidae aus dem wissenschaftlichen Nachlass von CHARLES BOURSIN (Lep./Noct. Trifin.) 1. Die Arten der Gattung *Oncocnemis* LEDERER, 1853. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 193-207
- EBERT, G. (1978): Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 217-218.
- EBERT, G. (1992): WALTER RÖSSLER † 1908 - 1991. - *Carolinea*, **50**: 207.
- EBERT, G. (1992): PAUL PEKARSKY † 1895 - 1989. - *Carolinea*, **50**: 208.
- EBERT, G. (1996): Die Sammlung Dr. med. OTTO ENGELHARDT. - *Carolinea*, **54**: 195.
- EBERT, G. (1996): Dr. RUPPRECHT BENDER (1905-1993) und seine Sammlung. - *Carolinea*, **54**: 196.
- EBERT, G. & LUSSI, H. G. (1970): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 91-94.
- EBERT, G. & MÜLLER, G. (1968): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen und der Ornithologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 51-53.
- EBERT, G. & TRUNKÓ, L. (1977): HANS W. KESENHEIMER †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 33-34.
- ECKERT, H. (1951): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. Vorläufige Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 44-45.

- ECKERT, H. (1955): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. I. Pleurotomariidae und Neritopsidae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 101-113, Taf. I-III.
- EHRMANN, R. (1996): siehe BRECHTEL, F., EHRMANN, R. & DETZEL, P. - *Carolinea*, **54**: 73-90.
- EICHLER, M. (1991): siehe CEZANNE, R. & EICHLER, M. - *Carolinea*, **49**: 121-122.
- EIDEL, K. (1937): Beiträge zur Insektenfauna des Rheins. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 40-48.
- EINSLE, U. (1959): Zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 59-61.
- EINSLE, U. (1959): Über *Dunhevedia crassa* KING (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 62-64.
- EINSLE, U. (1964): Das Crustaceenplankton des Mindelsees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 53-70.
- EINSLE, U. (1969): Populationsdynamische und synökologische Studien am Crustaceen-Plankton zweier Kleinseen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 53-73.
- EINSLE, U. (1986): FRIEDRICH KIEFER † 1897-1985 - *Carolinea*, **44**: 182-183.
- EINSLE, U. (1992): Neu- und Wiederbeschreibungen einiger Arten der Gattung *Cyclops* s. str. (Copepoda, Cyclopoida) aus der Türkei und Asien. - *Andrias*, **9**: 179-194.
- EINSLE, U. (1992): Nordamerikanische Arten der Gattungen *Eucyclops* und *Acanthocyclops* (Crustacea, Copepoda) aus alten Proben der Sammlung F. KIEFER. - *Andrias*, **9**: 195-210.
- ELSTER, H.- J. (1959): Bodensee-Felchen (Coregonen) im Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 87-91, Taf. I.
- FABER, U. (1985): siehe WINTERHOFF, W., FABER, U. & HENGE, E. - *Carolinea*, **43**: 122-123.
- FELSCH, K. (1936): Beobachtungen im Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried“ - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 219-227, 3 Taf.
- FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. (1994): Diversität von Interaktionen zwischen Ameisen und Pflanzen im südostasiatischen Regenwald. - *Andrias*, **13**: 169-178, 1 Farbtaf.
- FIETZ, A. (1951): Frühmittelalterliches Getreide aus Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 102-104, Taf. IV.
- FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturmes von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 116-118.
- FIETZ, A. (1954): Römische Getreidereste aus dem nördlichen Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 99-104, Taf. IV.
- FIETZ, A. (1955): siehe DAUBER, A., FIETZ, A. & LANG, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 43-56.
- FIETZ, A. (1961): Pflanzenreste aus den römischen Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 23-29, Taf. I.
- FINK, H. G. (1979): siehe KORNECK, D. & FINK, H. G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 53-59.
- FLOREN, A. & LINSENMAIR, K. E. (1994): Zur Diversität und Wiederbesiedlungsdynamik von Arthropoden auf drei Baumarten in einem Regenwald in Sabah, Malaysia. - *Andrias*, **13**: 23-28, 1 Farbtaf.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 5. Die Weberknechte. - *Carolinea*, **42**: 107-114.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 7. Der Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia*. - *Carolinea*, **43**: 105-112.

- FRANKE, U. (1989): Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. FRIEDRICH KIEFER. - *Carolinea*, Beih., **5**: 3-433.
- FRANKE, U. (1993): siehe VERHAAGH, M. & FRANKE, U. - *Carolinea*, **51**: 125-128.
- FRANKE, U. & GREVEN, H. (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 13. Die Schnecken. - *Carolinea*, **48**: 131-138.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some Oribatid Mites of the family Oppiidae (Acari, Oribatei) from Amazonia. - *Andrias*, **9**: 5-56.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some basic oppiid-like taxa (Acari, Oribatei) from Amazonia. - *Andrias*, **9**: 57-74.
- FRENTZEN, K. (1936): Ein fossiler Mageninhalt aus dem Lias Delta (Amaltheen-Schichten) von Reichenbach, O.A. Aalen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 153-156.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. I. Neue Funde von Isopoden (Asseln) im Lias Südwestdeutschlands. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 100-103.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. II. *Mecochirus eckerti* nov. spec. aus dem Lias Ep-silon (Posidonienschiefer) von Langenbrücken. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 103-105.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. III. Über einige Decapoden aus dem Lias Delta Schwabens. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 106-115, Taf. VIII.
- FRENTZEN, K. (1941): Die Foraminiferenfaunen des Lias, Doggers und unteren Malms der Umgegend von Blumberg (Oberes Wutachgebiet). - *Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet*, **6**: 125-402, Taf. I-VII.
- FRENTZEN, K. (1951): MAX AUERBACH. Ein Lebensbild. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 75-87.
- FRENTZEN, K. (1964): Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebiets. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 31-51, Taf. III-IV.
- FRENZEL, P. (1976): Beitrag zur Kenntnis der *Fimbriatus*-Gruppe des Genus *Paracyclops*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 119-124.
- FRENZEL, P. (1977): Zur Populationsdynamik und Morphologie pelagischer Cladocera in einem Baggersee der nördlichen Oberrheinebene. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 91-108.
- FRENZEL, P. (1977): Fortpflanzungsrate bei *Paracyclops fimbriatus* s.l. (FISCHER, 1853) (Crustacea: Copepoda). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 109-112.
- FRENZEL, P. (1980): Neue Nachweise von *Scapholeberis aurita* (FISCHER, 1849) in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 177-179.
- FREY, W. & PROBST, W. (1974): Morphologische und vegetationsanalytische Untersuchungen an rezenten Kalktuffen im Keupergebiet des südlichen Schönbuschs. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 59-79.
- FRIEBE, B. (1978): Ein weiterer Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* PANZER 1794 (Opiliones) im Nordschwarzwald. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 109-111.
- FRIEBE, B. (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 3. Die Käferfauna. - *Carolinea*, **41**: 45-80.
- FRIEBE, B. (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* DIECKMANN, 1982, in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **46**: 148-149.

- FRIEDRICH, G. & MEIER-BROOK, C. (1987): Die Makrofauna der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen in Kleingewässern in der Umgebung von Tübingen. - *Carolinea*, **45**: 99-106.
- FRITZ, A. (1954): Neue Schmetterlinge vom Kaiserstuhl. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 84-85.
- FRITZ, H.-G. (1983): Wenig bekannte und neue Diptera/Nematocera (Insecta) aus der nördlichen Oberrheinaue. - *Andrias*, **3**: 9-24.
- FRITZ, K. (1989): Königsfarn (*Osmunda regalis*) und Straußenfarn (*Matteuccia struthiopteris*) im Mittleren Schwarzwald. - *Carolinea*, **47**: 157.
- FROEBE, H. A. (1972): siehe OESAU, A. & FROEBE, H. A. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 65-86.
- FROESE, A. & HAVELKA, P. (1991): Über die Ökologie von Ceratopogoniden (Diptera, Nematocera) auf Ackerflächen. - *Carolinea*, **49**: 126-128.
- FRÜND, H. C. (1991): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 14. Die Hundertfüßer (Chilopoda). - *Carolinea*, **49**: 83-94.
- FUCHS, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cerambycidae (Coleoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 259.
- FUCHS, G. (1973): Zur Geschichte eines quartären Westeifel-Vulkans, der Rusbüsch bei Niederbettingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 181-193.
- FUCHS, G. (1974): Das Unterdevon am Ostrand der Eifeler Nordsüd-Zone. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, *Beih.*, **2**: 3-163.
- FUNKE, W. (1994): siehe DRISNER, J., HAVELKA, P. & FUNKE, W. - *Carolinea*, **52**: 111-114.
- GALL, H. J. (1969): Zum Vorkommen von *Carex arenaria* auf den Silbergrasfluren bei Speyer. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 111-114.
- GASNIER, T. (1994): siehe HÖFER, H., BRESCOVIT, A. D. & GASNIER, T. - *Andrias*, **13**: 81-98.
- GAUER, U. (1994): siehe BRETTFELD, G. & GAUER, U. - *Andrias*, **13**: 113-136.
- GEHLKER, H. (1974): Ökologie und Parasitismus - am Beispiel der Spargel-Wurzelfäule im Rheintal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 113-127.
- GÉHU, J. (1975): siehe GÉHU, J.-M. & GÉHU, J. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 79-94.
- GÉHU, J.-M. & GÉHU, J. (1975): Les fourrés des sables littoraux du Sud-Ouest de la France. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 79-94.
- GEIGER, H. (1991): GÜNTHER BUCHLOH † 1923 - 1889. - *Carolinea*, **49**: 169-179.
- GLADITSCH, S. (1969): Die Wasserkäfer eines Kleinbiotops, mit einem Neufund für Süddeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 127-129.
- GLADITSCH, S. (1971): Neue Käferfunde für SW-Deutschland. 5. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleoptera. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 73-76.
- GLADITSCH, S. (1972): *Dactylosternum insulare* CAST., ein Erstfund für Deutschland und einige weitere für Baden neue Käferarten. 6. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 153-159.
- GLADITSCH, S. (1976): Weitere Käfererfirstfunde für Südwest-Deutschland mit je einem Erstfund für Mitteleuropa und Deutschland. 9. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 149-167.
- GLADITSCH, S. (1978): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 149-158.
- GLADITSCH, S. (1983): 12. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Carolinea*, **41**: 81-86.

- GLAVAČ, V. (1975): Das Pruno-Fraxinetum OBERDÖRFER 53 in Nordwestkroatien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 95-101.
- GÖRS, S. (1958): Ein Beitrag zur Kenntnis des Crepido-Juncetum acutiflori (Br.-Bl.15) OBERD. 56 auf basenreichen Standorten in Südwest-Deutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 8-10.
- GÖRS, S. (1958): siehe MÜLLER, T. & GÖRS, S. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 88-165.
- GÖRS, S. (1960): siehe MÜLLER, T. & GÖRS, S. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 60-100.
- GÖRS, S. (1975): Das Cladietum marisci ALL. 1922 in Süddeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 103-123.
- GÖRZE, H.-J. (1996): siehe HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L. GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. - *Carolinea*, **54**:
- GÖTTLICH, K. (1955): Über die Moortypen in Oberschwaben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 83-87
- GÖTTLICH, K. (1955): Ein Pollendiagramm ungestörter späteiszeitlicher Verlandungsschichten im Federseebecken. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 88-92.
- GÖTZ, H. (1980): WILHELM PHILIPP SCHIMPER und KARL FRIEDRICH SCHIMPER - zwei Naturforscher am Oberrhein. Zum 100. Todestag WILHELM PHILIPP SCHIMPER'S. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 19-35.
- GRASSHOFF, M. (1993): Taxonomie im Konflikt mit Evolutionsdenken. - *Carolinea*, Beih., **8**: 45-52.
- GREINER, C. (1936): Die Flußverlegung des Ravennabachs von der Gutach-Wutach zur Dreisam im südlichen Schwarzwalde. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 35-36, Taf. I.
- GREMMINGER, A. (1950): Die Schmetterlingsfauna des Wutachgebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 55-69, Taf. I-II.
- GREMMINGER, A. (1952): Nachtrag zum Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf (Oberrhein. Tiefebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 116-121.
- GREMMINGER, A. (1954): Die Schmetterlings-Eule *Thalpochares* Ld. (*Porphyrina* Hb.) *parva* Hb. in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 62-63.
- GRETLE, T. & OSTENDORP, W. (1997): Die Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate am Bodensee. - *Carolinea*, **55**: 23-34.
- GREVEN, H. (1990): siehe FRANKE U. & GREVEN, H. - *Carolinea*, **48**: 131-138.
- GRIESE, J. & KLEINSTEUBER, A. (1996): Ein Fund von *Linaria supina* im badischen Oberrheingebiet. - *Carolinea*, **54**: 183-185.
- GRÖSSLE, L. (1979): siehe RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H. A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 135-139.
- GROSSMANN, A. L. (1977): Der Lorbeerseidelbast - *Daphne laureola* L. - noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 61-65.
- GRUNEWALD, J. (1965): Zur Kenntnis der Simuliidenfauna (Diptera) des Südschwarzwaldes und seiner Randgebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 143-152.
- GRÜTTNER, A. (1990): siehe KRAUSE, W. & GRÜTTNER, A. - *Carolinea*, **48**: 31-36.
- GUIGNOT, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dytiscidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 233.
- GÜNTHER, H. (1982): siehe RIEGER, C. & GÜNTHER, H. - *Carolinea*, **40**: 100-101.
- GUTMANN, K. (1936): Grabhügelstudien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 263-286.
- GUTMANN, M. (1993): siehe WEINGARTEN, M. & GUTMANN, M. - *Carolinea*, Beih., **8**: 20-22.



- GUTMANN, W. F. (1993): Populationsgeschehen und Artbildung im Rahmen konstruktiver Limitationen. - *Carolinea*, Beih., **8**: 78-86.
- HABECK, F. (1995): siehe Schön, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. - *Carolinea*, **53**: 147-163.
- HAFNER, A. (1991): siehe ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. - *Carolinea*, **49**: 137-138.
- HAFNER, A. (1993): siehe ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. - *Carolinea*, **51**: 115-118.
- HAGEN, H.-O. v. (1973): Ein Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* (Opiliones) aus dem nördlichen Schwarzwald. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 159-160.
- HAILER, N. (1975): Bemerkungen über *Luzula forsteri* bei Annweiler am Trifels. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 125-130.
- HAISCH, B. (1988): siehe BREUNIG, T. & HAISCH, B. - *Carolinea*, **46**: 137
- HANAGARTH, W. (1994): siehe RÖMBKE, J. & HANAGARTH, W. - *Andrias*, **13**: 7-16.
- HAND, R. & SCHLESINGER, S. (1997): Ein Vorkommen der west-mediterranen Wiesenraute *Thalictrum speciosissimum* L. in Südbaden. - *Carolinea*, **55**: 120.
- HÄRRINGER, P. (1993): siehe BOGENRIEDER, A., BÜHLER, M. & HÄRRINGER, P. - *Carolinea*, **51**: 41-50.
- HAUER, J. (1936): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 129-152.
- HAUER, J. (1937): Zur Kenntnis der Rotatorienfauna des Eichener Sees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 165-173, Taf. X.
- HAUER, J. (1939): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins in den Jahren 1935-1939. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: I-VI.
- HAUER, J. (1939): Zur Kenntnis der Rüsselrädertiere (Bdelloidea) des Schwarzwaldes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 163-175, Taf. VIII.
- HAUER, J. (1950): Der nordamerikanische Strudelwurm *Euplanaria tigrina* (GIRARD) am Oberrhein. Mit Hinweis auf einige andere aquatile Einwanderer im Stromgebiet des Rheines. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **9** (1): 70-75.
- HAUER, J. (1951): Die Bad. Landessammlungen für Naturkunde im Wiederaufbau. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 90-95.
- HAUER, J. (1952): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet „Wutachtal“ - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 45-53.
- HAUER, J. (1956): Ein neuer *Brachionus* (Rotatoria) aus Venezuela. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 63-64.
- HAUER, J. (1958): Beitrag zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 174-178.
- HAUER, J. (1959): Raumparasitische Rotatorien aus der Kiemenhöhle des Steinkrebse (*Potamobius torrentium* SCHRANK). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 92-105, Taf. II.
- HAUER, J. (1961): Zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 67-69.
- HAUER, J. (1965): Über einige im Stromgebiet des Amazonas neu entdeckte Rädertiere. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 41-46.
- HAUER, J. (1966): *Brachionus gillardi* n.sp. (Rotatoria). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 73-74.
- HAUER, J., JÖRG, E. & OBERDORFER, E. (1953): Die Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe in den Jahren 1952/53. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 128-133.
- HÄUSSLER, U. (1990): siehe BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. - *Carolinea*, **48**: 153-154.
- HÄUSSLER, U. (1993): siehe BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. - *Carolinea*, **51**: 101-106.

- HÄUSSLER, U. (1997): siehe ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHER, G. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- HÄUSSLER, U. (1997): siehe BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. - *Carolinea*, **55**: 113-116.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1989): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe - Teil I. - *Carolinea*, **47**: 117-132.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1991): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe - Teil II: *Plecotus*. - *Carolinea*, **49**: 101-114.
- HAVELKA, P. (1978): Blütenbesuchende Ceratopogoniden (Diptera) aus der Umgebung von Tübingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 175-179.
- HAVELKA, P. (1979): siehe RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H.A. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 135-139.
- HAVELKA, P. (1980): *Meloë violaceus* MARSH, 1802 (Coleoptera, Meloidae) und seine cantariphenen Begleiter an einem Standort nördlich Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 153-159.
- HAVELKA, P. (1991): siehe FROESE, A. & HAVELKA, P. - *Carolinea*, **49**: 126-128.
- HAVELKA, P. (1994): siehe DRISSENER, J., HAVELKA, P. & FUNKE, W. - *Carolinea*, **52**: 111-114.
- HAVELKA, P. (1995): Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten - eine Aufgabe des Naturschutzes. - *Carolinea, Beih.*, **9**: 3-64.
- HAVELKA, P. (1996): Erste Ergebnisse zur Lebensraumnutzung des Wiedehopfes. - *Carolinea*, **54**: 191-194.
- HAVELKA, P. (1996): siehe MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. - *Carolinea*, **54**: 188-190.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1990): Der Kolkkrabe im Schwarzwald. - *Carolinea*, **48**: 151-152.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1997): Der Kolkkrabe (*Corvus corax* L., 1758) in Nordbaden. - *Carolinea*, **55**: 117-118.
- HAVELKA, P. & RIEDER, N. (1979): Zwei seltene Chironomiden im Oberrheingebiet und ihre rasterelektronenmikroskopische Charakterisierung (*Xenopelopia nigricans* FITTKAU und *X. falcigera* KIEFER). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 125-129.
- HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. (1994): Laupheim, die bedeutendste Saatkrähen-Kolonie in Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. (1980): Die Wirkung von Liparol auf die Puppen von *Xenopelopia nigricans* FITTKAU und *X. falcigera* KIEFER (Insecta, Diptera: Chironomidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 161-164.
- HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L., GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. (1996): Der Dreizehenspecht in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- HAWKSWORTH, D. L. (1976): siehe SCHINDLER, H. & HAWKSWORTH, D. L. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 75-80.
- HAYEK, L.-A. (1997): siehe BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. & MITTMANN, H.-W. - *Andrias*, **10**: 1-230.
- HECKMANN, R. (1996): Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). - *Carolinea, Beih.*, **10**: 1-146.
- HEDWIG, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ichneumonidae, Braconidae (Hymenoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 291-298.

- HEINZ, B. (1997): siehe ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1996): Das Schloß in Heidelberg (Baden-Württemberg) als Fledermaus-Quartier. - *Carolinea*, **54**: 159-166, 1 Farbtaf.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1997): Untersuchungen zur Fledermausfauna im Schloßgarten Schwetzingen. - *Carolinea*, **55**: 49-56, 1 Farbtaf.
- HEISS, E. (1997): Erstnachweis einer Aneurinae aus dem Baltischen Bernstein: *Aneurus ancestralis* n.sp. (Heteroptera, Aradidae). - *Carolinea*, **55**: 111-112, 1 Farbtaf.
- HENGE, E. (1985): siehe WINTERHOFF, W., FABER U. & HENGE, E. - *Carolinea*, **43**: 122-123.
- HENNINGER, G. (1951): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1946 bis 1950. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 62-64.
- HEPP, K. (1990): siehe HAVELKA, P. & HEPP, K. - *Carolinea*, **48**: 151-152.
- HEPP, K. (1997): siehe HAVELKA, P. & HEPP, K. - *Carolinea*, **55**: 117-118.
- HERING, E. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trypetidae (Diptera) (56. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 319-331.
- HERMANN, G. (1994): siehe KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. - *Carolinea*, **52**: 93-109, 2 Farbtaf.
- HERMANN, G. & STEINER, R. (1997): Eiablage- und Larvalhabitat des Komma-Dickkopffalters (*Hesperia comma* LINNÉ, 1758) in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Hesperidae). - *Carolinea*, **55**: 35-42, 2 Farbtaf.
- HERRMANN, R. (1983): Die Arten der Gattungen *Dahlica* ENDERLEIN und *Sideria* MEIER in Südbaden (Lepidoptera, Psychidae). - *Carolinea*, **41**: 87-96.
- HEYMER, A. (1968): Über ein Vorkommen von *Platycnemis latipes* RAMBUR, 1842 im Ober-Elsaß (Odonata: Zygoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 35-36.
- HEYNEN, C. (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 11. Die Dipterenlarven. - *Carolinea*, **46**: 115-130.
- HILPERT, H. (1987): Schlupfwespen des Feldberggebietes (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Carolinea*, **45**: 147-158.
- HINCKS, W. D. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermaptera. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 261.
- HIRLING, W. (1989): Ein räuberischer Nematode, *Parveyellus vorax* n. gen., n. spec. (Nematoda: Mononchida) in Mooren Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **47**: 133-140.
- HIRSCH, L. G. (1949): Eiszeitliche Frostböden in der Oberrheinebene bei Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **8** (1943/49): 61-73, Taf. 1-2.
- HIRSCH, L. G. (1950): Echte und falsche Dauerfrostböden auf der Oberrheinischen Niederterrasse zwischen Karlsruhe und Mannheim. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **9** (2): 3-14, Taf. I, Ia, II, III, IV, IVa.
- HIRSCH, L. G. (1952): Der Albschuttkegel bei Ettlingen und seine Stellung im oberrheinischen Diluvium. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 1-11.
- HOBERLANDT, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Heteroptera. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19** (3): 197-222.
- HOENES, D. (1952): LUDWIG HIRSCH †. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 65-68.
- HÖFER, H. (1994): siehe BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. - *Andrias*, **13**: 5-6.

- HÖFER, H. (1994): siehe BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. - *Carolinea*, **52**: 61-74.
- HÖFER, H. (1994): siehe BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. - *Andrias*, **13**: 65-70.
- HÖFER, H. (1994): siehe BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. - *Andrias*, **13**: 71-80.
- HÖFER, H. (1994): siehe MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. - *Andrias*, **13**: 17-22.
- HÖFER, H. (1994): siehe SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. - *Andrias*, **13**: 189-198.
- HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Ergebnisse der Bolivien-Expedition des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe: Spinnen (Araneae). - *Andrias*, **13**: 99-112, 4 Farbtaf.
- HÖFER, H., BRESCOVIT, A. D. & GASNIER, T. (1994): The wandering spiders of the genus *Ctenus* (Ctenidae, Araneae) of Reserva Ducke, a rainforest reserve in central Amazonia. - *Andrias*, **13**: 81-98, 3 Farbtaf..
- HOFFMANN, K. (1936): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke. I. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 287-303.
- HOFFMANN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. IV. Neue Sauriereste aus dem unteren Lias Alpha der Langenbrückener Senke. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 115-120, Taf. VIII.
- HOFFMANN, K. (1938): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke II. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **3**: 3-38, Taf. I-IV.
- HOFMANN, A. (1967): siehe OBERDORFER, E. & HOFMANN, A. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 83-139.
- HOHNER, W. (1996): siehe SCHEURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. - *Carolinea*, **54**: 91-138.
- HÖLZER, H. (1967): Die Neuropteren Vorderasiens. II. Chrysopidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 19-45, Taf. I-II.
- HÖLZER, H. (1968): Die Neuropteren Vorderasiens. III. Nemopteridae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 37-47.
- HÖLZER, H. (1972): Die Neuropteren Vorderasiens. IV. Myrmeleonidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, *Beih.*, **1**: 3-103.
- HÖLZER, A. (1978): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 55-92.
- HÖLZER, A. (1987): siehe HÖLZER, A. & HÖLZER, A. - *Carolinea*, **45**: 43-50.
- HÖLZER, A. (1988): siehe HÖLZER, A. & HÖLZER, A. - *Carolinea*, **46**: 23-30.
- HÖLZER, A. (1989): siehe LOTTER, A. F. & HÖLZER, A. - *Carolinea*, **47**: 7-14.
- HÖLZER, A. (1995): siehe HÖLZER, A. & HÖLZER, A. - *Carolinea*, **53**: 199-228.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1987): Paläoökologische Moor-Untersuchungen an der Hornisgrinde im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **45**: 43-50.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1988): Untersuchungen zur jüngeren Vegetations- und Siedlungsgeschichte im Blindensee-Moor (Mittlerer Schwarzwald). - *Carolinea*, **46**: 23-30.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1995): Zur Vegetationsgeschichte des Hornisgrinde-Gebietes im Nordschwarzwald: Pollen, Großreste und Geochemie. - *Carolinea*, **53**: 199-228.
- HÖLZINGER, J. & SCHILHANSL, K. (1972): Untersuchungen zur Brutbiologie an einer südwestdeutschen Population des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 93-101.
- HOPP, I. (1986): Benthalfauna und Steinbesiedlung in einem Schwarzwaldbach. - *Carolinea*, **44**: 153-162.
- HORION, A. (1954): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 1. Abteilung: Carabidae bis Histeridae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 51-61.

- HORION, A. (1955): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 2. Abteilung: Clavicornia bis Rhynchophora. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 57-69.
- HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Schneckengehäuse für die Überwinterung und das Brutverhalten von *Pellenes nigrocliliatus* L. KOCH, 1874 in Steppenrasenformationen (Ara-  
neae, Salticidae). Heidelberger Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Ge-  
bietes. Nr. 2. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 167-175.
- HORNBERGER, F. (1957): Der Weiße Storch in Baden-Württemberg 1956. - Beitr. naturk. Forsch.  
SüdwDtl., **16**: 52-58, Taf. I.
- HRADSKY, M. (1961): siehe MOUCHA, J. & HRADSKY, M. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**:  
317-317.
- HRUBY, J. (1950): Die Brombeeren des Karlsruher Florengebietes. - Beitr. naturk. Forsch.  
SüdwDtl., **9** (2): 15-25.
- HRUBY, J. (1954): Zum Vorkommen der Zwergglockenblume (*Campanula cochleariifolia* LAM.) in  
Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 43.
- HRUBY, J. (1966): siehe BEHR, O., HRUBY, J. & MACHULE, M. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**:  
3-41.
- HÜBL, H. H. (1942): Der gebleichte Mittlere Buntsandstein (Rehbergsschichten „b<sup>2b</sup>“) von Berg-  
zabern-Westmark. Eine gesteinskundlich-technische Betrachtung. - Beitr. naturk. Forsch.  
Oberrheingebiet, **7**: 301-358, Taf. I-IV.
- HÜGIN, G. & HÜGIN, H. (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarz-  
wald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen). -  
Carolinea, **53**: 45-53.
- HÜGIN, H. (1995): siehe HÜGIN, G. & HÜGIN, H. - Carolinea, **53**: 45-53.
- HUNDT, R. (1960): Das Vorkommen gotlandischer graptolithenführender Gerölle im Rheintal. -  
Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 132-137, Taf. I-II.
- HÜNERMANN, K. A. (1989): Die Nashornskelette (*Aceratherium incisivum* KAUP 1832) aus dem  
Jungtertiär vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - Andrias, **6**: 5-116.
- HÜPPE, J. (1995): siehe POTT, R. & HÜPPE, J. - Carolinea, **53**: 99-111.
- JACOBI, K. & MENNE, B. (1991): Zur Fortpflanzungsbiologie der trogliphilen Kreuzdornspanners  
*Tiphosa dubitata* L. (Lepidoptera, Geometridae). - Carolinea, **49**: 129-130.
- JAECKEL, S. G. A. (jun.) (1958): Molluskenfunde aus einigen Landesteilen Südwestdeutsch-  
lands. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 35-45.
- JANS, W. & RÖMBKE, J. (1989): Funde eines terrestrischen Polychaeten (Annelida) in Wäldern  
Baden-Württembergs. - Carolinea, **47**: 158-162.
- JAUCH, F. (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. - Beitr. naturk. Forsch.  
SüdwDtl., **3**: 76-147.
- JÉRÔME, C. (1993): siehe RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. - Carolinea, **51**: 51-52.
- JÉRÔME, C. (1995): siehe RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. - Carolinea, **53**: 21-32.
- JÖRG, E. (1953): siehe HAUER, J., JÖRG, E. & OBERDORFER, E. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.,  
**12**: 128-133.
- JÖRG, E. (1957): Ein Erstfund von *Asteriacites* SCHLOTHEIM (Cubichnia, Asterozoa) aus der bur-  
digalen Meeresmolasse des Bodenseegebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 34-36,  
Taf. IV.
- JÖRG, E. (1959): siehe TOBIEN, H. & JÖRG, E. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 175-181.
- JÖRG, E. (1962): Das Einhorn im Volksglauben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 3-5, Taf. I.
- JÖRG, E. (1965): *Ophisaurus acuminatus* nov. spec. (Anguidae, Rept.) von der pontischen Wir-  
beltier-Fundstätte Hewenegg/Hegau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 21-30, Taf. I.

- JÖRG, E. (1969): Eine Fischfauna aus dem Oberen Buntsandstein (Unter-Trias) von Karlsruhe-Durlach (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **28**: 87-102, Taf. I-IV.
- JÖRG, E. (1976): HELMUT KNIPPER †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **35**: 5-6.
- JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. (1955): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **14**: 3-21, Taf. I-VI.
- JÖRG, E. & ROTHAUSEN, K. (1991): Zur Schichtenfolge und Biostratonomie der Wirbeltierfundstelle Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän). - Andrias, **8**: 13-64.
- JÖRGER, V. (1987): *Saprosecans lateroplumosa* n. sp. (Gamasina, Halolaelapidae), eine neue Raubmilbenart. - Carolinea, **45**: 163-166.
- JURITZA, G. (1962): Die Libellen zweier Hochmoore des nördlichen Schwarzwaldes (Wildsee- und Hohloh-Moor bei Kaltenbronn)(Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **21**: 45-47.
- JURITZA, G. (1963): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 3. Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **22**: 107-111, Taf. I-II.
- JURITZA, G. (1964): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe. IV. Mitteilung: *Ceriagrion tenellum* (DE VILLERS) in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **23**: 71-72.
- JURITZA, G. (1964): Ein Beitrag zur subspezifischen Gliederung der *Aeschna subarctica* WALKER in Europa (Odonata, Aeschnidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **23**: 123-135, Taf. I-IV.
- JURITZA, G. (1965): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **24**: 37-39, Taf. III-IV.
- JURITZA, G. (1965): Ein Beitrag zur Kenntnis der Odonatenfauna von Nordost-Spanien, mit Bemerkungen zur Rassenfrage der *Agrion haemorrhoidalis* (VAN DER LINDEN). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **24**: 183-187.
- JURITZA, G. (1966): Über interspezifische Paarungsversuche bei Odonaten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **25**: 71-72, Taf. I-II.
- JURITZA, G. (1967): Ein Beitrag zur Kenntnis der *Boyeria irene* (FONSCOLOMBE). (Odonata, Aeschnidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26**: 149-154, Taf. I-II.
- JURITZA, G. (1970): Beobachtungen zur Ökologie und Ethologie von *Ischnura pumilio* (CHARP.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **29**: 151-153.
- JURITZA, G. & KORMANN, K. (1960): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe (Baden). 2. Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 56-57
- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **38**: 155-160, 2 Kt.
- KALKO, E. (1991): Zum Jagd- und Echoortungsverhalten der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*, KUHL, 1819) in den Rheinauen bei Karlsruhe. - Carolinea, **49**: 95-100.
- KALTENBACH, T. (1980): Beitrag zur Coleophoridenfauna Badens (Lepidoptera, Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **39**: 165-166.
- KALTENBACH, T. (1983): siehe BALDIZZONE, G. & KALTENBACH, T. - Andrias, **3**: 33-36.
- KÄMMER, F. & DIENST, M. (1982): Zum Vorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* WILLD.) in der trockenengefallenen südlichen Oberrheinaue. - Carolinea, **40**: 49-64.
- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tenebrionidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 235-238.

- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Meloidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 239-240.
- KAULE, G. (1974): Die Übergangs- und Hochmoore der Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 9-40.
- KAULE, G. (1994): siehe KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. - Caroleinea, **52**: 93-109.
- KIAUTA, B. (1963): *Lindenia tetraphylla* v.D.LIND. und *Somatochlora metallica meridionalis* - NIELSEN aus Nordweststrien (Jugoslawien) (Odonata: Gomphidae, Corduliidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 65-66.
- KIAUTA, B. & JURZITZA, G. (1972): Erstes Europäisches Symposium für Odonatologie und Gründung der „Societas Internationalis Odonatologica“ - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 185.
- KIEFER, F. (1936): Über das Vorkommen von Blattfußkrebse (Euphyllopoda) in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 255-262, 1 Taf.
- KIEFER, F. (1953): Ruderfußkrebse aus dem Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“ Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 4-11.
- KIEFER, F. (1954): Zur Kenntnis der freilebenden Ruderfußkrebse des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 86-92.
- KIEFER, F. (1956): Ein neuer Fund von *Lartetia rhenana* R. LAIS. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 125.
- KIEFER, F. (1957): Höchst-, Mittel- und Niedrigwasserstände des Bodensees im Zeitraum 1871-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 39-43.
- KIEFER, F. (1957): Die Grundwasserfauna des Oberrheingebietes mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 65-91.
- KIEFER, F. (1958): Verzeichnis der in Südwestdeutschland gefundenen freilebenden Ruderfußkrebse. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 46-60.
- KIEFER, F. (1959): Unterirdisch lebende Ruderfußkrebse vom Hochrhein und Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 42-52.
- KIEFER, F. (1959): Über einige Ruderfußkrebse aus Südchile. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 53-58.
- KIEFER, F. (1971): Konservator Dr. JOSEPH HAUER zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 5-8.
- KIEFER, F. (1974): Beitrag zur Kenntnis der *castor*-Gruppe der Gattung *Diaptomus* (sens. restr.) (Crustacea, Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 209-218.
- KIEFER, F. (1974): Zwei neue Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus Malaysia. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 219-222.
- KIEFER, F. (1976): Revision der *robustus-vernalis*-Gruppe der Gattung *Acanthocyclops* KIEFER (Crustacea, Copepoda) (Mit eingehender Beurteilung des „*Cyclops americanus* MARSH, 1892“). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 95-110.
- KIEFER, F. (1976): Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sandlückensystem einiger Bäche der Ostalpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 111-118.
- KIEFER, F. (1981): Ein neuer brunnenbewohnender Cyclopide (Copepoda, Cyclopoida) aus Syrien. - Andrias, **1**: 101-102.
- KIEFER, F. & MUCKLE, R. (1959): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1957. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 5-41.
- KINZELBACH, R. (1965): Ein Strandfloh, *Orchestia cavimana* HELLER, am Oberrhein. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 153-157, Taf. I.

- KISCHNICK, P. (1987): siehe BRAUN, M. & KISCHNICK, P. - *Carolinea*, **45**: 159-160.
- KLEINSTEUBER, A. (1992): Die Bärwurz (*Meum athamanticum* JACQ.) im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **50**: 67-78.
- KLEINSTEUBER, A. (1995): Ein Fund von *Crassula tillaea* in der nordbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **53**: 259-261.
- KLEINSTEUBER, A. (1996): siehe GRIESE, J. & KLEINSTEUBER, A. - *Carolinea*, **54**: 183-185.
- KLEINSTEUBER, A. & WOLF, T. (1993): *Utricularia stygia* und *Hammarbya paludosa* am Blausee bei Vogt/Kreis Ravensburg. - *Carolinea*, **51**: 107-108.
- KLEINSTEUBER, A. & WOLFF, P. (1996): *Potamogeton polygonifolius* und *Potamogeton coloratus* in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **54**: 180-182.
- KLESS, J. (1969): *Hygrotus quinquelineatus* ZETT., ein für Mitteleuropa neuer Dytiscide. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 123-125.
- KLIESCH, C., ARNOLD, A. & BRAUN, M. (1997): Fledermausquartier in einer Stollenanlage bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). - *Carolinea*, **55**: 57-64, 1 Farbtaf.
- KLIMETZEK, D. (1977): Die Ameisenfauna des Naturschutzgebietes „Mindelsee“ (Hymenoptera: Formicidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 159-171.
- KLÖTZLI, F. (1975): Zur Waldfähigkeit der Gebirgssteppen Hoch-Semiens (Nordäthiopien). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 131-147
- KLUTH, C. (1972): ADOLPH KNOP (1828-1893). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 171-177
- KNIPPER, H. (1963): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafrika der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. I. Teil. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 73-87
- KNIPPER, H. (1964): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafrika der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. II. Teil. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 7-30, Taf. I-II.
- KNOCH, D. (1995): Zum Vorkommen kalkliebender Pilze auf Gneisstandorten des südöstlichen Schwarzwaldes. - *Carolinea*, **53**: 243-250, 3 Farbtaf.
- KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. (1994): Zur Autökologie und Verbreitung des Kreuzenzian-Ameisenbläulings, *Maculinea rebeli* (HIRSCHKE, 1904). - *Carolinea*, **52**: 93-109.
- KOENIGSWALD, W. v. (1985): Der dritte Lemurenrest aus dem mitteleozänen Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **42**: 145-148.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Apatemyiden-Skelette aus dem Mitteleozän von Messel und ihre paläobiologische Aussage. - *Carolinea*, **45**: 31-35.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Ein zweites Skelett von *Buxolestes* (Pantolestidae, Protheria, Mammalia) aus dem Mitteleozän von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **45**: 36-42.
- KÖGEL, F. (1983): Neue und seltene Wasserwanzen (Heteroptera: Amphibiocorisae und Hydrocorisae) aus dem nördlichen Oberrheintiefland. - *Carolinea*, **41**: 101-104.
- KOHLER, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 3-18, Taf. I.
- KOHLER, A. (1975): Submerse Makrophyten und ihre Gesellschaften als Indikatoren der Gewässerbelastung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 149-159.
- KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. (1995): Feinanalytische Untersuchungen zum Vegetationsmosaik zweier subalpiner Buckelweiden. - *Carolinea*, **53**: 113-125.



- KORMANN, K. (1960): siehe JURZITZA, G. & KORMANN, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 56-57
- KORMANN, K. (1965): Libellensammlung nach modernen Gesichtspunkten (Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 189-191, Taf. II.
- KORMANN, K. (1966): Beitrag zur Odonatenfauna der Umgebung von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 133-139.
- KORMANN, K. (1971): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 147-152.
- KORMANN, K. (1973): Beitrag zur Syrphidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Syrphidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 143-158.
- KORMANN, K. (1983): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae), 2. - Andrias, **3**: 25-28.
- KORNECK, D. (1960): Beobachtungen an Zwergbinsengesellschaften im Jahr 1959. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 101-110.
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. I. Das Molinietum medioeuropaeum - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 55-77
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Die Molinieten feuchter Standorte - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 165-190.
- KORNECK, D. (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. III. Kontaktgesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 19-44.
- KORNECK, D. (1975): Das Narduretum lachenalii, eine neue Thero-Airion-Assoziation. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 161-166.
- KORNECK, D. (1988): Die Felsenleimkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaft (*Sileno rupestris*-Sedum annui) in den Südvogesen. - *Carolinea*, **46**: 139-140.
- KORNECK, D. & FINK, H. G. (1979): Der Schweizer Alant (*Inula helvetica* WEBER) noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 53-59.
- KOSTENBADER, H. (1994): siehe BRECHTEL, F. & KOSTENBADER, H. - *Carolinea*, **52**: 75-81.
- KOUTSAFTIKIS, A. (1973): Nachträge, Ergänzungen und Ökologisch-Zoogeographische Berichtigungen der Nymphalidae-Fauna Griechenlands (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 169-177
- KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. (1975): Die geographischen Rassen der Waldgesellschaften in vegetationskundlicher, walddeschichtlicher und waldbaulicher Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 167-185.
- KRAL, F. (1975): Waldgeschichtliche Analyse der geographischen Rassenbildung. Siehe KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 171-174.
- KRAMER, F. (1942): Die Verbreitung von *Linum perenne* L. in der Rheinebene; ein badischer Standort auf Flugsand. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 110-122.
- KRAUSE, W. (1975): Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Baggerseen der Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 187-199.
- KRAUSE, W. (1985): Über die Standortansprüche und das Ausbreitungsverhalten der Stern-Armleuchteralge *Nitellopsis obtusa* (DESVAUX) J. GROVES. - *Carolinea*, **42**: 31-42.
- KRAUSE, W. & GRÜTTNER, A. (1990): Über einen Fund der *Chara tenuispina* im Bodenseegebiet mit Blick auf die Gesamtverbreitung der Pflanze. - *Carolinea*, **48**: 31-36.

- KRELL, F.-T. (1993): Taxonomie auf der Grundlage der Evolutionsbiologie. - *Carolinea*, Beih., **8**: 53-59.
- KRIEGER-WOLFF, E. & WÜLKER, W. (1971): Chironomiden (Diptera) aus der Umgebung von Freiburg i. Br. (mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Chironomus*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 133-145.
- KRISTAN-WOLLMAN, E. (1965): Revision der Arbeit von K. FRENTZEN: Funde von Holothuri- en-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebietes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 17-20.
- KRÜSS, A. & ROHDE, U. (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten „Sandhausener Dünen“ - *Carolinea*, **48**: 109-120.
- KÜBLER-THOMAS, M. (1994): Extensivierung zum Schutz von Ackerwildkräutern. - *Carolinea*, **52**: 35-44.
- KÜBLER-THOMAS, M. & THOMAS, P. (1989): Über ein Vorkommen von *Teucrium scordium* und *Ophioglossum vulgatum* am östlichen Hochrhein. - *Carolinea*, **47**: 147-148.
- KÜHLWEIN, H. & OBERDORFER, E. (1957): PAUL STRICKER zum Gedächtnis. 22.9.1878 - 24.12.1956. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 3-4.
- KUHN, O. (1937): Bemerkungen zur Entstehung und Gliederung des oberen Keupers in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 156-160.
- KUNZ, H. (1956): *Ranunculus polyanthemophyllus* KOCH et HESS, *Neslia apiculata* FISCHER et MEYER und *Callitriche obtusangula* LE GALL in Südbaden. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 52-55.
- KÜPPERS, P. V. (1973): siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 97-121.
- KÜPPERS, P. V. (1974): siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 129-156.
- KÜPPERS, P. V. (1974): Eine Rasse von *Graphium agesilaus* GUERIN & PERCHERON, 1835 (Lep. Papilionidae) aus Nord-Peru. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 157-161.
- KÜPPERS, P. V. (1977): B) Zur Problematik der BATES'schen Mimikry bei *Papilio memnon* L. und seinen „Vorbildern“ Siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 134-151.
- KÜPPERS, P. V. (1977): Zur taxonomischen Neuorientierung der Adelidae Deutschlands (Adeliden-Studien I). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 239-246.
- KÜPPERS, P. V. (1978): Neue und wenig bekannte *Delias* (Lepidoptera, Pieridae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 181-191.
- KÜPPERS, P. V. (1981): siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, Beih., **4**: 1-282.
- KUSS, S. E. (1955): Die stratigraphische Verteilung der altpleistocänen Fauna aus dem Tonlager von Jockgrim in der Pfalz. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 93-100.
- KUSS, S. E. (1958): Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 166-173.
- KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 10. Die Hymenopteren. - *Carolinea*, **45**: 135-146.
- LAIS, R. (1937): Nachneolithische Ablagerungen „auf dem Berg“ bei Munzingen am Tuniberg (Breisgau). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 174-216.
- LANG, G. (1952): Späteiszeitliche Pflanzenreste in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 89-110, Taf. II-V.

- LANG, G. (1954): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. I. Der Hotzenwald im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 3-42, Taf. I-II.
- LANG, G. (1955): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. II. Das absolute Alter der Tannenzeit im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 24-31.
- LANG, G. (1955): siehe DAUBER, A., FIETZ, A. & LANG, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 43-56.
- LANG, G. (1958): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. III. Der Schurmsee im Nordschwarzwald. Ein Beitrag zur Kiefernfrage. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 20-34.
- LANG, G. (1973): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. IV. Das Baldenwegermoor und das einstige Waldbild am Feldberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 31-51.
- LANG, G. (1975): Palynologische, großrestanalytische und paläolimnologische Untersuchungen im Schwarzwald, ein Arbeitsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 201-208.
- LATTIN, G. DE (1959): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Cynaeda* Hb. (Lepid., Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 106-111.
- LATTIN, G. DE (1963): Über die Arten der *Ethmia pusiella* L.-Gruppe (Lepid.-Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 45-64, Taf. II-V.
- LAYER, H.-G. (1962): Der Albtalwind. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 19-31.
- LEHN, H. (1959): Zur Dynamik im Hypolimnion des Überlinger Sees (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 75-86.
- LEHN, H. (1960): Biologische Voruntersuchungen für die Bodenseewasserversorgung in der Versuchsfilterstation Sipplingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 17-55.
- LEHN, H. (1968): Litorale Aufwuchsalgen im Pelagial des Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 97-100.
- LEININGER, H. (1936): Naturschutz und Schule. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 205-210.
- LEININGER, H. (1951): Über Bienen, Grab-, Weg-, Faltenwespen und Ameisen aus dem Badischen Oberrheingebiet (Hym. aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 113-136.
- LEOPOLD, M., MUNK, W. & TRUNKO, L. (1990): Erster Nachweis von Landsäugetierresten im marinen Mittel-Oligozän des Mittleren Oberrheingrabens bei Eschbach, Pfalz, BRD. - *Carolinea*, **48**: 13-20, 1 Taf.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 70-77
- LINCK, O. (1965): Eine weitere Crinoide (*Entrochus multifurcatus* n.sp.) aus dem Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 31-35, Taf. II.
- LINGENHÖLE, A. (1985): Zucht und Flugverhalten von *Lemonia taraxaci* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER) (Lepidoptera). - *Carolinea*, **43**: 124-125.
- LINK, F. G. (1989): siehe WOLF, R. & LINK, F. G. - *Carolinea*, Beih., **6**: 3-83.
- LINSENMAIR, K. E. (1994): siehe FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. - *Andrias*, **13**: 169-178.
- LINSENMAIR, K. E. (1994): siehe FLOREN, A. & LINSENMAIR, K. E. - *Andrias*, **13**: 23-28.
- LIONS, J.-C. (1986): siehe WAUTHY, G., VERA, H., LIONS, J.-C., SCHONNE, E. & DENÈGRE, M. - *Andrias*, **5**: 15-20.

- LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1959): Physiologie und Ökologie der Felsflurvegetation auf dem Isteiner Klotz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 144-174, Taf. IV-VIII.
- LITZELMANN, M. (1959): siehe LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 144-174.
- LODEMANN, W. (1960): Die „Entfärbungsbänderung“ im Trochitenkalk (mo<sub>1</sub>) von Nordbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 10-16.
- LOEHNERT-BALDERMANN, E. (1992): siehe WOLF, R. & LOEHNERT-BALDERMANN. - *Carolinea*, **50**: 177-206.
- LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. (1993): 1992: 14 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 129-158.
- LÖFFLER, H. (1961): Grundwasser- und Brunnenostracoden aus Südwestdeutschland und den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 31-42.
- LÖFFLER, H. (1977): Fischereibiologische Bewertung der Großen Lauter, einem Forellenbach der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 81-89.
- LOHMEYER, W. (1975): Zur Kenntnis der anthropogenen Flora und Vegetation des Tomberges bei Rheinbach im Rhein-Siegkreis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 209-213.
- LÖSING, J. (1994): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **52**: 123-150.
- LÖSING, J. (1995): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **53**: 263-288.
- LÖSING, J. (1996): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **54**: 197-216.
- LÖSING, J. (1997): siehe WOLF, R., LÖSING, R. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **55**: 125-146.
- LOTTER, A. F. & HÖLZER, A. (1989): Spätglaziale Umweltverhältnisse im Südschwarzwald: Erste Ergebnisse paläolimnologischer und paläoökologischer Untersuchungen an Seesedimenten des Hirschenmoores. - *Carolinea*, **47**: 7-14, 2 Taf.
- LUDEMANN, T. (1994): Zum Samenvorrat von Waldböden im Feldberggebiet. - *Carolinea*, **52**: 45-60.
- LUDWIG, H.W., BECKER, N. & RAMBOW, C. (1979): Die Süßwassermeduse *Craspedacusta sowerbii* (Hydrozoa: Limnomedusae) im Rhein-Neckar-Gebiet. Heidelberger Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Gebiets. Nr. 1. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 141-153.
- LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbaches im südlichen Odenwald. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- LUDWIG, W. (1968): Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 21-25.
- LUDWIG, W. (1995): Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) in Hessen und einigen Nachbargebieten. - *Carolinea*, **53**: 13-16.
- LUSSI, H. G. (1970): siehe EBERT, G. & LUSSI, H. G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 91-94.
- MACHULE, M. (1966): siehe BEHR, O., HRUBY, J. & MACHULE, M. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 3-41.
- MACHULE, M. (1967): Dem Gedächtnis des Lichenologen ERICH PUTZLER. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 75.
- MADER, D. (1985): Entstehung des germanischen Buntsandsteins. - *Carolinea*, **43**: 5-60.
- MÄGDEFRAU, K. (1937): Lebensspuren fossiler „Bohr“-Organismen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 54-67, Taf. IV-VI.
- MÄGDEFRAU, K. (1968): KARL FRIEDRICH SCHIMPER. Ein Gedenken zu seinem 100. Todestag. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 3-20.

- MAHNERT, V. (1994): siehe MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. - Andrias, **13**: 17-22.
- MALICKY, H. (1978): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras. Teil 7: Köcherfliegen (Trichoptera) aus Sumatra und West-Neuguinea. I. Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Stenopsychidae, Goeridae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **37**: 159-173.
- MALSCH, W. (1953): Die Bodenwindverhältnisse in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **12**: 120-127.
- MALSCH, W. (1954): Eine Schwedenreise zur Totalen Sonnenfinsternis am 30. Juni 1954. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **13**: 71-79, Taf. I.
- MALSCH, W. (1960): Die Totale Sonnenfinsternis vom 2. Oktober 1959. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 3-9, Taf. I.
- MALZACHER, P. (1973): Eintagsfliegen des Bodenseegebietes (Insecta, Ephemeroptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 123-142.
- MALZACHER, P. (1976): Nachtrag zur Eintagsfliegenfauna des Bodenseegebietes. - Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Caenis* (Insecta, Ephemeroptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **35**: 129-136.
- MÄLZER, H. (1965): Professor Dr.-Ing. HEINRICH MERKEL †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **24**: 125-126.
- MÄLZER, H. (1969): Die Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts der Universität (TH) Karlsruhe in den Jahren 1965 bis 1967. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **28**: 5-8.
- MÄLZER, H. (1970): Die Erdbebenwarte Karlsruhe, Tätigkeit in den Jahren 1968-1970 und ihre Stellung im internationalen Stationsnetz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **29**: 103-106.
- MANDL, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cicindelidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 231-232.
- MANNHEIMS, B. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tipulidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 309-311.
- MARKSTEIN, B. (1975): siehe SUKOPP, H., MARKSTEIN, B. & TREPL, L. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **34**: 371-385.
- MARTHALER, H. (1988): siehe LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- MARTIN, O. & MUNK, W. (1992): Erster Nachweis eines Planorbiden (Mollusca, Gastropoda) aus dem Ölschiefer von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **50**: 171-172.
- MARTINI, R. & RAQUÉ, K. F. (1986): Zwei bedrohte Roßbameisen-Arten in Heidelberg. - *Carolinea*, **44**: 171-172.
- MARTIUS, C. (1994): Termite nests as structural elements of the Amazon floodplain forest. - Andrias, **13**: 137-150.
- MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. (1994): Terrestrial arthropods colonizing an abandoned termite nest in a floodplain forest of the Amazon River during the flood. - Andrias, **13**: 17-22.
- MASCHWITZ, U. (1994): siehe ROSCISZEWSKI, K. & MASCHWITZ, U. - Andrias, **13**: 179-187
- MASCHWITZ, U. (1994): siehe FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. - Andrias, **13**: 169-178.
- MATHEIS, W. (1985): Discomyceten aus Süddeutschland. II. Raum Homberg - Triberg (mittlerer Schwarzwald). - *Carolinea*, **43**: 61-64.

- MATTHES, W. & SCHMIDT, K. (1990): Zwei für die Fauna der Bundesrepublik Deutschland neue „Riesenschlupfwespen“ (*Megarhyssa gigas* und *M. perlata*, Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Carolinea*, **48**: 139-144, 2 Farbtaf.
- MAYER, E. & BECK, L. (1983): Schlangennachzuchten im Vivarium 1982. - *Carolinea*, **41**: 137-139.
- MAYER, G. (1951): Palaeontologische Notizen aus dem Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 105-112, Taf. II-III.
- MAYER, G. (1952): Bisher bekannte und neue Vorkommen der Trias-Lebensspur *Rhizocoralium jenense* ZENKER. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 111-115, Taf. VI-VII.
- MAYER, G. (1953): Bohnerzgräberei bei Diedelsheim (Bretten) im 17. Jhd. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 119.
- MAYER, G. (1954): Ein bemerkenswerter Flugsandaufschluß bei Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 44-46.
- MAYER, G. (1954): Ein neues *Rhizocoralium* aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 80-83, Taf. III.
- MAYER, G. (1955): Eine mäandrierende Kriechspur aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 22-23, Taf. VII.
- MAYER, G. (1955): Eine interessante Schichtfläche aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 114-118, Taf. IV-V.
- MAYER, G. (1956): Eine Schichtfläche mit Biocoenosen, Strömungsmarken und Lebensspuren aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 6-10, Taf. II-III.
- MAYER, G. (1956): Bergbauliche Versuche und Unternehmungen bei Langenbrücken und Mingolsheim im vorigen Jahrhundert. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 126-127
- MAYER, G. (1957): Beobachtungen an einer *Arenicolites*-Platte. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 37-38, Taf. V.
- MAYER, G. (1962): Ölschieferbergbau bei Ubstadt im vorigen Jahrhundert. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **21**: 191-203.
- MAYER, G. (1964): Notizen über Pleistozänaufschlüsse im Stadtgebiet von Bruchsal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 137-139.
- MAYER, G. (1966): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. I. Eine paläontologische Ausgrabung bei Oos 1837/38. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 75-91.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. II. Aus der Frühzeit der pleistozänen Fossilfundstellen Mauer bei Heidelberg. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 77-83.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. III. Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* (*kirchbergensis*) (JÄGER) var. *brachycephalus* SCHROEDER von Daxlanden und seine Geschichte. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 157-163.
- MAYER, G. (1972): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. IV. Die Evakuierung des Naturalienkabinetts nach Ansbach und der Aufenthalt C. C. GMELINS in Erlangen (1795-1797). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 161-169.
- MAYER, G. (1973): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. V. Akquisition der Naturalienkabinette zu Meersburg (1803) und Sankt Blasien (1807). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 195-203.

- MAYER, G. (1974): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. VI. CARL CHRISTIAN GMELINS Spanienreise im Jahre 1789. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 233-252.
- MAYER, G. (1977): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. VII. Eine Paris-Reise CARL CHRISTIAN GMELINS im Jahre 1810 und dessen Beziehungen zu gelehrten Gärtnern, Naturalienhändlern und Besuchern dieser Stadt. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 45-50.
- MAYER, G. (1977): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. VIII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1838. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 51-60.
- MAYER, G. (1977): siehe ROESLER, R.U., TOBIEN, H. & MAYER, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 25-31.
- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. IX. Eine Aktion zur Gewinnung Öhninger Fossilien 1854-1860. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 5-30.
- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. X. Das Naturalienkabinett des Erbprinzen FRIEDRICH (1708 bis 1732). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 31-36.
- MAYER, G. (1979): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. XI. Pfarrer L. G. SCRIBA, Korrespondent und Naturalienlieferant der Markgräfin Caroline Luise von Baden 1768-1782. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 5-10.
- MAYER, G. (1980): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. XII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1858. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 11-18.
- MAYER, G. (1982): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. XIII. Von Dienern und Präparatoren des Naturalienkabinetts. - *Carolinea*, **40**: 113-124.
- MAYER, G. (1983): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. XIV. Custos Dr. C. HILGER u. das Naturalienkabinett unter seiner Leitung 1894-1899. - *Carolinea*, **41**: 142-150.
- MAYER, G. (1996): siehe TRUNKÓ, L. & MAYER, G. - *Carolinea*, **54**: 175-176.
- MAYER, H. (1975): Waldbauliche Bedeutung der geographischen Rassen von Waldgesellschaften. Siehe KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 175-185.
- MEIER-BROOK, C. (1987): siehe FRIEDRICH, G. & MEIER-BROOK, C. - *Carolinea*, **45**: 99-106.
- MELBER, A. (1988): *Tropidothorax sternalis* (DALLAS, 1852), eine neue Wanzenart für Italien. - *Carolinea*, **46**: 147-148.
- MENDES, L. F. (1983): New data on the Lepismatidae (Apterygota, Zygentoma) from the Cape Verde Islands. - *Andrias*, **3**: 5-8.
- MENNE, B. (1991): siehe JACOBI, K. & MENNE, B. - *Carolinea*, **49**: 129-130.
- MERKEL, H. (1956): Bericht über die Erdbebenwarte im Geodätischen Institut der Techn. Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1952-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 3-5, Taf. I.
- MERKEL, H. (1960): Überblick über die Tätigkeit der Erdbebenwarte der Technischen Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1956-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 130-131.
- MERKEL, H. (1962): Geschichte und Aufgaben der Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts und des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Technischen Hochschule Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 7-17

- MERKEL, H. (1965): Überblick über die Arbeiten der Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts und des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Technischen Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1961 bis 1964. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 123-126.
- MERKEL, H. (1997): Verbreitung und Bestandsentwicklung der Wasseramsel im Flußsystem der Alb im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **55**: 95-104, 1 Farbtaf.
- MICKLICH, N. (1985): Biologisch paläontologische Untersuchungen zur Fischfauna der Mes-seler Ölschiefer (Mittel-Eozän, Lutetium). - *Andrias*, **4**: 3-171.
- MITTMANN, H.-W. (1982): siehe BECK, L. & MITTMANN, H.-W. - *Carolinea*, **40**: 65-90.
- MITTMANN, H.-W. (1994): siehe HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- MITTMANN, H.-W. (1997): siehe BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. & MITTMANN, H.-W. - *Andrias*, **10**: 1-230.
- MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. (1985): Ein Gerät zur Freilandbeobachtung des nächtlichen Verhaltens von benthischen Bachtieren, mit Befunden aus der Gattung *Hydropsyche* (Trichoptera, Insecta). - *Carolinea*, **42**: 121-128.
- MONTFORT, F. (1971): HERMANN LIENIG †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 169-170.
- MOOR, M. (1975): Die soziologisch-systematische Gliederung des Hirschzungen-Ahornwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 215-223.
- MORAVEC, J. (1975): Die Untereinheiten der Assoziation. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 225-232.
- MOUCHA, J. & CHVALA, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tabanidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 313-315.
- MOUCHA, J. & HRADSKY, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Asilidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 317-317
- MROCKOWSKI, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermestidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 223-226.
- MUCKLE, R. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet., **7**: 5-109, Taf. I-II.
- MUCKLE, R. (1951): Dr. rer. nat. h.c. FRIEDRICH KIEFER. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 88-89.
- MUCKLE, R. (1959): siehe KIEFER, F. & MUCKLE, R. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 5-41.
- MUCKLE, R. (1972): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1962. II. Jahreszeitliches Auftreten der Arten 1957-1962 und Tiefenverteilung A. Vorbemerkung, *Diaphanosoma brachyurum* und *Leptodora kindtii* (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 103-131.
- MUCKLE, R. & DILLMANN-VOGEL, H. (1976): Die bisexuelle Fortpflanzung in der *Daphnia longispina*-Gruppe des Bodensee-Obersees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 81-94.
- MÜLLER, G. (1967): Der Weißstorchbestand in Baden-Württemberg 1963-1965. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 141-148.
- MÜLLER, G. (1968): siehe EBERT, G. & MÜLLER, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 51-53.
- MÜLLER, G. (1969): siehe BAUER, W. & MÜLLER, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 33-52.
- MÜLLER, G. (1972): Aus der Ornithologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 184-185.
- MÜLLER, G. (1979): Kommentiertes Verzeichnis der vogelkundlichen Literatur in Baden bis zum Jahr 1943. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 71-111.



- MÜLLER, G. (1980): MAX RITZI †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 181-182.
- MÜLLER, G. (1997): Extrem frühe Brut der Wasserramsel am Rand des Nordschwarzwaldes. - *Carolinea*, **55**: 119.
- MÜLLER, K. (1936): Der badische Wald in der badischen Landschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 211.
- MÜLLER, T. (1961): Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 15-21.
- MÜLLER, T. (1961): Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 111-122.
- MÜLLER, T. (1967): Die geographische Gliederung des Galio-Carpinetum und des Stellario-Carpinetum in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 47-65.
- MÜLLER, T. (1975): Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 233-249.
- MÜLLER, T. (1995): Die synsystematische Stellung des Aceri-Fagetum. - *Carolinea*, **53**: 175-184.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1958): Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im Württembergischen Oberland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 88-165, Taf. I.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1960): Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 60-100.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1936): Zur Kenntnis der Tertiärflora der Rhön. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 89-128, Taf. 1-6.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1951): Über seltene und ausgestorbene Salzpflanzen der Wetterau. Ein Beitrag zur Geschichte der rhein-mainischen Halophyten-Flora. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 35-43, Taf. II-III.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1985): Pollenanalytische Untersuchungen des altpleistozänen Tonlagers von Jockgrim (Rheinpfalz). - *Carolinea*, **42**: 9-29, 2 Taf.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1986): Der Cyanophyceen-Bewuchs der Furchen- oder Hirnsteine des Bodensees. - *Carolinea*, **44**: 51-60.
- MÜNCH, W. D. (1983): 100 Jahre Kiesabbau in der nordbadischen Rheinebene (Regierungsbezirk Karlsruhe). - *Carolinea*, **41**: 9-20.
- MUNDLOS, R. (1987): siehe URLICHS, M. & MUNDLOS, R. - *Carolinea*, **45**: 12-30.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1987): *Rhizocorallium* als Begleiter der Bruchsaler Ceratiten-Pflaster (SW-Deutschland; Mitteltrias, Oberer Muschelkalk, *evolutus*-Zone). - *Carolinea*, **45**: 7-11.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1990): Zur Wohnkammerv Erfüllung bei Ceratiten aus dem germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias). - *Carolinea*, **48**: 7-12.
- MUNK, W. (1990): siehe LEOPOLD, M., MUNK, W. & TRUNKÓ, L. - *Carolinea*, **48**: 13-20.
- MUNK, W. (1990): siehe TRUNKÓ, L. & MUNK, W. - *Carolinea*, **48**: 21-30.
- MUNK, W. (1992): siehe MARTIN, O. & MUNK, W. - *Carolinea*, **50**: 171-172.
- MÜNKER, W. (1936): Reklame in der Landschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 214-218, Taf. 1-3.
- MURAWSKI, H. (1957): Periglaziale Klimazeugen des Pleistozäns im Raum von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 59-64.
- MUSCHKETAT, L. (1996): siehe HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L. GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. (1996): Aktionsgebietsgrößen des Schwarzspechts im Winterhalbjahr. - *Carolinea*, **54**: 188-190.

- MUSCHKETAT, R. (1996): siehe MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. - *Carolinea*, **54**: 188-190.
- NAGEL, A. (1997): siehe ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- NÄHRIG, D. (1991): Zur Phänologie und Ökologie der *Enoplophagata ovata*-Gruppe (Araneae: Theridiidae). - *Carolinea*, **49**: 131-133.
- NEUBERT, H. (1985): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland, II. Erstfund von *Trichia erecta* REX. - *Carolinea*, **43**: 117-119, 1 Farbtaf. als Beilage.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1986): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland, III. Liste der bislang bekannten Arten. - *Carolinea*, **44**: 61-66, 7 Farbtaf.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1987): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland IV. Schlüssel zu den Ordnungen und den Familien, Gattungen und Arten der Ordnung Trichiales. - *Carolinea*, **45**: 51-76, 4 Farbtaf.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1989): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland V. (mit Berücksichtigung der Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **47**: 25-46, 8 Farbtaf.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1991): Myxomyceten aus Deutschland VII. (Mit Berücksichtigung der Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **49**: 13-26, 8 Farbtaf.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1992): Myxomyceten aus Deutschland VIII. (Mit Berücksichtigung von Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **50**: 27-44, 5 Farbtaf.
- NEUGEBAUER, H. (1988): siehe LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- NICOLESCU, E. V. (1977): Amselma, eine neue androkoniale Bildung im Thorax von Schmetterlingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 237
- NIELSEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Limoniidae (Diptera, Nematocera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 305-307
- NOBIS, M. (1995): siehe KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. - *Carolinea*, **53**: 113-125.
- NOIRFALISE, A. & THILL, A. (1975): Les Boisements d'Epicéa et leurs Types pédobotaniques en Ardenne (Belgique). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 251-257.
- NOWOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 46-56.
- NOWOTNY, W. (1989): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - *Carolinea*, **47**: 25-46.
- NOWOTNY, W. (1991): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - *Carolinea*, **49**: 13-26.
- NOWOTNY, W. (1992): siehe NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. - *Carolinea*, **50**: 27-44.
- NÜBEL-REIDELBACH, E. (1994): Taxonomie und Systematik der Gattung *Tectocephus* BERLESE, 1895 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **12**: 3-94.
- NÜBEL-REIDELBACH, E. & WOAS, S. (1992): Einige basale Arten der cepheiden und der pterogasterinen Entwicklungslinie der Höheren Oribatiden (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 75-119.
- OBERDORFER, E. (1936): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Pflanzenformen des Oberrheingebietes. Zur Frage natürlicher Buchenwaldgesellschaften in Baden. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 49-88.
- OBERDORFER, E. (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 121-123.

- OBERDORFER, E. (1937): Die Bedeutung des Naturschutzgebietes am Michelsberg (Kaiserberg) bei Untergrombach. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 124-142, Taf. IX.
- OBERDORFER, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Erläuterung der vegetationskundlichen Karte Bühlertal-Herrenwies (Bad. Meßtischbl. 73). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 149-270, 1 Kt. (als Beilage), Taf. I-VIII.
- OBERDORFER, E. (1949): Die Lage des Naturschutzes nach dem Kriege. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 19-21.
- OBERDORFER, E. (1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachschlucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 22-60, 1 Kt.
- OBERDORFER, E. (1950): Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 29-98, Taf. V-XII.
- OBERDORFER, E. (1951): Die Naturschutzarbeit in Nordbaden 1948/50. Herrn Oberregierungsrat H. SCHURHAMMER zum 70. Geburtstag gewidmet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 57-61.
- OBERDORFER, E. (1951): Zweihundert Jahre Landessammlungen für Naturkunde. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 69-74.
- OBERDORFER, E. (1952): Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 12-36.
- OBERDORFER, E. (1952): Über hundert Jahre Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 59-62.
- OBERDORFER, E. (1952): Die Wiesen des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 75-88.
- OBERDORFER, E. (1953): HERMANN SCHURHAMMER † 1881-1952. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 1-3.
- OBERDORFER, E. (1953): Der europäische Auenwald. Eine soziologische Studie über die Gesellschaften des Alneto-Ulmion. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 23-70.
- OBERDORFER, E. (1953): siehe HAUER, J., JÖRG, E. & OBERDORFER, E. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 128-133.
- OBERDORFER, E. (1954): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Nordbaden. Die Naturschutzarbeit 1951/54. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 105-108.
- OBERDORFER, E. (1954): Kurze Bemerkung zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebiets bei Ettlingen - Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 109-110.
- OBERDORFER, E. (1956): Übersicht der Süddeutschen Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 11-29.
- OBERDORFER, E. (1957): Das Papaveretum argemone, eine für Süddeutschland neue Getreideunkrautgesellschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 47-51.
- OBERDORFER, E. (1957): siehe KÜHLWEIN, H. & OBERDORFER, E. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 3-4.
- OBERDORFER, E. (1959): Borstgras- und Krummseggen-Rasen in den Alpen. Ein Beitrag zur Frage der Abgrenzung der Nardo-Callunetea gegen die Caricetea curvulae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 117-143.
- OBERDORFER, E. (1962): Zur Eröffnung des neu eingerichteten Vivariums und der neuen Schausäle mit den Tertiärfunden von Höwenegg sowie Tiergruppen der Heimat in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe am 23. März 1962. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 83-86.

- OBERDORFER, E. (1964): Herrn Professor Dr. JOHANN HRUBY zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 3-5.
- OBERDORFER, E. (1964): Der insubrische Vegetationskomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und der Südschweiz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 141-187.
- OBERDORFER, E. (1965): Pflanzensoziologische Studien auf Teneriffa und Gomera (Kanarische Inseln). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 47-104, Taf. V-VII.
- OBERDORFER, E. (1966): Zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde und des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 105-117
- OBERDORFER, E. (1969): MAX AUERBACH zum Gedächtnis, 26.1.1879 - 21.11.1968. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 3-4.
- OBERDORFER, E. (1971): Zur Syntaxonomie der Trittpflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 95-111.
- OBERDORFER, E. (1972): Die synsystematische Gliederung xerothermer Saum-, Busch- und Waldgesellschaften. Bemerkungen zu P. JAKUCS: Dynamische Verbindungen der Wälder und Rasen, Akad.-Verlag, Budapest 1972. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 87-90.
- OBERDORFER, E. (1974): *Galium lucidum* ALL. am Schwarzwaldrand des südlichen Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 107-111.
- OBERDORFER, E. (1983): Einige Bemerkungen zu Vegetationsstrukturen im östlichen Nordamerika, in Oahu (Hawaii) und Mitteljapan. - Andrias, **2**: 53-63.
- OBERDORFER, E. & HOFMANN, A. (1967): Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nordapennin (Wälder, Heiden, Wiesen und Unkrautfluren). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 83-139.
- OBERDORFER, E. & LANG, G. (1952): Vegetationskundliche Karte des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe. - [Karte 1:25.000, erschienen als Beilage zu: Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13** (1954).]
- OEHLER, T. (1958): Verfahren und Gerät zur Messung von Regentropfen und Schneeflocken. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 3-7, Taf. I-IV.
- OESAU, A. (1995): Zum Auftreten des Erdmandelgrases *Cyperus esculentus* L. bei Offenburg (Baden-Württemberg). - Carolinea, **53**: 17-20.
- OESAU, A. & FROEBE, H. A. (1972): Pflanzensoziologische Beobachtungen an hochwasserbeeinflussten Kulturflächen im nördlichen Oberrheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 65-86.
- OHBA, T. (1975): siehe TÜXEN, R. & OHBA, T. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 387-401.
- OLDROYD, H (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Bombyliidae, Therevidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 301-303.
- ORSCHIEDT, O. (1993): siehe WOLF, P. & ORSCHIEDT, O. - Carolinea, **51**: 9-26.
- OSTENDORP, W. (1990): Die Ursachen des Röhrichtrückgangs am Bodensee - Untersee. - Carolinea, **48**: 85-102.
- OSTENDORP, W. (1997): siehe GRETLE, T. & OSTENDORP, W. - Carolinea, **55**: 23-34.
- OSTERMANN, R. (1995): siehe SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. - Carolinea, **53**: 147-163.
- OTT, H. A. (1980): siehe HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 161-164.
- OTT, H.A. (1979): siehe RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H. A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 135-139.

- OURISSON, N. (1975): siehe CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 37-56.
- PAARMANN, W. (1994): siehe VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. - Andrias, **13**: 161-168.
- PASSERIN D'ENTREVES, P. (1983): Anmerkungen zu einigen palaearktischen Scythrinen (Lepidoptera, Scythrididae) und Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Scythris*. - Andrias, **3**: 25-32.
- PEINTINGER, M. (1986): *Ceratophyllum submersum* L., das Zarte Hornkraut, im westlichen Bodensee und Hegau. - Caroleinea, **44**: 163-164.
- PEINTINGER, M. (1988): Die Vegetation des Litzelsees bei Markelfingen (Westliches Bodenseegebiet). - Caroleinea, **46**: 17-22.
- PEINTINGER, M. (1990): Bestandsschwankungen bei seltenen Pflanzenarten in Pfeifengraswiesen des westlichen Bodenseegebietes. - Caroleinea, **48**: 69-84.
- PEINTINGER, M. (1994): Verbreitung, Rückgang und Soziologie von *Gratiola officinalis* L. am Bodensee. - Caroleinea, **52**: 25-34.
- PEINTINGER, M. (1995): Die Strandschmielengesellschaft (Deschampsietum rhenanae OBERDORFER 1957) im westlichen Bodenseegebiet - ein Vergleich von Vegetationsaufnahmen 1959 und 1993. - Caroleinea, **53**: 67-74.
- PEINTINGER, M. & PHILIPPI, G. (1993): KARL HENN † 1901-1992. - Caroleinea, **51**: 159-160.
- PEKARSKY, P. (1968): Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgruppe. *Zygaena diaphana* STGR. im südlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 117
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus SW-Arabien der Ausbeuten H. SCOTT und E. B. BRITTON 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 63-65.
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus Riad (Zentral-Arabien) der Ausbeute von Dr. E. DIEHL (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 107-110.
- PETERSEN, G. (1962): Beitrag zur Kenntnis der südeuropäischen Tineiden (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 205-220.
- PETERSEN, G. (1964): Tineiden von Karatschi (Pakistan), Fars (SW-Iran) und den Bahrein-Inseln (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 111-122.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 91-124.
- PHILIPPI, G. (1960): Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 138-187
- PHILIPPI, G. (1963): Zur Gliederung der Flachmoosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 113-135.
- PHILIPPI, G. (1967): Zur Kenntnis des Wassermooses *Cinclidotus danubicus* SCHIFFN. et BAUMGARTN. und seiner Verbreitung in Europa. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 77-81.
- PHILIPPI, G. (1968): Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydrophiler Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 61-81.
- PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triquetus*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 9-18.
- PHILIPPI, G. (1970): Vorkommen basi- und neutrophiler Pflanzen im Buntsandsteingebiet des Nordschwarzwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 17-23.
- PHILIPPI, G. (1970): *Calamagrostis phragmitoides* HARTM., das Purpureitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 107-110.

- PHILIPPI, G. (1971): Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 9-47
- PHILIPPI, G. (1971): Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flug-sandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 113-131.
- PHILIPPI, G. (1972): Die Moosvegetation der Wälder in der Rheinaue zwischen Basel und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 5-64.
- PHILIPPI, G. (1973): Zur Kenntnis einiger Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 53-95.
- PHILIPPI, G. (1974): Verbreitung, Ökologie und Soziologie des Laubmooses *Brotherella lorentziana* (MOL.) LOESKE in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 41-53.
- PHILIPPI, G. (1975): Quellflurgesellschaften der Allgäuer Alpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 259-287
- PHILIPPI, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 71-114.
- PHILIPPI, G. (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. - *Carolinea*, **40**: 15-48.
- PHILIPPI, G. (1983): Epiphytische Moosvegetation des Gardasee-Gebietes. - *Andrias*, **2**: 23-52.
- PHILIPPI, G. (1985): *Potamogeton x zizii* KOCH ex ROTH, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. - *Carolinea*, **42**: 139-142.
- PHILIPPI, G. (1986): Die Moosvegetation auf Buntsandsteinblöcken im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - *Carolinea*, **44**: 67-86.
- PHILIPPI, G. (1986): JOSEF SCHMITHÜSEN †. - *Carolinea*, **44**: 183-184.
- PHILIPPI, G. (1987): Die Wassermoosvegetation im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - *Carolinea*, **45**: 89-98.
- PHILIPPI, G. (1988): siehe BREUNIG, T. & PHILIPPI, G. - *Carolinea*, **46**: 131-134.
- PHILIPPI, G. (1988): Zum Vorkommen des Ufer-Reitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* [HALL. f.] KOEL.) im mittleren Oberrheingebiet. - *Carolinea*, **46**: 138-139.
- PHILIPPI, G. (1993): Epiphytische Moosvegetation des südlichen Spessarts, des östlichen Odenwaldes und des angrenzenden Baulandes. - *Carolinea*, **51**: 53-74.
- PHILIPPI, G. (1993): *Thymelaea passerina* im Taubergebiet. - *Carolinea*, **51**: 108-111.
- PHILIPPI, G. (1993): siehe PEINTINGER, M. & PHILIPPI, G. - *Carolinea*, **51**: 159-160.
- PHILIPPI, G. (1995): Hainbuchen-Wälder feuchter Standorte im mittleren Oberrheingebiet. - *Carolinea*, **53**: 165-174.
- PHILIPPI, G. (1996): Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B.S.G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - *Carolinea*, **54**: 45-52.
- PINTO-DA-ROCHA, R. (1994): A new species of *Santinezia* from central Amazonia, with systematic comments on the genus (Arachnida, Opiliones, Cranidae). - *Andrias*, **13**: 29-32.
- PLATEN, R. (1985): siehe DUMPERT, K. & PLATEN, R. - *Carolinea*, **42**: 75-106.
- POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze Badens. II. Teil. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 76-103.
- POTT, R. & HÜPPE, J. (1995): Die Bedeutung der Extensivbewirtschaftung für die Pflege und Erhaltung nordwestdeutscher Hudelandschaften am Beispiel des NSG Borkener Paradies im Emstal bei Meppen (Emsland). - *Carolinea*, **53**: 99-111.
- PRINCIS, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Blattariae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 269-270.

- PROBST, W. (1974): siehe FREY, W. & PROBST, W. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **33**: 59-79.
- RAMBOW, C. (1979): siehe LUDWIG, H.W., BECKER, N. & RAMBOW, C. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **38**: 141-153.
- RAQUÉ, K. F. (1986): siehe MARTINI, R. & RAQUÉ, K. F. - Caroleina, **44**: 171-172.
- RASBACH, H. (1989): siehe BOGENRIEDER, A., RASBACH, H. & RASBACH, K. - Caroleina, **47**: 149-150.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. - Caroleina, **51**: 51-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1995): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD. in den Vogesen und dem benachbarten Deutschland. - Caroleina, **53**: 21-32, 2 Farbtaf.
- RASBACH, K. (1989): siehe BOGENRIEDER, A., RASBACH, H. & RASBACH, K. - Caroleina, **47**: 149-150.
- RASBACH, K. (1993): siehe RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. - Caroleina, **51**: 51-52.
- RASBACH, K. (1995): siehe RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. - Caroleina, **53**: 21-32.
- RAZOWSKI, J. (1957): Neue Wickler-Arten aus der Sammlung AMSEL (Lepidoptera: Tortricidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **16**: 101-104, Taf. II.
- RAZOWSKI, J. (1967): Afghanische Wickler-Arten (Lepidoptera: Tortricidae und Cochyliidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 91-108.
- REBMANN, O. (1970): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Megachile* LATREILLE (Hymenopt., Apidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **29**: 155-159.
- REICHEL, G. (1955): Untersuchungen zur Deutung von Schuttmassen des Südschwarzwaldes durch Schotteranalysen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **14**: 32-42.
- REIF, A. (1995): siehe SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. - Caroleina, **53**: 147-163.
- RENNER, F. (1983): Neues aus der *Pyrgus alveus*-Gruppe für den mitteleuropäischen Raum (Lepidoptera, Hesperidae). - Caroleina, **41**: 133-134.
- RESHÖFT, K. (1983): siehe THOMAS, W. & RESHÖFT, K. - Andrias, **3**: 71-72.
- REST, H. (1955): siehe JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **14**: 3-21.
- RIEDE, K. & DUFFNER, K. (1994): Systematik und Biogeographie nordwestamazonischer Orthopteren. - Andrias, **13**: 151-160, 4 Farbtaf.
- RIEDER, N. (1979): siehe HAVELKA, P. & RIEDER, N. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **38**: 125-129.
- RIEDER, N. (1980): siehe HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **39**: 161-164.
- RIEDER, N. (1985): siehe MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. - Caroleina, **42**: 121-128.
- RIEDER, N. & ROHRER, P. (1982): Über die Möglichkeit der Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Südwestdeutschland. - Caroleina, **40**: 91-98.
- RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H. (1979): Über das Auftreten einiger seltener Blattfußkrebse im Raum Karlsruhe (*Triops cancriformis* Bosc, *Limnadia lenticularis* (LINNAEUS), *Siphonophanes grubei* (DYBOWSKI)). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **38**: 135-139.
- RIEGER, C. (1986): Wanzen aus Malta (Insecta, Heteroptera). - Caroleina, **44**: 87-90.
- RIEGER, C. (1997): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). II. - Caroleina, **55**: 43-48.

- RIEGER, C. & GÜNTHER, H. (1982): Bemerkungen zur Gattung *Temnostethus* FIEBER 1860 in Mitteleuropa (Heteroptera, Anthocoridae). - *Carolinea*, **40**: 100-101.
- RIEPEL, O. (1980): Ein Lacertilier aus dem Eozän von Messel bei Darmstadt. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 57-69.
- RIESS, J. (1993): Artkonzept und Evolutionstheorie - ein Kommentar. - *Carolinea, Beih.*, **8**: 75-77
- RIETSCHEL, G. (1997): siehe ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- RIETSCHEL, S. (1980): Museum am Friedrichsplatz. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 5-9.
- RIETSCHEL, S. (1981): andrias - eine neue wissenschaftliche Zeitschrift. - *Andrias*, **1**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1982): carolinea - zum Geleit. - *Carolinea*, **40**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1982): In memoriam WILHELM SCHÄFER (\* 18.3.1912, † 27.7.1981). - *Carolinea*, **40**: 125-126.
- RIETSCHEL, S. (1983): *Aleurochiton petri* n.sp., eine Mottenschildlaus (Homoptera, Aleyrodina) aus dem Pliozän von Neu-Isenburg, Hessen. - *Carolinea*, **41**: 97-100.
- RIETSCHEL, S. (1983): Besucherstatistik im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **41**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1983): Massenvorkommen der Platanen-Gitterwanze *Corythucha ciliata* in Südfrankreich. - *Carolinea*, **41**: 132.
- RIETSCHEL, S. (1985): Arten-, Natur- und Umweltschutz als Problemkreis für das Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **42**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1985): Naucoriden im Mittelmeer als Modellfall für das Vorkommen von Wasserwanzen in den Solnhofener Plattenkalken. - *Carolinea*, **42**: 143-144.
- RIETSCHEL, S. (1986): 1785-1985: Das Museum am Friedrichsplatz begeht sein 200jähriges Bestehen. - *Carolinea*, **44**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1986): Eine große *Seirocrinus*-Platte im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **44**: 176-178.
- RIETSCHEL, S. (1986): Algenbewachsene Federn - eine aktuopaläontologische Beobachtung. - *Carolinea*, **44**: 165-168.
- RIETSCHEL, S. (1987): Berühren verboten, vernichten erlaubt. - *Carolinea*, **45**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1989): „Staatliches Museum“ statt „Landessammlungen“ - *Carolinea*, **47**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1990): Forschung an den Naturkundemuseen. - *Carolinea*, **48**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1992): Vor fünfzig Jahren. - *Carolinea*, **50**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1993): Gibt es eine Renaissance der naturkundlichen Sammlungen? - *Carolinea*, **51**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1993): siehe VOIGT, K. & RIETSCHEL, S. - *Carolinea*, **51**: 112-114.
- RIETSCHEL, S. (1994): siehe BECK, L. & RIETSCHEL, S. - *Carolinea*, **52**: 151-152.
- RIETSCHEL, S. (1996): Die Darstellung gegenwärtiger und historischer Landschaften im Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **54**: 5-8, 2 Farbtaf.
- RIETSCHEL, S. (1997): Der Beitrag der Naturkundemuseen zum Artenschutz. - *Carolinea*, **55**: 121-123.
- RITZI, M. (1940): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). 2. *Daphnia longispina* u. *Daphnia cucullata* (Phyllozoa) im Gnadensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **5**: 62-71, Taf. I, IIa, IIb, III.
- RITZI, M. (1940): Das Rheindelta und der „Rheinbrech“ im Bodensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **5**: 72-75, Taf. IV.
- RITZI, M. (1949): Die Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe während und nach dem Kriege. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **8** (1943/49): 16-18.



- RITZI, M. (1951): Ein Beitrag zur Ausstellungstechnik im naturwissenschaftlichen Museum. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 95-101, Taf. I.
- RITZI, M. (1952): Verzeichnis der Tauschzeitschriften nach dem Stand vom 1. Oktober 1952. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 122-129.
- RITZI, M. (1955): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. in den Jahren 1951-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 132-134.
- RITZI, M. (1958): Dr. rer. nat. h.c. JOSEF HAUER. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 87
- RITZI, M. (1961): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. in den Jahren 1955-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 3-5.
- RITZI, M. (1965): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. in den Jahren 1961-1965. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 119-121.
- RITZI, M. (1968): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1965-1968. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 119-121.
- RITZI, M. (1972): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1968 bis 1971. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 179-181.
- RITZI, M. & VOGEL, H. (1959): Ein Beitrag zur Besiedlungsdichte der Tiefenfauna im Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 65-74.
- RIXEN, J.-U. (1965): Einige Turbellarienfundes aus dem Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 137-141.
- RÖBEN, P. (1970): Zur Crustaceenfauna (freilebende Cyclopoida, Calanoida und Cladocera) der Heidelberger Umgebung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 115-146.
- ROESLER, U. (1966): Beschreibung von neuen Taxa des *Homoeosoma-Ephestia*-Komplexes (Lepidoptera, Phycitidae) aus der Paläarktis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 43-69.
- ROESLER, R. U. (1977): Kommerzialrat HANS REISSER und sein entomologisches Lebenswerk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 36-42.
- ROESLER, R. U. (1977): A) Die verschiedenen Erscheinungsformen der Mimikry. Siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 113-133.
- ROESLER, R. U. (1978): Eine neue Pyralide an *Loranthus* aus Pakistan. Phycitinen-Studien XVI (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 209-214.
- ROESLER, R. U. (1982): Der Zünsler *Vitula bivella* (ZELLER 1848) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae) neu für die Fauna Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **40**: 105-106.
- ROESLER, R. U. (1982): Eine neue Futterpflanze für den Zünsler *Alispa angustella* (HÜBNER 1796) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae). - *Carolinea*, **40**: 106.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras (Ergebnisse einer entomologischen Forschungsreise) Teil 1: Reisebericht und Landschaftsbeschreibung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 97-121.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1974): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras (Ergebnisse einer entomologischen Forschungsreise) Teil 2: Geographie, Entstehungsgeschichte und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 129-156.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras Teil 6: Betrachtungen zum Problemkreis „Mimikry“ am Beispiel südostasiatischer Insekten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 113-151.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1979): Die Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih., **3**: 1-249.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1981): Die Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil B, Ökologie und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih., **4**: 1-282.

- ROESLER, R. U., TOBIEN, H. & MAYER, G. (1977): ERWIN JÖRG †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 25-31.
- ROHDE, U. (1989): siehe ZIMMERMANN, P. & ROHDE, U. - Carolinea, **47**: 153-156.
- ROHDE, U. (1990): siehe KRÜSS, A. & ROHDE, U. - Carolinea, **48**: 109-120.
- ROHRER, P. (1982): siehe RIEDER, N. & ROHRER, P. - Carolinea, **40**: 91-98.
- RÖMBKE, J. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 6. Die Regenwürmer. - Carolinea, **43**: 93-104.
- RÖMBKE, J. (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 12. Die Enchytraeen. - Carolinea, **47**: 55-92.
- RÖMBKE, J. (1989): siehe JANS, W. & RÖMBKE, J. - Carolinea, **47**: 158-162.
- RÖMBKE, J. (1992): siehe SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. - Carolinea, **50**: 145-170.
- RÖMBKE, J. & HANAGARTH, W. (1994): The present faunistic knowledge on terrestrial Oligochaeta from Bolivia. - Andrias, **13**: 7-16, 1 Farbtaf.
- RONNIGER, K. (1942): siehe SUESSENGUTH, K. & RONNIGER, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **7**: 123-127
- RÖSCH, M. (1989): Pollenprofil Breitnau-Neuhof: Zum zeitlichen Verlauf der holozänen Vegetationsentwicklung im südlichen Schwarzwald. - Carolinea, **47**: 15-24, 3 Taf.
- ROSCISZEWSKI, K. (1994): siehe VERHAAGH, M. & ROSCISZEWSKI, K. - Andrias, **13**: 199-214.
- ROSCISZEWSKI, K. & MASCHWITZ, U. (1994): Prey specialisation of army ants of the genus *Aenictus* in Malaysia. - Andrias, **13**: 179-187, 1 Farbtaf.
- ROTHAUSEN, K. (1991): HEINZ TOBIEN 80 Jahre - Höwenegg Forschung 53 Jahre. - Andrias, **8**: 5-12.
- ROTHAUSEN, K. (1991): siehe JÖRG, E. & ROTHAUSEN, K. - Andrias, **8**: 13-64.
- RÜCKERT, G. (1974): Bryologische Studien an Ziegeldächern. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 55-57
- RUGE, K. (1996): siehe HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L. GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. - Carolinea, **54**: 187-188.
- RUGE, K. (1996): siehe MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. - Carolinea, **54**: 188-190.
- SACHS, F. (1953): Die Vogelwelt im Kreise Buchen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 71-89.
- SACHS, F. (1961): Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 7-14.
- SANDERS, A. P. M. (1973): KARL FRIEDRICH SCHIMPERS letzte Monate (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae 37). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 205-218.
- SATTLER, K. (1962): Über *Parapodia sinaica* (FRAUENFELD, 1860) (Lep., Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 51-53.
- SATTLER, K. (1967): Die Gattungen *Ornativalva* GOZMANY und *Horridovalva* gen.n. (Lepidoptera, Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 33-90.
- SAUTER, W. (1973): Das Retinaculum als systematisches Merkmal bei den Pyraliden (Lep. Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 161-168.
- SCHACH, J. (1989): siehe BREUNIG, T. & SCHACH, J. - Carolinea, **47**: 151-152.
- SCHÄFER, H. (1996): *Orlaya grandiflora* L. im Taubergebiet. - Carolinea, **54**: 185-186.
- SCHALLNASS, H.- J., RÖMBKE, J. & BECK, L. (1992): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - Carolinea, **50**: 145-170.
- SCHERPPELTZ, O. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Staphylinidae (Coleoptera). 87 Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 249-253.

- SCHEURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. (1996): Laufkäferzönosen südwestdeutscher Wälder - Charakterisierung, Beurteilung und Bewertung von Standorten. - *Carolinea*, **54**: 91-138, 4 Farbtaf.
- SCHILHANSL, K. (1972): siehe HÖLZINGER, J. & SCHILHANSL, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 93-101.
- SCHILLINGER, F. (1973): Das Gebäude der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 21-29.
- SCHINDLER, H. (1968): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (1. Mitt. Parmeliaceae, T. 1). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 83-96.
- SCHINDLER, H. (1970): Über das Vorkommen von *Sphaerophorus melanocarpus* (Sw.)Dc. im nördlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 111-114.
- SCHINDLER, H. (1974): Die Flechte *Alectoria fremontii* TUCK. im Nordschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 103-106.
- SCHINDLER, H. (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (2. Mitt.: Parmeliaceae, Teil 2 und Nachtrag zu Teil 1). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 53-73.
- SCHINDLER, H. (1983): Über den Nachweis der Diffractasäure in der Flechte *Usnea ceratina* ACH. aus dem Schwarzwald. - *Andrias*, **2**: 5-8.
- SCHINDLER, H. (1985): Erstfund der Flechte *Parmelia glabra* (SCHAER.) NYL. im Schwarzwald und ihre Verbreitung in Deutschland und angrenzenden Gebieten. - *Carolinea*, **42**: 43-50.
- SCHINDLER, H. (1988): Zur Geschichte der Anwendung von Flechten (Lichenes) in der Medizin. - *Carolinea*, **46**: 31-42.
- SCHINDLER, H. (1990): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 5. *Baeomyces*, *Sphaerophorus*, *Leprocaulon* und *Stereocaulon*. - *Carolinea*, **48**: 37-44.
- SCHINDLER, H. (1991): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 6. *Cladonia norvegica*. - *Carolinea*, **49**: 123-124.
- SCHINDLER, H. (1992): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 7. *Ramalina* und *Evernia*. - *Carolinea*, **50**: 45-56.
- SCHINDLER, H. (1994): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 8. Über *Placopsis lambii*, *Pannaria pezizoides* und andere seltenere Arten. - *Carolinea*, **52**: 11-24.
- SCHINDLER, H. (1996): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 9. Die Gattungen *Lobaria*, *Sticta*, *Nephroma* und *Peltigera*. - *Carolinea*, **54**: 53-72.
- SCHINDLER, H. (1997): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 10. Die Verbreitung von *Parmelia submontana*, ihr weiteres Vorkommen im übrigen Deutschland und Nachtrag zu *Lobaria*. - *Carolinea*, **55**: 13-21.
- SCHINDLER, H. & BIBINGER, H. (1987): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes 4. Die Gattung *Usnea*. - *Carolinea*, **45**: 77-88.
- SCHINDLER, H. & HAWKSWORTH, D. L. (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (3. Mitt.: Die Arten der Gattung *Alectoria*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 75-80.
- SCHLEICH, H. H. (1986): Vorläufige Mitteilungen zur Bearbeitung der fossilen Schildkröten der Fundstelle Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 47-50.
- SCHLEICH, H. H. (1990): Zur Taxonomie von „*Emys scutella* MEYER H. v.“ (= *Testudo scutella*) (Reptilia, Testudines). - *Carolinea*, **48**: 145-148.
- SCHLESINGER, S. (1991): Zweiter Fund von *Orobanche picridis* F.W. SCHULTZ in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 125.
- SCHLESINGER, S. (1997): siehe HAND, R. & SCHLESINGER, S. - *Carolinea*, **55**: 120.

- SCHLOSS, S. (1978): Pollenanalytische Untersuchungen in der Seemisse beim Wildsee/ Ruhstein (Nordschwarzwald). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 37-53.
- SCHLOSS, S. (1987): Ein spätglaziales Pollenprofil von der Hornisgrinde - Nordschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **45**: 167-168.
- SCHLÖTZER, A. (1952): Bericht über die Erdbebenwarte des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe im Geodätischen Institut der Technischen Hochschule im Jahre 1951. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 63-64, Taf. I.
- SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. (1993): Siebenschläfer in Nistkästen - eine Langzeitstudie zur Habitatwahl. - *Carolinea*, **51**: 93-100.
- SCHMALZ, J. (1939): siehe AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 117-119.
- SCHMALZ, J. (1939): siehe AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 120-162.
- SCHMID-EGGER, C. (1992): siehe DOCZKAL, D. & SCHMID-EGGER, C. - *Carolinea*, **50**: 173-176.
- SCHMID, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trichoptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 333-336.
- SCHMIDT, B. (1993): Die Sibirische Winterlibelle (Odonata) im südwestlichen Alpenvorland. - *Carolinea*, **51**: 83-92.
- SCHMIDT, E. (1957): Was ist *Somatochlora sibirica* TRYBOM? Ein Indizienbeweis, zugleich Versuch einer Gruppierung der paläarktischen Arten der Gattung (Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 92-100.
- SCHMIDT, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe, sowie der Expeditionen J. KLAPPERICH, Bonn 1952-53 und Dr. K. LINDBERG, Lund (Schweden) 1957-60. Libellen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 399-435, Taf. XI.
- SCHMIDT, K. (1977): siehe ABRAHAM, R. & SCHMIDT, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 177-183.
- SCHMIDT, K. (1979): Zur Kenntnis der Gasteruptionidae Badens (Hymenoptera, Eua-noioidea). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 117-123.
- SCHMIDT, K. (1982): siehe WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. - *Carolinea*, **40**: 104-105.
- SCHMIDT, K. (1985): siehe WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. - *Carolinea*, **42**: 115-120.
- SCHMIDT, K. (1987): siehe KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. - *Carolinea*, **45**: 135-146.
- SCHMIDT, K. (1990): siehe MATTHES, W. & SCHMIDT, K. - *Carolinea*, **48**: 139-144.
- SCHMIDT, K. (1994): siehe ZAWADZKI, F. & SCHMIDT, K. - *Carolinea*, **52**: 83-92.
- SCHMIDT, K. & ZMUDZINSKY, F. (1983): Beiträge zur Kenntnis der badischen Schlupfwespen-fauna (Hymenoptera, Ichneumonidae). 1. Xoridinae, Acaenitinae, Pimplinae (Poemeniini, Rhyssini). - *Andrias*, **3**: 97-103.
- SCHMIEDER, (1936): Über die Reklame in Stadt und Dorf. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 212-213, Taf. 1-3.
- SCHMITHÜSEN, J. (1975): Aufgaben der weltweiten Vegetationskartierung im Zusammen-hang mit dem internationalen Forschungsprogramm „Man and the Biosphere“ (MAB). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 289-294.
- SCHNEDLER, W. (1995): Arbeitsaufwand für floristische Nachweis-Karten und deren Aussa-gekraft. - *Carolinea*, **53**: 33-44.
- SCHOLZ, A. (1996): siehe ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **54**: 149-158.

- SCHOLZ, H. & BÖHLING, N. (1997): *Poa langiana* RCHB. und *Poa compressa* L. var. *expansa* var. nov. (Gramineae, Poaceae). - *Carolinea*, **55**: 5-12.
- SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. (1995): Die Schwarze Johannisbeere (*Ribes nigrum* L.) im Bereich des Rheingrabens: Standorte, Vergesellschaftung und Ökologie. - *Carolinea*, **53**: 147-163.
- SCHÖNBORN, W. & DUMPERT, K. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 8. Die Mikroflora. - *Carolinea*, **44**: 129-138.
- SCHÖNNE, E. (1986): siehe WAUTHY, G., VERA, H., LIONS, J.-C., SCHÖNNE, E. & DENÈGRE, M. - *Andrias*, **5**: 15-20.
- SCHOPPMANN, A. (1980): Die Bockkäferfauna von Ulm und seiner württembergischen Umgebung (Insecta, Coleoptera: Cerambycidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 143-152.
- SCHRÖDER, P. (1976): Zur Phänologie von *Hydropsyche instabilis* CURTIS (Trichoptera, Köcherfliegen) im Föhrenbach/Schwarzwald, unter besonderer Berücksichtigung der Larvenstadien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 137-148.
- SCHRÖDER, P. & STREIT, B. (1979): Zur Verbreitung von *Agriotypus armatus* CURTIS (Hymenoptera: Agriotypidae) in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 113-115.
- SCHUMACHER, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwaldes (Moore der Meßtischblätter Feldberg, St. Blasien). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 221-283, Taf. XI-XIII.
- SCHUMACHER, H. (1968): Die Schwebefliegenfauna im Raum Heidelberg (Ein Beitrag zur Fauna des Landes Baden-Württemberg). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 101-108.
- SCHÜTZ, W. (1991): Der Donau-Altarm bei Laiz. - *Carolinea*, **49**: 9-12.
- SCHWABE, A. (1990): Syndynamische Prozesse in Borstgrasrasen: Reaktionsmuster von Brachen nach erneuter Rinderbeweidung und Lebensrhythmus von *Arnica montana* L. - *Carolinea*, **48**: 45-68.
- SCHWABE, A. (1995): *Kochia prostrata*-reiche Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe unter besonderer Berücksichtigung des Aostatales. - *Carolinea*, **53**: 83-98.
- SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. Ein Beitrag zur Urlandschaftsfrage. - *Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet*, **6**: 5-114, Kt. 1-5.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. Nr. 1. Apophyllite und Thumasit aus dem Hartsteinbruch bei Haslach i.K. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 85-99, Taf. III-V.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. Nr. 2. Goldwaschen im Jahre 1911 in Philippsburg und Untersuchung des gewonnenen Materials. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 100-113, Taf. VI-IX.
- SCHWARZMANN, M. (1949): Zum Gedenken an KURT FRENTZEN. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **8** (1943/49): 5-9.
- SCHWÖBEL, H. (1985): *Entoloma (Rhodophyllus) scabiosum* (FRIES) QUÉL. erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland gefunden. - *Carolinea*, **43**: 119-122, 1 Farbtaf. als Beilage.
- SCHWÖBEL, H. & STANGL, J. (1982): Zwei neue Rißpilz-Arten, gefunden im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinea*, **40**: 9-14.
- SCHWOERBEL, J. (1961): Quell- und grundwasserbewohnende Arrenuriden in der Fauna Südwestdeutschlands (Acari: Arrenuridae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 85-92, Taf. I.

- SCHWOERBEL, J. (1962): Subterrane Süßwassermilben (Hydrachnellae) aus dem Bregenzer Wald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 33-43, Taf. II-IV.
- SEBALD, O. (1975): Zur Kenntnis der Quellfluren und Waldsümpfe des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 295-327
- SEIBERT, P. (1975): Veränderungen der Auenvvegetation nach Anhebung des Grundwasserspiegels in den Donauauen bei Offingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 329-343.
- SEIFERT, A. (1936): Die Versteppung Deutschlands. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 197-204, Taf. 1-8.
- SETTELE, J. (1994): siehe KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. - *Carolinea*, **52**: 93-109.
- SEVERIN, I. (1993): siehe LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. - *Carolinea*, **51**: 129-158.
- SEVERIN, I. (1994): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *CAROLINEA*, **52**: 123-150.
- SEVERIN, I. (1995): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **53**: 263-288.
- SEVERIN, I. (1996): siehe WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **54**: 197-216.
- SEVERIN, I. (1997): siehe WOLF, R., LÖSING, R. & SEVERIN, I. - *Carolinea*, **55**: 125-146.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1989): 1987 und 1988: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **47**: 163-190.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1990): 1989: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **48**: 155-176.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1991): 1990: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **49**: 139-168.
- SIKORA, L. G. (1996): siehe HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L. GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. (1994): Prey spectrum of two army ant species in central Amazonia, with special attention on their effect on spider populations. - *Andrias*, **13**: 189-198.
- SMITH, K.G.V. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landesammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Conopidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 299-300, Taf. I.
- SONNENBURG, H. (1996): Die Ameisenfauna (Hymenoptera, Formicidae) von Streuobstwiesen bei Rastatt (Baden). - *Carolinea*, **54**: 139-148.
- SOUGNEZ, N. & DETHIOUX, M. (1975): La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 345-356.
- SPEIDEL, W. (1979): Eine für Baden neue Pyraustine (Lepidoptera, Crambidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 133-134.
- STADLER, H. (1936): Praktischer Naturschutz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 190-196.
- STAIB, W. (1974): Bemerkenswerte Schmetterlinge vom Kaiserstuhl und der näheren Umgebung, mit einer für Deutschland neuen Art. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 177-178.
- STANGL, J. (1982): siehe SCHWÖBEL, H. & STANGL, J. - *Carolinea*, **40**: 9-14.
- STATZNER, B. (1985): siehe MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. - *Carolinea*, **42**: 121-128.
- STAUSS, M. J. (1993): siehe SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. - *Carolinea*, **51**: 93-100.
- STEINER, R. (1997): siehe HERMANN, G. & STEINER, R. - *Carolinea*, **55**: 35-42.
- STIEGLITZ, W. (1976): siehe BUTTLER, K. P. & STIEGLITZ, W. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 9-51.
- STIETENCRON, A. V. (1985): siehe BOGENRIEDER, A. & STIETENCRON, A. V. - *Carolinea*, **42**: 51-56.

- STOFFLER, H.-D. (1975): Zur Kenntnis der Tannen-Mischwälder auf Tonböden zwischen Wutach und Eyach (Pyrolo-Abietetum OBERD.1957). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 357-370.
- STÖHR, A. (1996): siehe HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L. GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- STORCH, G. (1993): *Amphiperatherium goethei*, ein weiteres Beuteltier aus dem Eozän von Messel (Mammalia, Didelphidae). - *Carolinea*, **51**: 123-124.
- STORCH, V. (1996): siehe ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. - *Carolinea*, **54**: 149-158.
- STORCH, V. & BURKHARDT, P. (1986): Die Reaktion der Mitteldarmdrüse des Süßwasserstrandfloh *Orchestia cavimana* auf verschiedene Nahrung. - *Carolinea*, **44**: 149-152.
- STREBEL, O. (1937): Beobachtungen am einheimischen Bücherskorpion *Chelifer Cancroides* L. (Pseudoscorpiones). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 143-155.
- STREIT, B. (1979): siehe SCHRÖDER, P. & STREIT, B. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 113-115.
- STRICKER, P. (1942): *Anthurus aseroeformis* (MCALPINE). Ein für Deutschland neuer australischer Pilz im Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 287-300, Taf. I-IV.
- STRICKER, P. (1950): Der Pilzbestand der Wutachschlucht, einiger Seitenschluchten und der angrenzenden Wälder. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 3-54.
- STRICKER, P. (1954): Die Ausbreitung des Tintenfischpilzes *Anthurus aseroeformis* Mc. ALPINE (*Anth. Muellerianus* KALCHBR. var. ED. FISCHER). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 93-98.
- STRIIT, W. (1937): Pontische Blattwespen (*Megalodontes* LATR.) an pontischen Pflanzen (Hym., Tenth.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 217-220.
- STRIIT, W. (1941): Die deutschen Arten der Halmwespengattung *Hartigia* SCHDTE. (Hym. Tenth.). - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 115-124.
- STRIIT, W. (1951): Die Biologie der Blattwespe *Pamphilius aurantiacus* GIR. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 137-141.
- STRIIT, W. (1952): Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 37-44.
- STRIIT, W. (1954): Eine Massenzucht des Birkenblatt-Minierers *Heterarthrus (Phyllotoma) nemoratus* HALL. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 47-50.
- STRIIT, W. (1954): HERMANN LEININGER zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 67-70.
- STRIIT, W. (1960): Die bisher unbekannte Larve der Blattwespe *Arge melanochroa* GMEL. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 58-59, Taf. II.
- STRIIT, W. (1960): Nachruf für ALOIS GREMMINGER. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 115-117.
- STRIIT, W. (1960): Nachtrag zu: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 188-189.
- STRIIT, W. (1961): Die Goldwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Chrysididae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 43-48.
- STRIIT, W. (1962): Einige bemerkenswerte Hautflügler (Hymenoptera) aus dem Wutachgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 49-50.
- STRIIT, W. (1963): Die Wegwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Pompilidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 97-106.

- STRITT, W. (1968): Ergänzungen zur Hautflüglerfauna Badens (Hymenoptera aculeata und Chrysoidea). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 109-112.
- STRITT, W. (1969): Seltenerer Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 131.
- STRITT, W. (1971): Zwei für Deutschland neue Grabwespen - *Alysson tricolor* LEPELETIER und *Solierella c. compedita* PICCIOLI (Hym., Sphec.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 155-156.
- STROBEL, K. (1968): Beiträge zur Lepidopterenfauna von Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 113-115.
- STUCKE, W. (1979): siehe BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 17-51.
- STUMPP, J. & SZEPTYCKI, A. (1989): *Eosentomon rusekianum* sp. n., a new species of Protura (Arthropoda: Insecta) from South Germany. - *Carolinea*, **47**: 141-146.
- SUESSENGUTH, K. & RONNIGER, K. (1942): Über *Orobancha alsatica* KIRSCHL. var. *Mayeri* Sss. et RONNIGER. Eine neue *Orobancha* aus der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 123-127
- SUKOPP, H., MARKSTEIN, B. & TREPL, L. (1975): Röhrichte unter intensivem Großstadteinfluß. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 371-385.
- SZEPTYCKI, A. (1989): siehe STUMPP, J. & SZEPTYCKI, A. - *Carolinea*, **47**: 141-146.
- THIEL, A. (1995): siehe WITTIG, R. & THIEL, A. - *Carolinea*, **53**: 185-198.
- THILL, A. (1975): siehe NOIRFALISE, A. & THILL, A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 251-257.
- THOMAS, P. (1989): siehe KÜBLER-THOMAS, M. & THOMAS, P. - *Carolinea*, **47**: 147-148.
- THOMAS, W. (1974): *Cnephasia tyrhaenica* AMSEL und *Grapholitha lobarzewskii* NOWICKI (Lep., Tortr.) - zwei für Deutschland neue Wickler. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 205-207.
- THOMAS, W. & RESHÖFT, K. (1983): Zur Biologie von *Ocnogyna afghanicola* EBERT 1974 (Lepidoptera, Arctiidae). - *Andrias*, **3**: 71-72.
- TOBIEN, H. (1955): siehe JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 3-21.
- TOBIEN, H. (1977): siehe ROESLER, R.U., TOBIEN, H. & MAYER, G. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 25-31.
- TOBIEN, H. (1986): Die jungtertiäre Fossilgrabungsstätte Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). Ein Statusbericht. - *Carolinea*, **44**: 9-34, 1 Taf.
- TOBIEN, H. (1997): siehe BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. & MITTMANN, H.-W. - *Andrias*, **10**: 1-230.
- TOBIEN, H. & JÖRG, E. (1959): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1955-59. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 175-181, Taf. IX-XI.
- TOLL, S. v. & AMSEL, H. G. (1967): Coleophoriden aus Afghanistan (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 5-16, Taf. 1-5.
- TRAUB, B. (1979): Eine für Baden-Württemberg neue Pyralide (Lepidoptera, Phycitinae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 131-132.
- TRAUB, B. & BAUER, E. (1983): Die Eulenfalter der Kapverdischen Inseln (Lepidoptera, Noctuidae). - *Andrias*, **3**: 59-70.
- TREPL, L. (1975): siehe SUKOPP, H., MARKSTEIN, B. & TREPL, L. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 371-385.
- TRUNKÓ, L. (1966): Ein seltener Crinoiden-Kelch aus dem rheinischen Mitteldevon. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 93-95, Taf. III-VI.



- TRUNKÓ, L. (1969): Das holozäne Kalktuff-Vorkommen von Werrabronn bei Weingarten (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 103-105, Taf. V.
- TRUNKÓ, L. (1977): siehe EBERT, G. & TRUNKÓ, L. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 33-34.
- TRUNKÓ, L. (1979): Geologische und paläontologische Beobachtungen im Unterrotliegenden von Heimkirchen/Pfalz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 11-16.
- TRUNKÓ, L. (1980): PAUL BARTOCHA †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 187-188.
- TRUNKÓ, L. (1983): Aufbau einer Aufschlußkartei in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - *Carolinea*, **41**: 139-141.
- TRUNKÓ, L. (1986): Geologische Aufschlußgrabung am Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 179-181.
- TRUNKÓ, L. (1989): Prof. Dr. GÜNTER FUCHS † 31. Juli 1935 - 17. August 1989. - *Carolinea*, **47**: 191-192.
- TRUNKÓ, L. (1990): siehe LEOPOLD, M., MUNK, W. & TRUNKÓ, L. - *Carolinea*, **48**: 13-20.
- TRUNKÓ, L. & EBERT, G. (1976): Spuren von Bohrorganismen in fossilem Treibholz des mitteloligozänen Meeressandes von Steinhart bei Bad Kreuznach. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 169-179.
- TRUNKÓ, L. & MAYER, G. (1996): Aufschluß in einer tektonisch eingeklemmten Scholle mit Mittlerem Muschelkalk in Weingarten/Kr. Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 175-176.
- TRUNKÓ, L. & MUNK, W. (1990): Makrofloren aus dem Unterrotliegenden (Unterperm) von Alsenz bei Bad Kreuznach / Rheinland-Pfalz. - *Carolinea*, **48**: 21-30, 2 Taf.
- TÜXEN, R. & OHBA, T. (1975): Zur Kenntnis von Bach- und Quell-Erlenwäldern (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* und *Ribo sylvestris-Alnetum glutinosae*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 387-401.
- UNGERER, E. (1936): Naturwissenschaft als nationale Kulturtätigkeit. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 3-34.
- URLICHS, M. (1987): siehe MUNDLOS, R. & URLICHS, M. - *Carolinea*, **45**: 7-11.
- URLICHS, M. (1990): siehe MUNDLOS, R. & URLICHS, M. - *Carolinea*, **48**: 7-12.
- URLICHS, M. (1992): Vermeintlicher Zwergwuchs bei Muscheln aus dem untersten Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk, Mitteltrias) Württembergs. - *Carolinea*, **50**: 9-26, 1 Taf.
- URLICHS, M. & MUNDLOS, R. (1987): Zur Entstehung von Ceratiten-Pflastern im Germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias) Südwestdeutschlands. - *Carolinea*, **45**: 12-30.
- VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. (1994): Untersuchungen zur Biologie dreier Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) aus amazonischen Regenwäldern. - *Andrias*, **13**: 161-168.
- VERA, H. (1986): siehe WAUTHY, G., VERA H., LIONS, J.-C., SCHONNE, E. & DENÈGRE, M. - *Andrias*, **5**: 15-20.
- VERHAAGH, M. (1988): „Parasitierung“ einer Ameisen-Pflanzen-Symbiose im neotropischen Regenwald? - *Carolinea*, **46**: 150.
- VERHAAGH, M. (1993): Arten als dynamische Einheiten der Natur - Eine kritische Betrachtung. - *Carolinea*, Beih., **8**: 31-39.
- VERHAAGH, M. (1994): *Pachycondyla luteola* (Hymenoptera, Formicidae), an inhabitant of *Cecropia* trees in Peru. - *Andrias*, **13**: 214-224.
- VERHAAGH, M. (1994): Neue Fundstellen einiger Ameisen in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **52**: 115-118.
- VERHAAGH, M. (1994): siehe BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. - *Andrias*, **13**: 5-6.
- VERHAAGH, M. (1994): siehe KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. - *Carolinea*, **52**: 93-109.

- VERHAAGH, M. (1994): siehe MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. - Andrias, **13**: 17-22.
- VERHAAGH, M. & FRANKE, U. (1993): Die Bibliothek des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe I. - *Carolinea*, **51**: 125-128.
- VERHAAGH, M. & ROSCISZEWSKI, K. (1994): Ants (Hymenoptera, Formicidae) of forest and savanna in the Biosphere Reserve Beni, Bolivia. - Andrias, **13**: 199-214, 1 Farbtaf.
- VERHOEFF, K. W. (1936): Unsere Kenntnisse von den Diplopoden des alemannischen Gaus. 145. Diplopoden-Aufsatz - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **1**: 228-254, 1 Taf.
- VERHOEFF, K. W. (1937): Die Isopoden des alemannischen Gaus und ihre geographisch-ökologische Beurteilung. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **2**: 22-39, Taf. II.
- VEZDA, A. (1972): siehe WIRTH, V. & VEZDA, A. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **31**: 91-92.
- VIESER, W. (1951): Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse in bodennahen Luftschichten. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **10**: 3-34, Taf. I.
- VOGEL, H. (1959): siehe RITZI, M. & VOGEL, H. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **18**: 65-74.
- VOGEL, P. (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 37-44.
- VOIGT, K. (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **29**: 147-150.
- VOIGT, K. (1971): Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **30**: 153-154.
- VOIGT, K. (1971): HANS NOWOTNY †. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **30**: 165-167
- VOIGT, K. (1977): Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Baden-Württemberg, mit einem Erstnachweis für Deutschland. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **36**: 153-158.
- VOIGT, K. (1983): Erstnachweis einiger Wanzenarten für Baden-Württemberg (Hemiptera, Heteroptera). - *Carolinea*, **41**: 130-131.
- VOIGT, K. (1997): *Acetropis gimmerthalii* (FLOR, 1860), eine für Baden-Württemberg neue Blindwanze (Heteroptera, Miridae). - *Carolinea*, **55**: 108-110.
- VOIGT, K. & RIETSCHEL, S. (1993): Zur Wanzenfauna der Sandäcker bei Wiesental/Baden. - *Carolinea*, **51**: 112-114.
- VOLZ, P. (1983): Zur Populationsökologie der mitteleuropäischen Walddipteren. - *Carolinea*, **41**: 105-126.
- VOLZ, P. (1989): Jahresrhythmen bei Collembolen (Insecta, Apterygota) - Untersuchungen in der Hördter Rheinaue. - *Carolinea*, **47**: 93-116.
- Voss, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Curculionidae (Coleoptera) (131. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **19**: 241-248.
- WAGENER, S. (1983): Struktur und Skulptur der Eihüllen einiger *Melanargia*-Arten (Lepidoptera, Satyridae). - Andrias, **3**: 73-96.
- WAGNER, G. & BURCHARDT, S. (1978): Molluskenschalen in Sedimenten aus dem Bodensee-Obersee. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **37**: 103-107
- WAGNER, H. (1975): Zum Gesellschaftsanschluß von *Betula humilis* und *Pedicularis sceptrum-carolinum* bei Edlach im Paltental, Steiermark. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **34**: 403-409.
- WALLNER, M. & BAISCH, G. (1969): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtl., **28**: 133-134.
- WALTER, G. (1990): Zeckenfunde (Ixodoidea, Ixodidae) aus Paraguay und Peru. - Andrias, **7**: 169-170.

- WALTHER, K. (1975): Beiträge zur Flora Nordostanatoliens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 411-427.
- WAUTHY, G., VERA, H., LIONS, J.-C., SCHONNE, E. & DENÈGRE, M. (1986): Enzymatic and chronological discrimination in *Quadropia quadricarinata* (MICHAEL, 1885) (Acari, Oribatida). - Andrias, **5**: 15-20.
- WEBER, H. E. (1989): Zwei neue *Rubus*-Arten aus Südwestdeutschland. - Caroleinea, **47**: 47-54.
- WEBER, H. E. (1995): *Rubus oberdorferi* nov. spec., eine neue Brombeerart aus Südwestdeutschland. - Caroleinea, **53**: 7-11.
- WEBER, H. E. (1996): Die Gattung *Rubus* im mittleren Schwarzwald mit Nachbargebieten. - Caroleinea, **54**: 9-36.
- WEBER, J. & ZIMMERMANN, P. (1990): Neufunde der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in Baden-Württemberg. - Caroleinea, **48**: 149-150.
- WEHRLE, E. (1939): Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingartener Moor bei Karlsruhe a. Rh. Ökologische und floristische Studien an einem eutrophen Flachmoor. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 3-84, Taf. I-II.
- WEHRLE, E. (1942): Algen in Gebirgsbächen am Südostrande des Schwarzwaldes. Ökologische und floristische Untersuchungen im Wutach-Gauchach-Naturschutzgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 128-286, Taf. I-III.
- WEHRLE, E. (1953): Die Schmuckalge *Cosmarium subquadratum* (NORDSTEDT) und deren kaum bekannter Formenkreis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 90-115, Taf. I.
- WEICK, D. (1996): siehe SCHEURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. - Caroleinea, **54**: 91-138.
- WEIGMANN, G. & WUNDERLE, I. (1990): Zur Taxonomie der europäischen Schelorbitidae (Acari, Oribatei). II. Beschreibung des baumbewohnenden *Schelorbitates ascendens* n. sp. - Andrias, **7**: 9-14.
- WEINGARTEN, M. & GUTMANN, M. (1993): Zum Nominalismus-Realismus-Streit in der Art-Diskussion. Fragen an PETER BEURTON. - Caroleinea, Beih., **8**: 20-22.
- WEINGARTEN, M. & GUTMANN, M. (1993): Artbegriffe und Evolutionstheorie. Die Erzeugung der Arten und die Art der Erzeugung. - Caroleinea, Beih., **8**: 60-74.
- WELLMER, H. (1979): siehe JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 155-160.
- WERNER, H. (1979): siehe BOGENRIEDER, A. & WERNER, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 61-69.
- WESTRICH, P. (1982): Zur Verbreitung der Knopfhornblattwespen-Gattung *Corynis* in Baden-Württemberg (Hymenoptera, Cimbicidae). - Caroleinea, **40**: 102-103.
- WESTRICH, P. (1983): Zur Biologie der Keulenwespe *Sapygina decemguttata* (JURINE) (Hymenoptera, Sapygidae). - Caroleinea, **41**: 134-136.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1982): *Crossocerus acanthophorus* (KOHL 1892) neu für Deutschland (Hymenoptera, Sphecidae). - Caroleinea, **40**: 104-105.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1985): Für Baden-Württemberg neue und seltene Bienen und Wespen (Hymenoptera Aculeata). - Caroleinea, **42**: 115-120.
- WIESSNER, W. (1979): siehe BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 17-51.
- WILLMANN, R. (1993): Arten als dynamische Einheiten der Natur. - Caroleinea, Beih., **8**: 23-30.
- WILLMANN, R. (1993): Hypothetisch reale Arten, das Biospezies-Konzept und die Relativität des Wissens. - Caroleinea, Beih., **8**: 40-44.

- WILMANN, O. (1956): Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 30-51.
- WILMANN, O. (1958): Zur standörtlichen Parallelisierung von Epiphyten- und Waldgesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 11-19.
- WILMANN, O. (1962): Rindenbewohnende Epiphytengemeinschaften in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 87-164.
- WILMANN, O. (1975): Wandlungen des Geranio-Allietum in den Kaiserstühler Weinbergen? - Pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 429-443.
- WILMANN, O. (1988): Können Trockenrasen derzeit trotz Immissionen überleben? - Eine kritische Analyse des Xerobrometum im Kaiserstuhl. - Carolinea, **46**: 5-16, 1 Taf.
- WILMANN, O. (1995): Ein Vergleich der Texturen von Weinbergsgesellschaften im Elsaß und in Südfrankreich. - Carolinea, **53**: 55-66.
- WILTSHIRE, E. P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Middle East Lepidoptera, XV. A second contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 337-371, Taf. II-IV.
- WILTSHIRE, E. P. (1967): Middle East Lepidoptera. XX. A third contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 137-169, Taf. I-XVI + 4 S.
- WILTSHIRE, E. P. (1971): Middle East Lepidoptera. XXIX: Noctuidae Quadrifinae. Taken by G. EBERT and colleagues in Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 57-63.
- WINTERHOFF, W. (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 445-462.
- WINTERHOFF, W. (1983): Die Großpilze des Wingertsbuckels bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - Carolinea, **41**: 33-44.
- WINTERHOFF, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der südwestdeutschen Tieflagen. - Carolinea, **53**: 251-258, 3 Farbtaf.
- WINTERHOFF, W. & BON, M. (1994): Zum Vorkommen seltener Schirmlinge (*Lepiota* s.l.) im nördlichen Oberrheingebiet. - Carolinea, **52**: 5-10, 1 Farbtaf.
- WINTERHOFF, W., FABER, U. & HENGE, E. (1985): Der Schwarzpurpurne Lauch (*Allium atropurpureum* WALDST. & KIT.), ein für die Bundesrepublik Deutschland neuer Neophyt. - Carolinea, **43**: 122-123.
- WIRTH, V. (1966): Die Flechten des Südschwarzwaldes (1. Teil: Umbilicariaceae, Parmeliaceae, Stictaceae und Peltigeraceae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 119-131.
- WIRTH, V. (1969): Die Flechten des Südschwarzwaldes (II. Teil: Placynthiaceae, Lichinaceae, Collemaaceae, Pannariaceae, Physciaceae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 19-31.
- WIRTH, V. (1974): Die Flechten des Südschwarzwaldes. Ein ökologisch orientierter Florenkatalog. III. Teil: Buelliaceae, Teloschistaceae, Usneaceae, Ramalinaceae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 81-101.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 463-476.
- WIRTH, V. & VĚZDA, A. (1972): Zur Systematik der *Lecidea cyathoides*-Gruppe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 91-92.
- WITSCHEL, M. (1993): Zur Synsystematik der *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen im südlichen Oberrheinraum. - Carolinea, **51**: 27-40.
- WITTENBERGER, G. (1969): Die Steinklee-Goldruten-Gesellschaft bei Offenbach am Main. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 107-110.

- WITTIG, R. & THIEL, A. (1995): Buchenwälder in Nordwest-Spanien. - *Carolinea*, **53**: 185-198.
- WOAS, S. (1978): Die Arten der Gattung *Hermannia* NICOLET 1855 (Acari, Oribatei). I. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 113-141.
- WOAS, S. (1981): Zur Taxonomie und Phylogenie der Hermanniidae SELLNICK, 1928 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **1**: 7-88.
- WOAS, S. (1981): Die Arten der Gattung *Hermannia* NICOLET, 1855 (Acari, Oribatei). II. - *Andrias*, **1**: 89-100.
- WOAS, S. (1982): Grundsätzliche Bemerkungen zum Flugvermögen von *Aurivolans propulsator* PILOTOVA (Mammalia, Rhinogradentia). - *Carolinea*, **40**: 107-112.
- WOAS, S. (1986): Beitrag zur Revision der Oppioidea sensu BALOGH, 1972 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **5**: 21-224.
- WOAS, S. (1990): Die phylogenetischen Entwicklungslinien der Höheren Oribatiden (Acari). I. Zur Monophylie der Poronota GRANDJEAN, 1953. - *Andrias*, **7**: 91-168.
- WOAS, S. (1990): siehe BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. - *Andrias*, **7**: 61-90.
- WOAS, S. (1990): siehe WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. - *Andrias*, **7**: 15-60.
- WOAS, S. (1991): siehe BECK, L. & WOAS, S. - *Carolinea*, **49**: 37-82.
- WOAS, S. (1992): Beitrag zur Revision der Gymnodamaeidae GRANDJEAN, 1954 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 121-161.
- WOAS, S. (1992): *Hermannia (Phyllhermannia) neotropica*, eine neue Hermanniidae aus Südbrasilien (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 163-178.
- WOAS, S. (1992): siehe FRANKLIN, E. & WOAS, S. - *Andrias*, **9**: 5-56.
- WOAS, S. (1992): siehe FRANKLIN, E. & WOAS, S. - *Andrias*, **9**: 57-74.
- WOAS, S. (1992): siehe NÜBEL-REIDELBACH, E. & WOAS, S. - *Andrias*, **9**: 75-119.
- WOLF, A. (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - *Carolinea*, **46**: 145-146.
- WOLF, A. (1993): Zur Verbreitung der Heuschrecken in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **51**: 115-118.
- WOLF, P. (1996): siehe KLEINSTEUBER, A. & WOLF, P. - *Carolinea*, **54**: 180-182.
- WOLF, R. (1988): Organisation und Arbeit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL). - *Carolinea*, **46**: 153-160.
- WOLF, R. (1989): siehe SEVERIN, I. & WOLF, R. - *Carolinea*, **47**: 162-190.
- WOLF, R. (1990): siehe SEVERIN, I. & WOLF, R. - *Carolinea*, **48**: 155-176.
- WOLF, R. (1991): siehe SEVERIN, I. & WOLF, R. - *Carolinea*, **49**: 139-168.
- WOLF, R. (1993): siehe LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. - *Carolinea*, **51**: 129-158.
- WOLF, R. (1997): 70 Jahre Naturschutz in Baden. Aus der Geschichte der BNL Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 147-152.
- WOLF, R. & LINK, F. G. (1989): Der Füllmenbacher Hofberg - Ein Rest historischer Weinberglandschaft im westlichen Stromberg. - *Carolinea*, *Beih.*, **6**: 3-83.
- WOLF, R. & LOEHNERT-BALDERMANN, E. (1992): 1991: 12 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **50**: 177-206.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1994): 1993: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **52**: 123-150.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1995): 1994: 11 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **53**: 263-288.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1996): 1995: 9 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 197-216.

- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1997): 1996: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 125-146.
- WOLF, T. (1993): siehe KLEINSTEUBER, A. & WOLF, T. - *Carolinea*, **51**: 107-108.
- WOLFF, P. & ORSCHIEDT, O. (1993): *Lemna turionifera* LANDOLT - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. - *Carolinea*, **51**: 9-26.
- WÜLKER, W. (1971): siehe KRIEGER-WOLFF, E. & WÜLKER, W. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 133-145.
- WUNDERLE, I. (1990): siehe WEIGMANN, G. & WUNDERLE, I. - *Andrias*, **7**: 9-14.
- WUNDERLE, I. (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitate eines Buchenwaldes. - *Carolinea*, **50**: 79-144.
- WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Scheloribatidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - *Andrias*, **7**: 15-60.
- WURST, C. (1997): *Arrhaphipterus zoroastres* n.sp., eine neue Rhipiceride aus dem südlichen Iran (Coleoptera, Dascilloidea, Rhipiceridae). - *Carolinea*, **55**: 105-107.
- ZAPFE, H. (1989): *Chalicotherium goldfussi* KAUP aus dem Vallesien vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 117-126.
- ZAWADZKI, F. & SCHMIDT, K. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchung der Laufkäfer in der Rheinaue Rastatt (Coleoptera: Carabidae). - *Carolinea*, **52**: 83-92.
- ZELL, H. (1982): Nematoden eines Buchenwaldbodens 1. *Wilsonema tentaculatum* (FUCHS, 1930) (Nematoda, Araeolaimida). - *Carolinea*, **40**: 99-100.
- ZELL, H. (1983): Nematoden eines Buchenwaldbodens 2. *Rhabditis silvatica* VOLZ, 1951 (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **41**: 127-130.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 3. *Prionchulus muscorum* (Nematoda, Monochida). - *Carolinea*, **42**: 57-74.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 4. Die Neotylenchiden (Nematoda, Neotylenchoidea). - *Carolinea*, **43**: 65-76.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 5. Die Wilsonematinae (Nematoda, Araeolaimida). - *Carolinea*, **43**: 77-92.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 6. Die Dorylaimen (Nematoda, Dorylaimida). - *Carolinea*, **44**: 91-118.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 7. Die Teratocephaliden (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **44**: 119-128.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 8. Die Criconemen (Nematoda, Criconematina). - *Carolinea*, **45**: 107-120.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 9. Die Cephaloben (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **45**: 121-134.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 10. Die Tylenchen (Nematoda, Tylenchoidea). - *Carolinea*, **46**: 75-98.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 11. Die Anguiniden (Nematoda, Anguinoidea). - *Carolinea*, **46**: 99-114.
- ZELL, H. (1990): Nematoden eines Buchenwaldbodens 12. Die Aphelenchen (Nematoda, Aphelenchida). - *Carolinea*, **48**: 121-130.
- ZELL, H. (1991): Nematoden eines Buchenwaldbodens 13. Die Gattung *Bunonema* (Nematoda, Bunonematidae). - *Carolinea*, **49**: 27-36.
- ZELL, H. (1993): Die Gattung *Plectus* BASTIAN, 1865 sensu lato (Nematoda, Plectidae) - Ein Beitrag zur Ökologie, Biogeographie, Phylogenie und Taxonomie der Plectidae. - *Andrias*, **11**: 3-171.

- ZIMMERLE, W. (1961): Zur Petrographie zweier Bohrkerne aus dem Grundgebirge des Rheingrabens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 77-83.
- ZIMMERMANN, P. (1988): Die Schlingnatter (*Coronella austriaca*) im Weinberg „Höllstein“ bei Freudenstein (Enzkreis, Baden-Württemberg). - Caroleinea, **46**: 65-74.
- ZIMMERMANN, P. (1990): Gefährdung der Quellmoore bei Bad Rippoldsau-Schapbach (Mittlerer Schwarzwald). - Caroleinea, **48**: 103-108.
- ZIMMERMANN, P. (1990): siehe WEBER, J. & ZIMMERMANN, P. - Caroleinea, **48**: 149-150.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1991): Neufunde der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* in Baden-Württemberg. - Caroleinea, **49**: 136-138.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1993): Zur Verbreitung und Lebensweise der Rotflügeligen Schnarrschrecke im Regierungsbezirk Karlsruhe. - Caroleinea, **51**: 119-122.
- ZIMMERMANN, P. & ROHDE, U. (1989): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Ackerwildkrautgesellschaften. - Caroleinea, **47**: 153-156.
- ZINK, G. (1963): Der Weißstorch-Bestand in Baden-Württemberg 1960-1962. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 89-96.
- ZIRNGIEBL, L. (1936): Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Cenchri bei den Blattwespen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 37-41.
- ZIRNGIEBL, L. (1937): Die Legewerkzeuge der Blattwespen (Tenthredinoidea). I. Teil. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 68-99, Taf. VII.
- ZIRNGIEBL, L. (1938): Die Legewerkzeuge der Blattwespen (Tenthredinoidea). II. Teil (Schluß). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 39-65, Taf. V-VII.
- ZMUDZINSKY, F. (1983): siehe SCHMIDT, K. & ZMUDZINSKY, F. - Andrias, **3**: 97-103.
- ZUKRIGL, K. (1975): Zur vegetationskundlichen Ansprache von geographischen Rassen. Siehe KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 167-171.
- N. N. (1936): Badischer Naturschutztag am 14. Januar 1936 in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 163-166.
- N. N. (1951): Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe nach dem Stand vom 1.5.1951. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 64-68.
- N. N. (1956): Die Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe in den Jahren 1954/56. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 67-74.
- N. N. (1959): MAX AUERBACH zum achtzigsten Geburtstag. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 3-4.
- N. N. (1960): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1957-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 118-129.
- N. N. (1965): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1961-1964. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 3-16.
- N. N. (1970): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1965-1969. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 3-15.
- N. N. (1972): Mitgliederverzeichnis des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. (Stand 1.7 1972). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 187-199.
- N. N. (1973): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1970-1972. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 5-19.
- N. N. (1977): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1973-1976. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 5-24.

### 3. Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Sachgebieten

#### Astronomie, Meteorologie, Klimatologie

- BECK, L. (1988): Bestandes- und Bodenklima eines Buchenwaldes im nördlichen Schwarzwaldvorland. - *Carolinea*, **46**: 141-144.
- BETZ, M. (1965): Der trockene Juli 1964. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 127-136.
- DIEM, M. (1956): Messungen der Größe der Regentropfen in natürlichen Regen und bei künstlicher Beregnung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 75-90.
- LAYER, H.-G. (1962): Der Albtalwind. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **21**: 19-31.
- MALSCH, W. (1953): Die Bodenwindverhältnisse in Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 120-127
- MALSCH, W. (1954): Eine Schwedenreise zur Totalen Sonnenfinsternis am 30. Juni 1954. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 71-79.
- MALSCH, W. (1960): Die Totale Sonnenfinsternis vom 2. Oktober 1959. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 3-9.
- OEHLER, T. (1958): Verfahren und Gerät zur Messung von Regentropfen und Schneeflocken. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 3-7
- VIESER, W. (1951): Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse in bodennahen Luftschichten. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 3-34.

#### Allgemeine Biologie, Phylogenie

- BEURTON, P. J. (1993): Worauf beruht die Kohäsion der biologischen Art?. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 5-19.
- GRASSHOFF, M. (1993): Taxonomie im Konflikt mit Evolutionsdenken. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 45-52.
- GUTMANN, W. F. (1993): Populationsgeschehen und Artbildung im Rahmen konstruktiver Limitationen. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 78-86.
- KRELL, F.-T. (1993): Taxonomie auf der Grundlage der Evolutionsbiologie. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 53-59.
- RIESS, J. (1993): Artkonzept und Evolutionstheorie - ein Kommentar. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 75-77.
- VERHAAGH, M. (1993): Arten als dynamische Einheiten der Natur - Eine kritische Betrachtung. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 31-39.
- WEINGARTEN, M. & GUTMANN, M. (1993): Artbegriffe und Evolutionstheorie. Die Erzeugung der Arten und die Art der Erzeugung. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 60-74.
- WEINGARTEN, M. & GUTMANN, M. (1993): Zum Nominalismus-Realismus-Streit in der Art-Diskussion. Fragen an Peter Beurton. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 20-22.
- WILLMANN, R. (1993): Arten als dynamische Einheiten der Natur. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 23-30.
- WILLMANN, R. (1993): Hypothetisch reale Arten, das Biospezies-Konzept und die Relativität des Wissens. - *Carolinea*, Beiheft, **8**: 40-44.
- WOAS, S. (1981): Zur Taxonomie und Phylogenie der Hermanniidae Sellnick 1928 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **1**: 7-88.
- WOAS, S. (1990): Die phylogenetischen Entwicklungslinien der Höheren Oribatiden (Acari) I. Zur Monophylie der Poronota Grandjean, 1953. - *Andrias*, **7**: 91-168.

- ZELL, H. (1993): Die Gattung *Plectus* Bastian, 1865 sensu lato (Nematoda, Plectidae) - Ein Beitrag zur Ökologie, Biogeographie, Phylogenie und Taxonomie der Plectidae. - *Andrias*, **11**: 3-171.

#### Botanik

##### Floristik und Systematik

##### Algen

- KRAUSE, W. (1975): Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Baggersen der Oberheinebene. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 187-199.
- KRAUSE, W. (1985): Über die Standortansprüche und das Ausbreitungsverhalten der Stern-Armleuchteralge *Nitellopsis obtusa* (Desvaux) J. Groves. - *Carolinea*, **42**: 31-42.
- KRAUSE, W. & GRÜTTNER, A. (1990): Über einen Fund der *Chara tenuispina* im Bodenseegebiet mit Blick auf die Gesamtverbreitung der Pflanze. - *Carolinea*, **48**: 31-36.
- LEHN, H. (1968): Litorale Aufwuchsalgen im Pelagial des Bodensees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 97-100.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1986): Der Cyanophyceen-Bewuchs der Furchen- oder Hirnsteine des Bodensees. - *Carolinea*, **44**: 51-60.
- WEHRLE, E. (1939): Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingartener Moor bei Karlsruhe a. Rh. Ökologische und floristische Studien an einem eutrophen Flachmoor. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 3-84.
- WEHRLE, E. (1942): Algen in Gebirgsbächen am Südostrand des Schwarzwaldes. Ökologische und floristische Untersuchungen im Wutach-Gauchach-Naturschutzgebiet. - *Beitr. naturk. Forsch. Oberheinegebiet*, **7**: 128-286.
- WEHRLE, E. (1953): Die Schmutkalge *Cosmarium subquadrum* (Nordstedt) und deren kaum bekannter Formenkreis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 90-115.

##### Pilze

- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- KNOCH, D. (1995): Zum Vorkommen kalkliebender Pilze auf Gneisstandorten des südöstlichen Schwarzwaldes. - *Carolinea*, **53**: 243-250.
- MATHEIS, W. (1985): Discomyceten aus Süddeutschland. II. Raum Homberg - Triberg (mittlerer Schwarzwald). - *Carolinea*, **43**: 61-64.
- NEUBERT, H. (1985): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. II. Erstfund von *Trichia erecta* Rex. - *Carolinea*, **43**: 117-119.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1986): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. III. Liste der bislang bekannten Arten. - *Carolinea*, **44**: 61-66.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1987): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland, Schlüssel zu den Ordnungs-



- und den Familien, Gattungen und Arten der Ordnung Trichiales. - *Carolinea*, **45**: 51-76.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1989): Myxomyce-  
ten aus der Bundesrepublik Deutschland. V. (mit Berücksichtigung  
des Vorkommens in Oberösterreich). - *Carolinea*, **47**: 25-46.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1991): Myxomyce-  
ten aus Deutschland. VII. (Mit Berücksichtigung der Vorkommen  
in Oberösterreich). - *Carolinea*, **49**: 13-26.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1992): Myxomyce-  
ten aus Deutschland. VIII. (Mit Berücksichtigung der Vorkommen  
in Oberösterreich). - *Carolinea*, **50**: 27-44.
- POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze Badens. II. Teil. - *Beitr.  
naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **5**: 76-103.
- SCHWÖBEL, H. (1985): *Entoloma* (*Rhodophyllus*) *scabiosum*  
(Fries) Quél. erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland  
gefunden. - *Carolinea*, **43**: 119-122.
- SCHWÖBEL, H. & STANGL, J. (1982): Zwei neue Rißpilz-Arten,  
gefunden im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinea*, **40**:  
9-14.
- STRICKER, P. (1942): *Anthurus aseroeiformis* (McAlpine). Ein für  
Deutschland neuer australischer Pilz im Oberheingebiet. -  
*Beitr. naturk. Forsch. Oberheingebiet*, **7**: 287-300.
- STRICKER, P. (1950): Der Pilzbestand der Wutachschlucht, eini-  
ger Seitenschluchten und der angrenzenden Wälder. -  
*Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **9** (1): 3-54.
- STRICKER, P. (1954): Die Ausbreitung des Tintenfischpilzes  
*Anthurus aseroeiformis* Mc. Alpine (*Anth. Muellierianus* Kal-  
chbr. var. Ed. Fischer). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**:  
93-98.
- WINTERHOFF, W. (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen  
bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - *Beitr.  
naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 445-462.
- WINTERHOFF, W. (1983): Die Großpilze des Wingertsbuckels  
bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - *Caro-  
linea*, **41**: 33-44.
- WINTERHOFF, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der  
südwestdeutschen Tieflagen. - *Carolinea*, **53**: 251-258.
- WINTERHOFF, W. & BON, M. (1994): Zum Vorkommen seltener  
Schirmlinge (*Lepiota* s.l.) im nördlichen Oberrheingebiet. -  
*Carolinea*, **52**: 5-10.
- Flechten**
- CEZANNE, R. & EICHLER, M. (1991): *Parmelia mougeotii* Schae-  
rer ex. Diétr. im badischen Odenwald. - *Carolinea*, **49**:  
121-122.
- SCHINDLER, H. (1968): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes (1. Mitt., *Parmeliaceae*, Teil 1). - *Beitr.  
naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 83-96.
- SCHINDLER, H. (1970): Über das Vorkommen von *Sphaero-  
phorus melanocarpus* (Sw.) Dc. im nördlichen Schwarzwald.  
- *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **29**: 111-114.
- SCHINDLER, H. (1974): Die Flechte *Alectoria fremontii* Tuck. im  
Nordschwarzwald. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**:  
103-106.
- SCHINDLER, H. (1976): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes (2. Mitt., *Parmeliaceae*, Teil 2 und Nachtrag  
zu Teil 1). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 53-73.
- SCHINDLER, H. (1983): Über den Nachweis der Diffractasäure  
in der Flechte *Usnea ceratina* Ach. aus dem Schwarzwald.  
*Andrias*, **2**: 5-8.
- SCHINDLER, H. (1985): Erstfund der Flechte *Parmelia glabra*  
(Schaeer.) Nyl. im Schwarzwald und ihre Verbreitung in  
Deutschland und angrenzenden Gebieten. - *Carolinea*,  
**42**: 43-50.
- SCHINDLER, H. (1988): Zur Geschichte der Anwendung von  
Flechten (Lichenes) in der Medizin. - *Carolinea*, **46**: 31-42.
- SCHINDLER, H. (1990): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 5. *Baeomyces*, *Sphaerophorus*, *Leprocau-  
lon* und *Stereocaulon*. - *Carolinea*, **48**: 37-44.
- SCHINDLER, H. (1991): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 6. *Cladonia norvegica*. - *Carolinea*, **49**:  
123-124.
- SCHINDLER, H. (1992): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 7. *Ramalina* und *Evernia*. - *Carolinea*, **50**:  
45-56.
- SCHINDLER, H. (1994): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 8. Über *Placopsis lambii*, *Pannaria pezizoi-  
des* und andere seltenere Arten. - *Carolinea*, **52**: 11-24.
- SCHINDLER, H. (1996): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 9. Die Gattungen *Lobaria*, *Sticta*, *Nephro-  
ma* und *Peltigera*. - *Carolinea*, **54**: 53-72.
- SCHINDLER, H. (1997): Die höheren Flechten des Nord-  
schwarzwaldes. 10. Die Verbreitung von *Parmelia submon-  
tana*, ihr weiteres Vorkommen im übrigen Deutschland und  
Nachtrag zu *Lobaria*. - *Carolinea*, **55**: 13-21.
- SCHINDLER, H. & BIBINGER, H. (1987): Die höheren Flechten  
des Nordschwarzwaldes. 4. Die Gattung *Usnea*. - *Caro-  
linea*, **45**: 77-88.
- SCHINDLER, H. & HAWKSWORTH, D. L. (1976): Die höheren  
Flechten des Nordschwarzwaldes (3. Mitt.: Die Arten der  
Gattung *Alectoria*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**:  
75-80.
- WILMANN, O. (1958): Zur standörtlichen Parallelisierung von  
Epiphyten- und Waldgesellschaften. - *Beitr. naturk. Forsch.  
SüdwDtl.*, **17**: 11-19.
- WILMANN, O. (1962): Rindenbewohnende Epiphytengemein-  
schaften in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch.  
SüdwDtl.*, **21**: 87-164.
- WIRTH, V. (1966): Die Flechten des Südschwarzwaldes (1. Teil:  
*Umbilicariaceae*, *Parmeliaceae*, *Stictaceae* und *Peltigera-  
ceae*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 119-131.
- WIRTH, V. (1969): Die Flechten des Südschwarzwaldes (II. Teil:  
*Placynthiaceae*, *Lichinaceae*, *Collembataceae*, *Pannaria-  
ceae*, *Physiaceae*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**:  
19-31.
- WIRTH, V. (1974): Die Flechten des Südschwarzwaldes. Ein  
ökologisch orientierter Florenkatalog. III. Teil: *Buellia-  
ceae*, *Teloschistaceae*, *Usneaceae*, *Ramalinaceae*. - *Beitr. naturk.  
Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 81-101.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Ut-  
zenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer  
Sicht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 463-476.
- WIRTH, V. & VEZDA, A. (1972): Zur Systematik der *Lecidea*  
*cyathoides*-Gruppe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**:  
91-92.
- Moose**
- AHRENS, M. (1993): *Gymnostomum viridulum* Brid., ein für  
Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der  
Bergstraße. - *Carolinea*, **51**: 75-82.
- AHRENS, M. (1995): Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* Culm.  
am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutsch-  
land). - *Carolinea*, **53**: 229-241.
- DIERSSEN, K. (1983): Zur Verbreitung und Soziologie von  
*Sphagnum riparium* Ångstr. in Mitteleuropa. - *Andrias*, **2**:  
9-22.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Süd-  
schwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. -  
*Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 91-124.

- PHILIPPI, G. (1967): Zur Kenntnis des Wassermooses *Cinclidotus danubicus* Schiffn. et Baumgartn. und seiner Verbreitung in Europa. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 77-81.
- PHILIPPI, G. (1968): Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydrophiler Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 61-81.
- PHILIPPI, G. (1970): Vorkommen basi- und neutrophiler Pflanzen im Buntsandsteingebiet des Nordschwarzwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 17-23.
- PHILIPPI, G. (1972): Die Moosvegetation der Wälder in der Rheinaue zwischen Basel und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 5-64.
- PHILIPPI, G. (1974): Verbreitung, Ökologie und Soziologie des Laubmooses *Brotherella lorentziana* (Mol.) Loeske in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 41-53.
- PHILIPPI, G. (1983): Epiphytische Moosvegetation des Gardasee-Gebietes. - Andrias, **2**: 23-52.
- PHILIPPI, G. (1986): Die Moosvegetation auf Buntsandsteinblöcken im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - Caroleina, **44**: 67-86.
- PHILIPPI, G. (1987): Die Wassermoosvegetation im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - Caroleina, **45**: 89-98.
- PHILIPPI, G. (1993): Epiphytische Moosvegetation des südlichen Spessarts, des östlichen Odenwaldes und des angrenzenden Baulandes. - Caroleina, **51**: 53-74.
- PHILIPPI, G. (1996): Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B.S.G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - Caroleina, **54**: 45-52.
- RÜCKERT, G. (1974): Bryologische Studien an Ziegeldächern. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 55-57
- SCHUMACHER, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwaldes (Moore der Meßtschblätter Feldberg, St. Blasien). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 221-283.
- WILMANN, O. (1958): Zur standörtlichen Parallelisierung von Epiphyten- und Waldgesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 11-19.
- WILMANN, O. (1962): Rindenbewohnende Epiphytengemeinschaften in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 87-164.
- BREUNIG, T. & HAISCH, B. (1988): Neufunde des Quirl-Tännels (*Elatine alsinastrum* L.) in der Offenburger Rheinebene. - Caroleina, **46**: 137
- BREUNIG, T. & PHILIPPI, G. (1988): Der Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) in der mittelbadischen Rheinebene. - Caroleina, **46**: 131-134.
- BREUNIG, T. & SCHACH, J. (1989): Ein Fund des Scheiden-Gelbsterns (*Gagea spathaceae*) in der nordbadischen Rheinebene. - Caroleina, **47**: 151-152.
- BUTTLER, K. P. & STIEGLITZ, W. (1976): Floristische Untersuchungen im Meßtschblatt 6417 (Mannheim-Nordost). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 9-51.
- DEMUTH, S. (1988): Über zwei bemerkenswerte Mauerfarne an der Bergstraße. - Caroleina, **46**: 135-136.
- DEMUTH, S. (1992): Über einige seltenen Orbanche-Arten (*Orobanchaceae*) in Baden-Württemberg. - Caroleina, **50**: 57-66.
- FRITZ, K. (1989): Königsfarn (*Osmunda regalis*) und Straußenfarn (*Matteuccia struthiopteris*) im Mittleren Schwarzwald. - Caroleina, **47**: 157
- GALL, H. J. (1969): Zum Vorkommen von *Carex arenaria* auf den Silbergrasfluren bei Speyer. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 111-114.
- GRIESE, J. & KLEINSTEUBER, A. (1996): Ein Fund von *Linaria lupina* im badischen Oberrheingebiet. - Caroleina, **54**: 183-185.
- GROSSMANN, A. L. (1977): Der Lorbeerseidelbast - *Daphne laureola* L. - noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 61-65.
- HAILER, N. (1975): Bemerkungen über *Luzula forsteri* bei Annweiler am Trifels. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 125-130.
- HAND, R. & SCHLESINGER, S. (1997): Ein Vorkommen der westmediterranen Wiesenraute *Thalictrum speciosissimum* L. in Südbaden. - Caroleina, **55**: 120.
- HRUBY, J. (1950): Die Brombeeren des Karlsruher Florengbietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 15-25.
- HRUBY, J. (1954): Zum Vorkommen der Zwergglockenblume (*Campanula cochlearifolia* Lam.) in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 43.
- HÜGIN, G. & HÜGIN, H. (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen). - Caroleina, **53**: 45-53.
- JAUCH, F. (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 76-147.
- KÄMMER, F. & DIENST, M. (1982): Zum Vorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in der trockenengefallenen südlichen Oberrheinaue. - Caroleina, **40**: 49-64.
- KLEINSTEUBER, A. (1992): Die Bäurwurz (*Meum athamanticum* Jacq.) im Nordschwarzwald. - Caroleina, **50**: 67-78.
- KLEINSTEUBER, A. (1995): Ein Fund von *Crassula tillaea* in der nordbadischen Rheinebene. - Caroleina, **53**: 259-261.
- KLEINSTEUBER, A. & WOLF, T. (1993): *Utricularia stygia* und *Hammarbya paludosa* am Blauensee bei Vogt/Kreis Ravensburg. - Caroleina, **51**: 107-108.
- KLEINSTEUBER, A. & WOLFF, P. (1996): *Potamogeton polygonifolius* und *Potamogeton coloratus* in Baden-Württemberg. - Caroleina, **54**: 180-182.
- KOHLER, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 3-18.
- KORNECK, D. & FINK, H. G. (1979): Der Schweizer Alant (*Inula helvetica* Weber) noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 53-59.
- KRAMER, F. (1942): Die Verbreitung von *Linum perenne* L. in der Rheinebene; ein badischer Standort auf Flugsand. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 110-122.

## Gefäßpflanzen

- BEHR, O., HRUBY, J. & MACHULE, M. (1966): *Catalogus simul Monumentum Florae Germaniae Orientalis enumerans omnes stirpes Pteridophytas et Anthophytas in Bohemia et Moravia septentrionali, Borussia orientali et occidentali, Lusatia orientali, Neomarchia, Pomerania, provincia Posenia et Silesia sponte crescentes.* - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 3-41.
- BOGENRIEDER, A. & STIETENCRON, A. v. (1985): Morphologische und cytologische Untersuchungen an *Anthoxanthum alpinum* A. & D. Löve und *Anthoxanthum odoratum* L. vom Feldberg im Schwarzwald. - Caroleina, **42**: 51-56.
- BOGENRIEDER, A., BÜHLER, M. & HÄRRINGER, P. (1993): *Anthoxanthum odoratum* L. und *Anthoxanthum alpinum* (A. & D. Löve) am Feldberg (Schwarzwald). Ein Beispiel für Höhenvikarianz. - Caroleina, **51**: 41-50.
- BOGENRIEDER, A., RASBACH, H. & RASBACH, K. (1989): Neufund von *Botrychium matricarifolium* im Schwarzwald. - Caroleina, **47**: 149-150.
- BÖHLING, N. (1996): *Poa alpina* L. in Südwestdeutschland. - Caroleina, **54**: 177-180.

- KRAUSE, W. (1975): Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Baggerseen der Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 187-199.
- KÜBLER-THOMAS, M. & THOMAS, P. (1989): Über ein Vorkommen von *Teucrium scordium* und *Ophioglossum vulgatum* am östlichen Hochrhein. - *Carolinaea*, **47**: 147-148.
- KUNZ, H. (1956): *Ranunculus polyanthemophyllus* Koch et Heß, *Neslia apiculata* Fischer et Meyer und *Callitriche obtusangula* Le Gall in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 52-55.
- LUDWIG, W. (1968): Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 21-25.
- LUDWIG, W. (1995): Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) in Hessen und einigen Nachbargebieten. - *Carolinaea*, **53**: 13-16.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1951): Über seltene und ausgestorbene Salzpflanzen der Wetterau. Ein Beitrag zur Geschichte der rhein-mainischen Halophyten-Flora. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 35-43.
- OBERDORFER, E. (1974): *Galium lucidum* All. am Schwarzwaldrand des südlichen Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 107-111.
- DESAU, A. (1995): Zum Auftreten des Erdmandelgrases *Cyperus esculentus* L. bei Offenburg (Baden-Württemberg). - *Carolinaea*, **53**: 17-20.
- PEINTINGER, M. (1986): *Ceratophyllum submersum* L., das Zarte Hornkraut, im westlichen Bodensee und Hegau. - *Carolinaea*, **44**: 163-164.
- PEINTINGER, M. (1990): Bestandsschwankungen bei seltenen Pflanzenarten in Pfeifengraswiesen des westlichen Bodensegebietes. - *Carolinaea*, **48**: 69-84.
- PEINTINGER, M. (1994): Verbreitung, Rückgang und Soziologie von *Gratiola officinalis* L. am Bodensee. - *Carolinaea*, **52**: 25-34.
- PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triquetus*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 9-18.
- PHILIPPI, G. (1970): *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., das Purpurreitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 107-110.
- PHILIPPI, G. (1971): Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 9-47.
- PHILIPPI, G. (1985): *Potamogeton x zizii* Koch ex Roth, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. - *Carolinaea*, **42**: 139-142.
- PHILIPPI, G. (1988): Zum Vorkommen des Ufer-Reitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* [Hall. f.] Koel.) im mittleren Oberrheingebiet. - *Carolinaea*, **46**: 138-139.
- PHILIPPI, G. (1993): *Thymelaea passerina* im Taubergebiet. - *Carolinaea*, **51**: 108-111.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinaea*, **51**: 51-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1995): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* Willd. in den Vogesen und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinaea*, **53**: 21-32.
- SCHS, F. (1961): Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 7-14.
- SCHAFFER, H. (1996): *Orlaya grandiflora* L. im Taubergebiet. - *Carolinaea*, **54**: 185-186.
- SCHLESINGER, S. (1991): Zweiter Fund von *Orobancha picridis* F. W. Schultz in Baden-Württemberg. - *Carolinaea*, **49**: 125.
- SCHOLZ, H. & BÖHLING, N. (1997): *Poa langiana* Rchb. und *Poa compressa* L. var. *expansa* var. nov. (Gramineae, Poaceae). - *Carolinaea*, **55**: 5-12.
- SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. (1995): Die Schwarze Johannisbeere (*Ribes nigrum* L.) im Bereich des Rheingrabens: Standorte, Vergesellschaftung und Ökologie. - *Carolinaea*, **53**: 147-163.
- SCHUMACHER, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwaldes (Moore der Meßtischblätter Feldberg, St. Blasien). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 221-283.
- SUESSENGUTH, K. & RONNIGER, K. (1942): Über *Orobancha alsatica* Kirschl. var. *Mayeri* Sss. et Ronniger. Eine neue Orobancha aus der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 123-127.
- VOGEL, P. (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinaea*, **54**: 37-44.
- WALTHER, K. (1975): Beiträge zur Flora Nordostanatoliens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 411-427.
- WEBER, H. E. (1989): Zwei neue *Rubus*-Arten aus Südwestdeutschland. - *Carolinaea*, **47**: 47-54.
- WEBER, H. E. (1995): *Rubus oberdorferi* nov. spec., eine neue Brombeerart aus Südwestdeutschland. - *Carolinaea*, **53**: 7-11.
- WEBER, H. E. (1996): Die Gattung *Rubus* im mittleren Schwarzwald mit Nachbargebieten. - *Carolinaea*, **54**: 9-36.
- WINTERHOFF, W., FABER, U. & HENGE, E. (1985): Der Schwarzpurpurne Lauch (*Allium atropurpureum* Waldst. & Kit.), ein für die Bundesrepublik Deutschland neuer Neophyt. - *Carolinaea*, **43**: 122-123.
- WOLFF, P. & ORSCHIEDT, O. (1993): *Lemna turionifera* Landolt - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. - *Carolinaea*, **51**: 9-26.

## Vegetationskunde

### Allgemeines und Kartierung

- FREY, W. & PROBST, W. (1974): Morphologische und vegetationsanalytische Untersuchungen an rezenten Kalktuffen im Keupergebiet des südlichen Schönbuschs. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 59-79.
- LUDEMANN, T. (1994): Zum Samenvorrat von Waldböden im Feldberggebiet. - *Carolinaea*, **52**: 45-60.
- MORAVEC, J. (1975): Die Untereinheiten der Assoziation. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 225-232.
- OBERDORFER, E. (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 121-123.
- OBERDORFER, E. (1954): Kurze Bemerkung zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 109-110.
- SCHMITHÜSEN, J. (1975): Aufgaben der weltweiten Vegetationskartierung im Zusammenhang mit dem internationalen Forschungsprogramm „Man and the Biosphere“ (MAB). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 289-294.
- SCHNEIDLER, W. (1995): Arbeitsaufwand für floristische Nachweiskarten und deren Aussagekraft. - *Carolinaea*, **53**: 33-44.

## Gebietsmonographien

- OBERDORFER, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Erläuterung der vegetationskundlichen Karte Bühlertal-Herrenwies (Bad. Meßtischbl. 73). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 3: 149-270.
- OBERDORFER, E. (1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachsenschlucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 8 (1943/49): 22-60.
- OBERDORFER, E. (1950): Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 9 (2): 29-98.
- OBERDORFER, E. (1956): Übersicht der Süddeutschen Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 15: 11-29.
- OBERDORFER, E. (1964): Der insubrische Vegetationskomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und der Südschweiz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 23: 141-187.
- OBERDORFER, E. (1965): Pflanzensoziologische Studien auf Teneriffa und Gomera (Kanarische Inseln). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 24: 47-104.
- OBERDORFER, E. & HOFMANN, A. (1967): Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nordpennin (Wälder, Heiden, Wiesen und Unkrautfluren). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 26: 83-139.
- PEINTINGER, M. (1988): Die Vegetation des Litzelsees bei Markelfingen (Westliches Bodenseegebiet). - *Carolinea*, 46: 17-22.
- PHILIPPI, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 71-114.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 463-476.

## Vegetationskarten

- HÖLZER, A. (1978): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 37: 55-92.
- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 38: 155-160.
- OBERDORFER, E. (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 2: 121-123.
- OBERDORFER, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Erläuterung der vegetationskundlichen Karte Bühlertal-Herrenwies (Bad. Meßtischbl. 73). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 3: 149-270.
- OBERDORFER, E. (1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachsenschlucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 8 (1943/49): 22-60.
- OBERDORFER, E. (1954): Kurze Bemerkung zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 13: 109-110.
- OBERDORFER, E. & LANG, G. (1952): Vegetationskundliche Karte des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe. - [Karte 1:25.000, erschienen als Beilage zu: Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 13 (1954).]
- PHILIPPI, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 71-114.
- SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. Ein Beitrag zur Urlandschaftsfrage. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, 6: 5-114.

## Wasser- und Ufervegetation

- BREUNIG, T. & PHILIPPI, G. (1988): Der Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) in der mittelbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, 46: 131-134.
- DIERSEN, K. (1975): Zur Litoralvegetation oligotropher und mesotropher Gewässer in Island und Norwegen - Ein Beitrag zur Soziologie u. Verbreitung der Littorelletea in Nord-Europa. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 57-77.
- GÖRS, S. (1975): Das *Cladium marisci* All. 1922 in Süddeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 103-123.
- KOHLER, A. (1975): Submerse Makrophyten und ihre Gesellschaften als Indikatoren der Gewässerbelastung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 149-159.
- KORNECK, D. (1960): Beobachtungen an Zwergbinsengesellschaften im Jahre 1959. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 19: 101-110.
- KRAUSE, W. (1975): Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Bagarseen der Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 187-199.
- KRAUSE, W. (1985): Über die Standortansprüche und das Ausbreitungsverhalten der Stern-Armleuchteralge *Nitellopsis obtusa* (Desvaux) J. Groves. - *Carolinea*, 42: 31-42.
- KRAUSE, W. & GRÜTTNER, A. (1990): Über einen Fund der *Chara tenuispina* im Bodenseegebiet mit Blick auf die Gesamtverbreitung der Pflanze. - *Carolinea*, 48: 31-36.
- LEHN, H. (1968): Litorale Aufwuchsalgen im Pelagial des Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 27: 97-100.
- MÜLLER, T. (1961): Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 20: 15-21.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1960): Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 19: 60-100.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1986): Der Cyanophyceen-Bewuchs der Furchen- oder Hirnsteine des Bodensees. - *Carolinea*, 44: 51-60.
- OSTENDORF, W. (1990): Die Ursachen des Röhrchrückgangs am Bodensee - Untersee. - *Carolinea*, 48: 85-102.
- PEINTINGER, M. (1988): Die Vegetation des Litzelsees bei Markelfingen (Westliches Bodenseegebiet). - *Carolinea*, 46: 17-22.
- PEINTINGER, M. (1995): Die Strandschmielengesellschaft (*Deschampsietum rhenanae* Oberdorfer 1957) im westlichen Bodenseegebiet - ein Vergleich von Vegetationsaufnahmen 1959 und 1993. - *Carolinea*, 53: 67-74.
- PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triquetus*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 28: 9-18.
- PHILIPPI, G. (1973): Zur Kenntnis einiger Röhrchgesellschaften des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 32: 53-95.
- PHILIPPI, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 71-114.
- PHILIPPI, G. (1985): *Potamogeton xizii* Koch ex Roth, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. *Carolinea*, 42: 139-142.
- SCHÜTZ, W. (1991): Der Donau-Altarm bei Laiz. - *Carolinea*, 49: 9-12.
- SEBALD, O. (1975): Zur Kenntnis der Quellfluren und Waldsümpfe des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 295-327.
- SOUGNEZ, N. & DETHIQUX, M. (1975): La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 34: 345-356.

- SUKOPP, H., MARKSTEIN, B. & TREPL, L. (1975): Röhrichte unter intensivem Großstadteinfluß. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 371-385.
- WEHRLE, E. (1939): Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingartener Moor bei Karlsruhe a. Rh. Ökologische und floristische Studien an einem eutrophen Flachmoor. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 3-84.
- WEHRLE, E. (1942): Algen in Gebirgsbächen am Südostrande des Schwarzwaldes. Ökologische und floristische Untersuchungen im Wutach-Gauchach-Naturschutzgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 128-286.
- WOLFF, P. & ORSCHIEDT, O. (1993): Lemna turionifera Landolt - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. - Caroleina, **51**: 9-26.

## Moore und Niedermoore

- DIERSSEN, K. (1983): Zur Verbreitung und Soziologie von *Sphagnum riparium* Ängstr. in Mitteleuropa. - Andrias, **2**: 9-22.
- GÖTTLICH, K. (1955): Über die Moortypen in Oberschwaben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 83-87
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1987): Paläoökologische Moor-Untersuchungen an der Hornisgrinde im Nordschwarzwald. - Caroleina, **45**: 43-50.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1988): Untersuchungen zur jüngeren Vegetations- und Siedlungsgeschichte im Blindensee-Moor (Mittlerer Schwarzwald). - Caroleina, **46**: 23-30.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1995): Zur Vegetationsgeschichte des Hornisgrinde-Gebietes im Nordschwarzwald: Pollen, Großreste und Geochemie. - Caroleina, **53**: 199-228.
- KAULE, G. (1974): Die Übergangs- und Hochmoore der Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 9-40.
- OVERDORFER, E. (1936): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Pflanzenformen des Oberrheingebietes. Zur Frage natürlicher Buchenwaldgesellschaften in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 49-88.
- PHILIPPI, G. (1963): Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 113-135.
- SCHUMACHER, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwaldes (Moore der Meßtischblätter Feldberg, St. Blasien). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 221-283.
- WAGNER, H. (1975): Zum Gesellschaftsanschluß von *Betula humilis* und *Pedicularis sceptrum-carolinum* bei Edlach im Pallental, Steiermark. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 403-409.
- ZIMMERMANN, P. (1990): Gefährdung der Quellmoore bei Bad Rippoldsau-Schapbach (Mittlerer Schwarzwald. - Caroleina, **48**: 103-108.

## Trockenrasen

- HÖLZER, A. (1978): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 55-92.
- KLEINSTEUBER, A. (1995): Ein Fund von *Crassula tillaea* in der nordbadischen Rheinebene. - Caroleina, **53**: 259-261.
- KORNECK, D. (1975): Das *Narduretum lachenalii*, eine neue Thero-Airion-Assoziation. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 161-166.
- KORNECK, D. (1988): Die Felsenleimkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaft (*Sileno rupestris*-*Sedetum annui*) in den Südvogesen. - Caroleina, **46**: 139-140.

- KRÜSS, A. & ROHDE, U. (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten „Sandhausener Dünen“ - Caroleina, **48**: 109-120.
- LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1959): Physiologie und Ökologie der Felsflurvegetation auf dem Isteiner Klotz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 144-174.
- MÜLLER, T. (1961): Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 111-122.
- OVERDORFER, E. (1972): Die synsystematische Gliederung xerothermer Saum-, Busch- und Waldgesellschaften. Bemerkungen zu P. Jakucs: Dynamische Verbindungen der Wälder und Rasen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 87-90.
- SCHWABE, A. (1995): *Kochia prostrata*-reiche Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe unter besonderer Berücksichtigung des Aostatales. - Caroleina, **53**: 83-98.
- WILMANN, O. (1988): Können Trockenrasen derzeit trotz Immissionen überleben? - Eine kritische Analyse des Xerobrometum im Kaiserstuhl. - Caroleina, **46**: 5-16.
- WINTERHOFF, W. (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 445-462.
- WINTERHOFF, W. (1983): Die Großpilze des Wingertsbuckels bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - Caroleina, **41**: 33-44.
- WINTERHOFF, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der südwestdeutschen Tieflagen. - Caroleina, **53**: 251-258.
- WITSCHEL, M. (1993): Zur Synsystematik der *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen im südlichen Oberrheinraum. - Caroleina, **51**: 27-40.

## Grünlandgesellschaften

- FELSCH, K. (1936): Beobachtungen im Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried“. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 219-227
- GÖRS, S. (1958): Ein Beitrag zur Kenntnis des *Crepido-Juncetum acutiflori* (Br.-Bl. 15) Oberd.56 auf basenreichen Standorten in Südwest-Deutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 8-10.
- KLEINSTEUBER, A. (1992): Die Bärwurz (*Meum athamanticum* Jacq.) im Nordschwarzwald. - Caroleina, **50**: 67-78.
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. I. Das *Molinietum medioeuropaeum* - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 55-77.
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Die *Molinietum* feuchter Standorte - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 165-190.
- KORNECK, D. (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. III. Kontaktgesellschaften A. Binsenwiesen, Verband: *Calthion* Tx. 1936 1. *Juncus acutiflorus*-Naßwiese. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 19-44.
- OVERDORFER, E. (1952): Die Wiesen des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 75-88.
- OVERDORFER, E. (1971): Zur Syntaxonomie der Trittpflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 95-111.
- PEINTINGER, M. (1990): Bestandsschwankungen bei seltenen Pflanzenarten in Pfeifengraswiesen des westlichen Bodenseegebietes. - Caroleina, **48**: 69-84.

- PEINTINGER, M. (1994): Verbreitung, Rückgang und Soziologie von *Gratiola officinalis* L. am Bodensee. - *Carolinea*, **52**: 25-34.
- PHILIPPI, G. (1960): Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 138-187.
- POTT, R. & HÜPPE, J. (1995): Die Bedeutung der Extensivbewirtschaftung für die Pflege und Erhaltung nordwestdeutscher Hudellandschaften am Beispiel des NSG Borkener Paradies im Emstal bei Meppen (Emsland). - *Carolinea*, **53**: 99-111.
- SCHWABE, A. (1990): Syndynamische Prozesse in Borstgrasrasen: Reaktionsmuster von Brachen nach erneuter Rinderbeweidung und Lebensrhythmus von *Arnica montana* L. - *Carolinea*, **48**: 45-68.
- WILMANN, O. (1956): Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 30-51.
- Ruderal- und Ackervegetation**
- BORNKAMM, R. (1975): Some observations on weed communities in the city of Durham, North Carolina, U. S. A. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 15-24.
- DIERSCHKE, H. (1995): Phänologischer Jahresrhythmus eines Tollkirschen (*Atropin*)-Waldsaumes. - *Carolinea*, **53**: 75-81.
- KOHLER, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 3-18.
- KÜBLER-THOMAS, M. (1994): Extensivierung zum Schutz von Ackerwildkräutern. - *Carolinea*, **52**: 35-44.
- LOHMEYER, W. (1975): Zur Kenntnis der anthropogenen Flora und Vegetation des Tomberges bei Rheinbach im Rhein-Siegkreis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 209-213.
- OVERDORFER, E. (1957): Das *Papaveretum argemone*, eine für Süddeutschland neue Getreideunkrautgesellschaft. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 47-51.
- OVERDORFER, E. (1971): Zur Syntaxonomie der Trittpflanzengesellschaften. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 95-111.
- OESAU, A. & FROEBE, H. A. (1972): Pflanzensoziologische Beobachtungen an hochwasserbeeinflussten Kulturlflächen im nördlichen Oberrheintal. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 65-86.
- PHILIPPI, G. (1971b): Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flugsandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 113-131.
- PHILIPPI, G. (1993): *Thymelaea passerina* im Taubergebiet. - *Carolinea*, **51**: 108-111.
- WILMANN, O. (1956): Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 30-51.
- WILMANN, O. (1975): Wandlungen des *Geranio-Allietum* in den Kaiserstühler Weinbergen? - Pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 429-443.
- WILMANN, O. (1995): Ein Vergleich der Texturen von Weinbergsgesellschaften im Elsaß und in Südfrankreich. - *Carolinea*, **53**: 55-66.
- WITTENBERGER, G. (1969): Die Steinklee-Goldruten-Gesellschaft bei Offenbach am Main. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 107-110.
- ZIMMERMANN, P. & ROHDE, U. (1989): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Ackerwildkrautgesellschaften. - *Carolinea*, **47**: 153-156.

## Wälder und Gebüsche

- BRAUN-BLANQUET, J. (1975): *Fragmenta Phytosociologica Raetica VI. Agropyro-Alnetum incanae*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 25-36.
- BÜCKING, W. (1977): Nährstoffverhältnisse im Bannwald „Greifenberg“ (Kraichgau). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 67-79.
- BÜCKING, W. (1995): Vegetationsstruktur des Bannwaldes „Bildhau“ (Gemeindewald Riederich bei Reutlingen, Südwestdeutschland). - *Carolinea*, **53**: 127-146.
- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- DIERSCHKE, H. (1995): Phänologischer Jahresrhythmus eines Tollkirschen (*Atropin*)-Waldsaumes. - *Carolinea*, **53**: 75-81.
- GÉHU, J.-M. & GÉHU, J. (1975): Les fourrés des sables littoraux du Sud-Ouest de la France. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 79-94.
- GLAVAC, V. (1975): Das *Pruno-Fraxinetum* Oberdorfer 53 in Nordwestkroatien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 95-101.
- HAILER, N. (1975): Bemerkungen über *Luzula forsteri* bei Annweiler am Trifels. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 125-130.
- KÄMMER, F. & DIENST, M. (1982): Zum Vorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in der trockengefallenen südlichen Oberrheinaue. - *Carolinea*, **40**: 49-64.
- KOHLER, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 3-18.
- KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. (1975): Die geographischen Rassen der Waldgesellschaften in vegetationskundlicher, walddeschichtlicher und waldbaulicher Sicht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 167-185.
- LUDEMANN, T. (1994): Zum Samenvorrat von Waldböden i Feldberggebiet. - *Carolinea*, **52**: 45-60.
- MAYER, H. (1975): Waldbauliche Bedeutung der geographischen Rassen von Waldgesellschaften. Siehe KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 175-185.
- MOOR, M. (1975): Die soziologisch-systematische Gliederung des Hirschingen-Ahornwaldes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 215-223.
- MÜLLER, T. (1967): Die geographische Gliederung des *Galio-Carpinetum* und des *Stellario-Carpinetum* in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 47-65.
- MÜLLER, T. (1975): Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 233-249.
- MÜLLER, T. (1995): Die synsystematische Stellung des *Aceri-Fagetum*. - *Carolinea*, **53**: 175-184.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1958): Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im Württembergischen Oberland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 88-165.
- NOIRFALISE, A. & THILL, A. (1975): Les Boisements d'Épicéa et leurs Types pédobotaniques en Ardenne (Belgique). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 251-257.
- OVERDORFER, E. (1936): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Pflanzenformen des Oberrheingebietes. Zur Frage natürlicher Buchenwaldgesellschaften in Baden. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 49-88.
- OVERDORFER, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Erläuterung der vegetationskundlichen Karte Bühlertal-Herrenwies (Bad. Meßstich: 73). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **3**: 149-270.

- OBERDORFER, E. (1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachschlucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 22-60.
- OBERDORFER, E. (1952): Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 12-36.
- OBERDORFER, E. (1953): Der europäische Auenwald. Eine soziologische Studie über die Gesellschaften des Alneto-Ulmion. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 23-70.
- OBERDORFER, E. (1972): Die synsystematische Gliederung xerothermer Saum-, Busch- und Waldgesellschaften. Bemerkungen zu P. JAKUCS: Dynamische Verbindungen der Wälder und Rasen, Akad.-Verlag, Budapest 1972. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 87-90.
- PHILIPPI, G. (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. - Caroleina, **40**: 15-48.
- PHILIPPI, G. (1995): Hainbuchen-Wälder feuchter Standorte im mittleren Oberrheingebiet. - Caroleina, **53**: 165-174.
- SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. (1995): Die Schwarze Johannisbeere (*Ribes nigrum* L.) im Bereich des Rheingrabens: Standorte, Vergesellschaftung und Ökologie. - Caroleina, **53**: 147-163.
- SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. Ein Beitrag zur Urlandschaftsfrage. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 5-114.
- SEBALD, O. (1975): Zur Kenntnis der Quellfluren und Waldsümpfe des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 295-327.
- SEIBERT, P. (1975): Veränderungen der Auenvegetation nach Anhebung des Grundwasserspiegels in den Donauauen bei Offingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 329-343.
- STOFFLER, H.-D. (1975): Zur Kenntnis der Tannen-Mischwälder auf Tonböden zwischen Wutach und Eyach (*Pyrolo-Abietetum* Oberd. 1957). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 357-370.
- TÜXEN, R. & OHBA, T. (1975): Zur Kenntnis von Bach- und Quell-Erlenwäldern (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* und *Ribo sylvestris-Alnetum glutinosae*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 387-401.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 463-476.
- WITTIG, R. & THIEL, A. (1995): Buchenwälder in Nordwest-Spanien. - Caroleina, **53**: 185-198.
- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 37-56.
- DIERSSEN, K. (1983): Zur Verbreitung und Soziologie von *Sphagnum riparium* Ångstr. in Mitteleuropa. - Andrias, **2**: 9-22.
- FREY, W. & PROBST, W. (1974): Morphologische und vegetationsanalytische Untersuchungen an rezenten Kalktuffen im Keupergebiet des südlichen Schönbuchs. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 59-79.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 91-124.
- PHILIPPI, G. (1972): Die Moosvegetation der Wälder in der Rheinaue zwischen Basel und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 5-64.
- PHILIPPI, G. (1974): Verbreitung, Ökologie und Soziologie des Laubmooses *Brotherella lorentziana* (Mol.) Loeske in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 41-53.
- PHILIPPI, G. (1983): Epiphytische Moosvegetation des Gardasee-Gebietes. - Andrias, **2**: 23-52.
- PHILIPPI, G. (1986): Die Moosvegetation auf Buntsandsteinblöcken im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - Caroleina, **44**: 67-86.
- PHILIPPI, G. (1987): Die Wassermoosvegetation im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - Caroleina, **45**: 89-98.
- PHILIPPI, G. (1993): Epiphytische Moosvegetation des südlichen Spessarts, des östlichen Odenwaldes und des angrenzenden Baulandes. - Caroleina, **51**: 53-74.
- RÜCKERT, G. (1974): Bryologische Studien an Ziegeldächern. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 55-57.
- WILMANN, O. (1958): Zur standörtlichen Parallelisierung von Epiphyten- und Waldgesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 11-19.
- WILMANN, O. (1962): Rindenbewohnende Epiphytengemeinschaften in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 87-164.
- WINTERHOFF, W. (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 445-462.
- WINTERHOFF, W. (1983): Die Großpilze des Wingertsbuckels bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - Caroleina, **41**: 33-44.
- WINTERHOFF, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der südwestdeutschen Tieflagen. - Caroleina, **53**: 251-258.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 463-476.

## Alpine Vegetation

- KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. (1995): Feinanalytische Untersuchungen zum Vegetationsmosaik zweier subalpiner Buckelweiden. - Caroleina, **53**: 113-125.
- OBERDORFER, E. (1950): Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 29-98.
- OBERDORFER, E. (1959): Borstgras- und Krummseggen-Rasen in den Alpen. Ein Beitrag zur Frage der Abgrenzung der Nardo-Callunetea gegen die Caricetea curvulae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 117-143.
- PHILIPPI, G. (1975): Quellflurgesellschaften der Allgäuer Alpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 259-287.

## Kryptogamengesellschaften

- AHRENS, M. (1993): *Gymnostomum viridulum* Brid., ein für Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der Bergstraße. - Caroleina, **51**: 75-82.
- AHRENS, M. (1995): Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* Culm. am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutschland). - Caroleina, **53**: 229-241.

## Übrige Pflanzengesellschaften

- KLÖTZLI, F. (1975): Zur Waldfähigkeit der Gebirgssteppen Hoch-Semiens (Nordäthiopien). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 131-147.
- OBERDORFER, E. (1983): Einige Bemerkungen zu Vegetationsstrukturen im östlichen Nordamerika, in Oahu (Hawaii) und Mitteljapan. - Andrias, **2**: 53-63.
- SOUGNEZ, N. & DETHIOLX, M. (1975): La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 345-356.

## Floren- und Vegetationsgeschichte

- FIETZ, A. (1951): Frühmittelalterliches Getreide aus Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 102-104.
- FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturmes von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 116-118.
- FIETZ, A. (1954): Römische Getreidereste aus dem nördlichen Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 99-104.
- FIETZ, A. (1961): Pflanzenreste aus den römischen Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 23-29.
- GÖTTLICH, K. (1955): Ein Pollendiagramm ungestörter späteiszeitlicher Verlandungsschichten im Federseebecken. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 88-92.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1987): Paläoökologische Moor-Untersuchungen an der Hornisgrinde im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **45**: 43-50.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1988): Untersuchungen zur jüngeren Vegetations- und Siedlungsgeschichte im Blindensee-Moor (Mittlerer Schwarzwald). - *Carolinea*, **46**: 23-30.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1995): Zur Vegetationsgeschichte des Hornisgrinde-Gebietes im Nordschwarzwald: Pollen, Großreste und Geochemie. - *Carolinea*, **53**: 199-228.
- KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. (1975): Die geographischen Rassen der Waldgesellschaften in vegetationskundlicher, walddeschichtlicher und waldbaulicher Sicht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 167-185.
- KRAL, F. (1975): Waldgeschichtliche Analyse der geographischen Rassenbildung. Siehe KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 171-174.
- LANG, G. (1952): Späteiszeitliche Pflanzenreste in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 89-110.
- LANG, G. (1954): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. I. Der Hotzenwald im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 3-42.
- LANG, G. (1955): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. II. Das absolute Alter der Tannenzeit im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 24-31.
- LANG, G. (1958): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. III. Der Schurmsee im Nordschwarzwald. Ein Beitrag zur Kiefernfrage. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 20-34.
- LANG, G. (1973): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. IV. Das Baldenwegermoor und das einstige Waldbild am Feldberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 31-51.
- LANG, G. (1975): Palynologische, großrestanalytische und paläolimnologische Untersuchungen im Schwarzwald, ein Arbeitsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 201-208.
- LOTTER, A. F. & HÖLZER, A. (1989): Spätglaziale Umweltverhältnisse im Südschwarzwald: Erste Ergebnisse paläolimnologischer und paläoökologischer Untersuchungen an Seesedimenten des Hirschenmooses. - *Carolinea*, **47**: 7-14.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1985): Pollenanalytische Untersuchungen des altpleistozänen Tonlagers von Jockgrim (Rheinpfalz). - *Carolinea*, **42**: 9-29.
- RÖSCH, M. (1989): Pollenprofil Breitnau-Neuhof: Zum zeitlichen Verlauf der holozänen Vegetationsentwicklung im südlichen Schwarzwald. - *Carolinea*, **47**: 15-24.
- SCHLOSS, S. (1978): Pollenanalytische Untersuchungen in der Seemisse beim Wildsee/Ruhstein (Nordschwarzwald). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 37-53.
- SCHLOSS, S. (1987): Ein spätglaziales Pollenprofil von der Hornisgrinde - Nordschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **45**: 167-168.
- TRUNKÓ, L. (1969): Das holozäne Kalktuff-Vorkommen von Werrabronn bei Weingarten (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 103-105.

## Allgemeine Botanik

- AUERBACH, G. (1937): Studien an Cruciferenblättern. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 49-53.
- BOGENRIEDER, A. & WERNER, H. (1979): Experimentelle Untersuchungen an zwei Charakterarten der Eisseggenflur des Feldberges (*Carex frigida* All. und *Soldanella alpina* L.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 61-69.
- GEHLKER, H. (1974): Ökologie und Parasitismus am Beispiel der Spargel-Wurzelfäule im Rheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 113-127.
- SCHINDLER, H. (1988): Zur Geschichte der Anwendung von Flechten (Lichenes) in der Medizin. - *Carolinea*, **46**: 31-42.
- ZUKRIGL, K. (1975): Zur vegetationskundlichen Ansprache von geographischen Rassen. Siehe KRAL, F. & MAYER, H. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 167-171.

## Geowissenschaften

### Geomorphologie, Tektonik, Vulkanismus

- BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. (1979): Ausgewählte Kapitel zur Oberrheingraben-Tektogenese. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 17-51.
- FUCHS, G. (1973): Zur Geschichte eines quartären Westeifel-Vulkans, der Rusbüsch bei Niederbettingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 181-193.
- GREINER, C. (1936): Die Flußverlegung des Ravennabachs von der Gutach-Wutach zur Dreisam im südlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 35-36.
- HIRSCH, L. G. (1949): Eiszeitliche Frostböden in der Oberrheinebene bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 61-73.
- HIRSCH, L. G. (1950): Echte und falsche Dauerfrostböden auf der Oberrheinischen Niederterrasse zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 3-14.
- HIRSCH, L. G. (1952): Der Albschuttkegel bei Ettlingen und seine Stellung im oberrheinischen Diluvium. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 1-11.
- MURAWSKI, H. (1957): Periglaziale Klimazeugen des Pleistozäns im Raum von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 59-64.
- TRUNKÓ, L. & MAYER, G. (1996): Aufschluß in einer tektonisch eingeklemmten Scholle im Mittleren Muschelkalk in Weingarten/Kr. Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 175-176.

### Geophysik und Erdbebenwarte Karlsruhe

- MÄLZER, H. (1969): Die Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts der Universität (TH) Karlsruhe in den Jahren 1965 bis 1967. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 5-8.
- MÄLZER, H. (1970): Die Erdbebenwarte Karlsruhe, Tätigkeit in den Jahren 1968-1970 und ihre Stellung im internationalen Stationsnetz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 103-106.



- MERKEL, H. (1956): Bericht über die Erdbebenwarte im Geodätischen Institut der Techn. Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1952-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 3-5.
- MERKEL, H. (1960): Überblick über die Tätigkeit der Erdbebenwarte der Technischen Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1956-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 130-131.
- MERKEL, H. (1962): Geschichte und Aufgaben der Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts und des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Technischen Hochschule Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 7-17
- MERKEL, H. (1965): Überblick über die Arbeiten der Erdbebenwarte des Geodätischen Instituts und des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Technischen Hochschule Karlsruhe für die Jahre 1961 bis 1964. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 123-126.
- SCHLÖTZER, A. (1952): Bericht über die Erdbebenwarte des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe im Geodätischen Institut der Technischen Hochschule im Jahre 1951. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 63-64.
- ## Paläontologie
- ### Fossile Vertebrata
- BEAUMONT, G. DE (1986): Les Carnivores (Mammifères) du Néogène de Höwenegg/Hegau, Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **44**: 35-45.
- BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. C. & MITTMANN, H.-W. (1997): *Hippotherium primigenium* (Equidae, Mammalia) from the late Miocene of Höwenegg (Hegau, Germany). - *Andrias*, **10**: 1-230.
- FRENTZEN, K. (1936): Ein fossiler Mageninhalt aus dem Lias Delta (Amaltheen-Schichten) von Reichenbach, O. A. Aalen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 153-156.
- HOFFMANN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. IV. Neue Saurierreste aus dem unteren Lias Alpha der Langenbrückener Senke. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 115-120.
- HÜNERMANN, K. A. (1989): Die Nashornskelette (*Aceratherium incisivum* Kaup 1832) aus dem Jungtertiär vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 5-116.
- JÖRG, E. (1962): Das Einhorn im Volksglauben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 3-5.
- JÖRG, E. (1965): *Ophisaurus acuminatus* nov.spec. (Anguidae, Rept.) von der pontischen Wirbeltier-Fundstätte Höwenegg/Hegau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 23-30.
- JÖRG, E. (1969): Eine Fischfauna aus dem Oberen Buntsandstein (Unter-Trias) von Karlsruhe-Durlach (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 87-102.
- JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. (1955): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1950-54. Ein technischer Bericht - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 3-21.
- KOENIGSWALD, W. v. (1985): Der dritte Lemurenrest aus dem mitteozänen Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **42**: 145-148.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Apatemyiden-Skelette aus dem Mitteleozän von Messel und ihre paläobiologische Aussage. - *Carolinea*, **45**: 31-35.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Ein zweites Skelett von *Buxolestes* (Pantolestidae, Protheria, Mammalia) aus dem Mitteleozän von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **45**: 36-42.
- KUSS, S. E. (1955): Die stratigraphische Verteilung der altpleistocänen Fauna aus dem Tonlager von Jockgrim in der Pfalz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 93-100.
- LEOPOLD, M., MUNK, W. & TRUNKO, L. (1990): Erster Nachweis von Landsäugetierresten im marinen Mittel-Oligozän des Mittleren Oberrheingraben bei Eschbach, Pfalz, BRD. - *Carolinea*, **48**: 13-20.
- MAYER, G. (1966): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. I. Eine paläontologische Ausgrabung bei Oos 1837/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 75-91.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. II. Aus der Frühzeit der pleistozänen Fossilfundstellen Mauer bei Heidelberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 77-83.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. III. Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* (*kirchbergensis*) (JÄGER) var. *brachycephalus* SCHROEDER von Daxlanden und seine Geschichte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 157-163.
- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. IX. Eine Aktion zur Gewinnung Öhninger Fossilien 1854-1860. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 5-30.
- MICKLICH, N. (1985): Biologisch paläontologische Untersuchungen zur Fischfauna der Messeler Ölschiefer (Mittel-Eozän, Lutetium). - *Andrias*, **4**: 3-171.
- OVERDORFER, E. (1962): Zur Eröffnung des neu eingerichteten Vivariums u. der neuen Schausäle mit den Tertiärfunden Höwenegg sowie Tiergruppen der Heimat. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 83-86.
- RIEPEL, O. (1980): Ein Lacertilier aus dem Eozän von Messel bei Darmstadt. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 57-69.
- RIETSCHEL, S. (1986): Algenbewachsene Federn - eine aktuopaläontologische Beobachtung. - *Carolinea*, **44**: 165-168.
- ROTHAUSEN, K. (1991): Heinz Tobien 80 Jahre - Höwenegg Forschung 53 Jahre. - *Andrias*, **8**: 5-12.
- SCHLEICH, H. H. (1986): Vorläufige Mitteilungen zur Bearbeitung der fossilen Schildkröten der Fundstelle Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 47-50.
- SCHLEICH, H. H. (1990): Zur Taxonomie von „*Emys scutella* Meyer H. v.“ (= *Testudo scutella*) (Reptilia, Testudines). - *Carolinea*, **48**: 145-148.
- STORCH, G. (1993): *Amphiperatherium goethei*, ein weiteres Beuteltier aus dem Eozän von Messel (Mammalia, Didelphidae). - *Carolinea*, **51**: 123-124.
- TOBIEN, H. (1986): Die jungtertiäre Fossilgrabungsstätte Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). Ein Statusbericht. - *Carolinea*, **44**: 9-34.
- TOBIEN, H. & JÖRG, E. (1959): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1955-59. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 175-181.
- TRUNKO, L. (1979): Geologische und paläontologische Beobachtungen im Unterrotliegenden von Heimkirchen/Pfalz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 11-16.
- ZAPPE, H. (1989): *Chalicotherium goldfussi* Kaup aus dem Vallesien vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 117-126.
- ### Fossile Invertebrata
- BESSLER, J. (1936): Doggerfossilien aus dem oligozänen Konglomerat der Tongrube von Rot-Malsch. Vorläufige Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 43-48.

- BESSLER, J. (1938): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B. Funde von *Hadrocheilus* Till im oberen Lias Gamma (Davoel-Schichten) der Langenbrückener Senke. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 66-75.
- ECKERT, H. (1951): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. Vorläufige Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 44-45.
- ECKERT, H. (1955): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. 1. Pleurotomariidae und Neritopsidae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 101-113.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. I. Neue Funde von Isopoden (Asseln) im Lias Südwestdeutschlands. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 100-103.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. III. Über einige Decapoden aus dem Lias Delta Schwabens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 106-115.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. II. *Mecochirus eckerti* nov. spec. aus dem Lias Epsilon (Posidonienschiefer) von Langenbrücken. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 103-105.
- FRENTZEN, K. (1941): Die Foraminiferenfauna des Lias, Doggers und unteren Malmes der Umgegend von Blumberg (Oberes Wutachgebiet). - Beitr. naturk. Forsch. Oberrhein-gebiet, **6**: 125-402.
- FRENTZEN, K. (1964): Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebets. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 31-51.
- HEISS, E. (1997): Erstnachweis einer Aneurinae aus dem Baltischen Bernstein: *Aneurus ancestralis* n.sp. (Heteroptera, Aradidae). - *Carolinea*, **55**: 111-112.
- HOFFMANN, K. (1936): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke I. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 287-303.
- HOFFMANN, K. (1938): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke II. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 3-38.
- JÖRG, E. (1957): Ein Erstfund von *Asteriacites* Schlotheim (*Cubichnia*, Asterozoa) aus der burdigalen Meeresmolasse des Bodenseegebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 34-36.
- KRISTAN-WOLLMAN, E. (1965): Revision der Arbeit von K. Frentzen: Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 17-20.
- LINCK, O. (1965): Eine weitere Crinoide (*Entrochus multifurcatus* n.sp.) aus dem Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 31-35.
- MÄGDEFRAU, K. (1937): Lebensspuren fossiler „Bohr“-Organismen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 54-67.
- MARTIN, O. & MUNK, W. (1992): Erster Nachweis eines Planorbiden (*Mollusca*, *Gastropoda*) aus dem Ölschiefer von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **50**: 171-172.
- MAYER, G. (1951): Paläontologische Notizen aus dem Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 105-112.
- MAYER, G. (1952): Bisher bekannte und neue Vorkommen der Trias-Lebensspur *Rhizocorallium jenense* Zenker. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 111-115.
- MAYER, G. (1954): Ein neues *Rhizocorallium* aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 80-83.
- MAYER, G. (1955): Eine mäandrierende Kriechspur aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 22-23.
- MAYER, G. (1956): Eine Schichtfläche mit Biocoenosen, Strömungsmarken und Lebensspuren aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 6-10.
- MAYER, G. (1957): Beobachtungen an einer *Arenicolites*-Platte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 37-38.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1987): *Rhizocorallium* als Begleiter der Bruchsaler Ceratiten-Pflaster (SW-Deutschland; Mitteltrias, Oberer Muschelkalk, *evolutus*-Zone). - *Carolinea*, **45**: 7-11.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1990): Zur Wohnkammerverrückung bei Ceratiten aus dem germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias). - *Carolinea*, **48**: 7-12.
- RIETSCHEL, S. (1983): *Aleurochiton petri* n.sp., eine Mottenschildlaus (Homoptera, *Aleyrodina*) aus dem Pliozän von Neu-Isenburg, Hessen. - *Carolinea*, **41**: 97-100.
- RIETSCHEL, S. (1985): *Naucoriden* im Mittelmeer als Modellfall für das Vorkommen von Wasserwanzen in den Solnhofener Plattenkalken. - *Carolinea*, **42**: 143-144.
- RIETSCHEL, S. (1986): Eine große *Seirocrinus*-Platte im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **44**: 176-178.
- TRUNKÓ, L. (1966): Ein seltener Crinoiden-Kelch aus dem rheinischen Mitteldevon. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 93-95.
- TRUNKÓ, L. & EBERT, G. (1976): Spuren von Bohrorganismen in fossilem Treibholz des mitteloligozänen Meeressandes von Steinhardt bei Bad Kreuznach. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 169-179.
- URLICHS, M. (1992): Vermeintlicher Zwergwuchs bei Muscheln aus dem untersten Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk, Mitteltrias) Württembergs. - *Carolinea*, **50**: 9-26.
- URLICHS, M. & MUNDLOS, R. (1987): Zur Entstehung von Ceratiten-Pflastern im Germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias) Südwestdeutschlands. - *Carolinea*, **45**: 12-30.

## Paläobotanik

- MÄGDEFRAU, K. (1937): Lebensspuren fossiler „Bohr“-Organismen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 54-67.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1936): Zur Kenntnis der Tertiärflora der Rhön. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 89-128.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1985): Pollenanalytische Untersuchungen des altpleistozänen Tonlagers von Jockgrim (Rheinpfalz). - *Carolinea*, **42**: 9-29.
- TRUNKÓ, L. (1969): Das holozäne Kalktuff-Vorkommen von Werrabronn bei Weingarten (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 103-105.
- TRUNKÓ, L. & MUNK, W. (1990): Makrofloren aus dem Unteroligozänen (Unterperm) von Alsenz bei Bad Kreuznach / Rheinland-Pfalz. - *Carolinea*, **48**: 21-30.

## Südwestdeutsche Fossilfundstätten

- MAYER, G. (1966): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. I. Eine paläontologische Ausgrabung bei Oos 1837/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 75-91.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. III. Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* von Daxlanden und seine Geschichte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 157-163.

MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. II. Aus der Frühzeit der pleistozänen Fossilfundstellen Mauer bei Heidelberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 77-83.

### Fossilfundstätten Öhningen und Höwenegg

- BEAUMONT, G. DE (1986): Les Carnivores (Mammifères) du Néogène de Höwenegg/Hegau, Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **44**: 35-45.
- BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. C. & MITTMANN, H.-W. (1997): *Hippotherium primigenium* (Equidae, Mammalia) from the late Miocene of Höwenegg (Hegau, Germany). - *Andrias*, **10**: 1-230.
- HÜNERMANN, K. A. (1989): Die Nashornskellette (*Aceratherium incisivum* Kaup 1832) aus dem Jungtertiär vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 5-116.
- JÖRG, E. (1965): *Ophisaurus acuminatus* nov. spec. (Anguillidae, Rept.) von der pontischen Wirbeltier-Fundstätte Höwenegg/Hegau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 23-30.
- JÖRG, E. & ROTHAUSEN, K. (1991): Zur Schichtenfolge und Biostratonomie der Wirbeltierfundstelle Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän). - *Andrias*, **8**: 13-64.
- JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. (1955): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1950-54. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 3-21.
- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. IX. Eine Aktion zur Gewinnung Öhninger Fossilien 1854-1860. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 5-30.
- OBERDORFER, E. (1962): Zur Eröffnung des neu eingerichteten Vivariums u. der neuen Schausäle mit den Tertiärfunden Höwenegg sowie Tiergruppen der Heimat. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 83-86.
- ROTHAUSEN, K. (1991): Heinz Tobien 80 Jahre - Höwenegg Forschung 53 Jahre. - *Andrias*, **8**: 5-12.
- SCHLEICH, H. H. (1986): Vorläufige Mitteilungen zur Bearbeitung der fossilen Schildkröten der Fundstelle Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 47-50.
- SCHLEICH, H. H. (1990): Zur Taxonomie von „*Emys scutella* Meyer H. v.“ (= *Testudo scutella*) (Reptilia, Testudines). - *Carolinea*, **48**: 145-148.
- TOBIEN, H. (1986): Die jungtertiäre Fossilgrabungsstätte Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). Ein Statusbericht. - *Carolinea*, **44**: 9-34.
- TOBIEN, H. & JÖRG, E. (1959): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1955-59. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 175-181.
- TRUNKÓ, L. (1986): Geologische Aufschlußgrabung am Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 179-181.
- ZAPPE, H. (1989): *Chalicotherium goldfussi* Kaup aus dem Vallesium vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 117-126.

### Fossilfundstätte Messel

- KOENIGSWALD, W. V. (1985): Der dritte Lemurenrest aus dem mitteleozänen Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **42**: 145-148.
- KOENIGSWALD, W. V. (1987): Apatemyiden-Skelette aus dem Mitteleozän von Messel und ihre paläobiologische Aussage. - *Carolinea*, **45**: 31-35.
- KOENIGSWALD, W. V. (1987): Ein zweites Skelett von *Buxolestes* (Pantolestidae, Protheriidae, Mammalia) aus dem Mitteleozän von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **45**: 36-42.

MARTIN, O. & MUNK, W. (1992): Erster Nachweis eines Planorbiden (Mollusca, Gastropoda) aus dem Ölschiefer von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **50**: 171-172.

MICKLICH, N. (1985): Biologisch paläontologische Untersuchungen zur Fischfauna der Messeler Ölschiefer (Mittel-Eozän, Lutetium). - *Andrias*, **4**: 3-171.

RIEPEL, O. (1980): Ein Lacertilier aus dem Eozän von Messel bei Darmstadt. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 57-69.

STORCH, G. (1993): Amphiperatherium goethel, ein weiteres Beuteltier aus dem Eozän von Messel (Mammalia, Didelphidae). - *Carolinea*, **51**: 123-124.

### Stratigraphie

- FUCHS, G. (1974): Das Unterdevon am Ostrand der Eifeler Nordsüd-Zone. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih., **2**: 3-163.
- HÜBL, H. H. (1942): Der gebleichte Mittlere Buntsandstein (Rehbergsschichten „b<sup>2b</sup>“) von Berg-zabern-Westmark. Eine geostein-kundlich-technische Betrachtung. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 301-358, Taf. I-IV.
- HUNDT, R. (1960): Das Vorkommen gotländischer graptolithen-führender Gerölle im Rheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 132-137.
- JÖRG, E. & ROTHAUSEN, K. (1991): Zur Schichtenfolge und Biostratonomie der Wirbeltierfundstelle Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän). - *Andrias*, **8**: 13-64.
- KUHN, O. (1937): Bemerkungen zur Entstehung und Gliederung des oberen Keupers in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 156-160.
- LODEMANN, W. (1960): Die „Entfärbungsbänderung“ im Trochitenkalk (mo1) von Nordbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 10-16.
- MADER, D. (1985): Entstehung des germanischen Buntsandsteins. - *Carolinea*, **43**: 5-60.
- MAYER, G. (1954): Ein bemerkenswerter Flugsandaufschluß bei Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 44-46.
- MAYER, G. (1955): Eine interessante Schichtfläche aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 114-118.
- MAYER, G. (1964): Notizen über Pleistozänaufschlüsse im Stadtgebiet von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 137-139.
- REICHEL, G. (1955): Untersuchungen zur Deutung von Schuttmassen des Südschwarzwaldes durch Schotteranalysen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 32-42.
- TRUNKÓ, L. (1983): Aufbau einer Aufschlußkartei in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - *Carolinea*, **41**: 139-141.
- TRUNKÓ, L. (1986): Geologische Aufschlußgrabung am Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 179-181.
- ZIMMERLE, W. (1961): Zur Petrographie zweier Bohrkerne aus dem Grundgebirge des Rheingrabens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 77-83.

### Mineralogie und Bodenschätze

- BARANYI, I. (1980): Untersuchungen über die Veränderungen von Sedimentgesteinseinschlüssen im Suevit des Nördlinger Rieses. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 37-56.
- MAYER, G. (1953): Bohnerzgräberei bei Diedelsheim (Bretten) im 17. Jhd. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 119.

- MAYER, G. (1956): Bergbauliche Versuche und Unternehmungen bei Langenbrücken und Mingolsheim im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 126-127
- MAYER, G. (1962): Ölschieferbergbau bei Ubstadt im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 191-203.
- MÜNCH, W. D. (1983): 100 Jahre Kiesabbau in der nordbadischen Rheinebene (Regierungsbezirk Karlsruhe). - Caroleina, **41**: 9-20.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. 1. Apophyllite und Thaumazit aus dem Hartsteinbruch bei Haslach i.K. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 85-99.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. 2. Goldwaschen im Jahre 1911 in Philippsburg und Untersuchung des Materials. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 100-113.

## Zoologie

### Tiergruppen

#### Vertebrata, mehrere Gruppen

- AUERBACH, M. (1940): Die Wirbeltiere Badens in ihrer Beziehung zur Umwelt und zur Landschaftsform. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 3-54.
- KUSS, S. E. (1958): Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 166-173.

#### Mammalia

- ANGST, R. (1976): Das Endocranialvolumen der Pongiden (Mammalia: Primates). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 181-188.
- ANGST, R. (1985): Beitrag zur Kenntnis des Elefantenschädels (Mammalia: Proboscidea) - Stoßzahnlose afrikanische Elefanten in den Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe. - Caroleina, **42**: 129-137
- ANGST, R. (1985): Beitrag zur Kenntnis des Hirnschädelvolumens bei Tupaiiden und der Variabilität der Schädelmaße von *Tupaia glis* (Mammalia: Scandentia). - Caroleina, **43**: 113-116.
- ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. (1997): Rheinbrücke bei Mannheim als Fledermausfalle. - Caroleina, **55**: 81-93.
- ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. (1996): Zur Rauhhaufledermaus (*Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839) in den nordbadischen Rheinauen. - Caroleina, **54**: 149-158.
- BRAUN, M. (1985): Erstnachweis einer Nordfledermaus *Eptesicus nilsoni* (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - Caroleina, **43**: 127-128.
- BRAUN, M. (1985): Zum Vorkommen der Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* Schreber, 1774 (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - Caroleina, **43**: 126-127
- BRAUN, M. (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - Caroleina, **43**: 129-132.
- BRAUN, M. (1986): Funde der Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 (Mammalia, Chiroptera) in Nordbaden. - Caroleina, **44**: 169-170.
- BRAUN, M. (1987): Der Feldhamster in Baden-Württemberg. - Caroleina, **45**: 160-161.

- BRAUN, M. (1988): Der Große Abendsegler in Nordbaden. - Caroleina, **46**: 151-152.
- BRAUN, M. (1991): Zum Vorkommen der Mopsfledermaus in Nordbaden. - Caroleina, **49**: 133-136.
- BRAUN, M. (1996): Die Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus* Linné, 1758) in Nordbaden. - Caroleina, **54**: 167-173.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1990): Fortpflanzungsnachweis der Nordfledermaus im Nordschwarzwald. - Caroleina, **48**: 153-154.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1993): Der Kleine Abendsegler in Nordbaden. - Caroleina, **51**: 101-106.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1997): Funde der Großen Bartfledermaus in Baden-Württemberg. - Caroleina, **55**: 113-116.
- BRAUN, M. & KISCHNICK, P. (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - Caroleina, **45**: 159-160.
- BRÜNNER, H. & BRAUN, M. (1991): Zur Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus*) in Baden-Württemberg. - Caroleina, **49**: 115-120.
- DIETZ, C. & BRAUN, M. (1997): Zur Fledermausfauna im Landkreis Freudenstadt (Regierungsbezirk Karlsruhe). - Caroleina, **55**: 65-80.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1989): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe - Teil I. - Caroleina, **47**: 117-132.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1991): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe - Teil II: Plecotus. - Caroleina, **49**: 101-114.
- HAVELKA, P. (1995): Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten - eine Aufgabe des Naturschutzes. - Caroleina, Beiheft, **9**: 3-64.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1996): Das Schloß in Heidelberg (Baden-Württemberg) als Fledermaus-Quartier. - Caroleina, **54**: 159-166.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1997): Untersuchungen zur Fledermausfauna im Schloßgarten Schwetzingen. - Caroleina, **55**: 49-56.
- KALKO, E. (1991): Zum Jagd- und Echoortungsverhalten der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*, Kuhl, 1819) in den Rheinauen bei Karlsruhe. - Caroleina, **49**: 95-100.
- KLIESCH, C., ARNOLD, A. & BRAUN, M. (1997): Fledermausquartier in einer Stollenanlage bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). - Caroleina, **55**: 57-64.
- RIEDER, N. & ROHRER, P. (1982): Über die Möglichkeit der Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Südwestdeutschland. - Caroleina, **40**: 91-98.
- SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. (1993): Siebenschläfer in Nistkästen - eine Langzeitstudie zur Habitatwahl. - Caroleina, **51**: 93-100.
- WOAS, S. (1982): Grundsätzliche Bemerkungen zum Flugvermögen von *Aurivolans propulsator* Pilotova (Mammalia, Rhinogradentia). - Caroleina, **40**: 107-112.

#### Aves

- BAUER, W. & MÜLLER, G. (1969): Zur Avifauna des Ewros-Delta. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 33-52.
- HAVELKA, P. (1995): Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten - eine Aufgabe des Naturschutzes. - Caroleina, Beiheft, **9**: 3-64.
- HAVELKA, P. (1996): Erste Ergebnisse zur Lebensraumnutzung des Wiedehopfes. - Caroleina, **54**: 191-194.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1990): Der Kolkrabe im Schwarzwald. - Caroleina, **48**: 151-152.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1997): Der Kolkrabe (*Corvus corax* L., 1758) in Nordbaden. - Caroleina, **55**: 117-118.

- HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. (1994): Laupheim, die bedeutendste Saatkrähen-Kolonie in Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L., GÖRZE, H.-J., SIKORA L. G. & STÖHR, A. (1996): Der Dreizehenspecht in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- HÖLZINGER, J. & SCHILHANSL, K. (1972): Untersuchungen zur Brutbiologie an einer südwestdeutschen Population des Flußregenpeifers (*Charadrius dubius*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 93-101.
- HORNBERGER, F. (1957): Der Weiße Storch in Baden-Württemberg 1956. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 52-58.
- MERKEL, H. (1997): Verbreitung und Bestandsentwicklung der Wasseramsel im Flußsystem der Alb im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **55**: 95-104.
- MÜLLER, G. (1967): Der Weißstorchbestand in Baden-Württemberg 1963-1965. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 141-148.
- MÜLLER, G. (1979): Kommentiertes Verzeichnis der vogelkundlichen Literatur in Baden bis zum Jahr 1943. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 71-111.
- MÜLLER, G. (1997): Extrem frühe Brut der Wasseramsel am Rand des Nordschwarzwaldes. - *Carolinea*, **55**: 119.
- MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. (1996): Aktionsgebietsgrößen des Schwarzspechts im Winterhalbjahr. - *Carolinea*, **54**: 188-190.
- RIETSCHEL, S. (1986): Algenbewachsene Federn - eine aktuellpaläontologische Beobachtung. - *Carolinea*, **44**: 165-168.
- SACHS, F. (1953): Die Vogelwelt im Kreise Buchen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 71-89.
- ZINK, G. (1963): Der Weißstorch-Bestand in Baden-Württemberg 1960-62. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 89-96.

### Amphibia, Reptilia, Pisces

- ELSTER, H. J. (1959): Bodensee-Felchen (*Coregonus*) im Hochschwarzwald. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 87-91.
- LÖFFLER, H. (1977): Fischereibiologische Bewertung der Großen Lauter, einem Forellnbach der Schwäbischen Alb. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 81-89.
- LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbaches im südlichen Odenwald. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- MAYER, E. & BECK, L. (1983): Schlangennachzuchten im Vivarium 1982. - *Carolinea*, **41**: 137-139.
- ZIMMERMANN, P. (1988): Die Schlingnatter (*Coronella austriaca*) im Weinberg „Höllstein“ bei Freudenstein (Enzkreis, Baden-Württemberg). - *Carolinea*, **46**: 65-74.

### Invetebrata, mehrere Gruppen

- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 117-119.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee) 1925-1931. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 120-162.
- CASPERS, N. (1980): Die Makrobenthos-Gesellschaften des Hochrheins bei Bad Säckingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 115-142.
- FRIEDRICH, G. & MEIER-BROOK, C. (1987): Die Makrofauna der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen in Kleingewässern in der Umgebung von Tübingen. - *Carolinea*, **45**: 99-106.
- GRETLER, T. & OSTENDORF, W. (1997): Die Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate am Bodensee. - *Carolinea*, **55**: 23-34.

- HOPP, I. (1986): Benthalfauna und Steinbesiedlung in einem Schwarzwaldbach. - *Carolinea*, **44**: 153-162.
- LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbaches im südlichen Odenwald. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- MUCKLE, R. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees. - *Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet*, **7**: 5-109.
- RITZI, M. & VOGEL, H. (1959): Ein Beitrag zur Besiedlungsdichte der Tiefenfauna im Bodensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 65-74.

### Arthropoda, mehrere Gruppen

- FLOREN, A. & LINSSENMAIR, K. E. (1994): Zur Diversität und Wiederbesiedlungsdynamik von Arthropoden auf drei Baumarten in einem Regenwald in Sabah, Malaysia. - *Andrias*, **13**: 23-28.
- MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. (1994): Terrestrial arthropods colonizing an abandoned termite nest in a floodplain forest of the Amazon River during the flood. - *Andrias*, **13**: 17-22.

### Insecta: Allgemeines und mehrere Gruppen

- ABRAHAM, R. (1972): Die Wirkung verschiedener Kulturmaßnahmen auf den Fang flugaktiver Insekten im Botanischen Garten der Universität Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 145-149.
- EIDEL, K. (1937): Beiträge zur Insektenfauna des Rheins. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 40-48.
- NOWOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 46-56.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1974): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras Teil 2: Geographie, Entstehungsgeschichte und Geobiologie. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 129-156.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras Teil 6: Betrachtungen zum Problemkreis „Mimikry“ am Beispiel südostasiatischer Insekten. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 113-151.

### Insecta: Apterygota

- BRETFELD, G. & GAUER, U. (1994): Diagnostic description of the males of new Sphaeridia species (Insecta, Collembola) from South America. - *Andrias*, **13**: 113-136.
- MENDES, L. F. (1983): New data on the Lepismatidae (Apterygota, Zygentoma) from the Cape Verde Islands. - *Andrias*, **3**: 5-8.
- STUMPP, J. & SZEPTYCKI, A. (1989): Eosentomon rusekianum sp. n. a new species of Protura (Arthropoda: Insecta) from South Germany. - *Carolinea*, **47**: 141-146.
- VOLZ, P. (1989): Jahresrhythmen bei Collembolen (Insecta, Apterygota) - Untersuchungen in der Hördter Rheinaue. - *Carolinea*, **47**: 93-116.

### Insecta: Coleoptera

- BECHYNE, J. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Chrysomelidae, Galerucidae und Altricidae (Coleoptera, Phytophaga). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 255-257.

- BIELAWSKI, R. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Coccinellidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 227-230.
- BRECHTEL, F. & KOSTENBADER, H. (1994): Der Florentiner-Prachtkäfer *Coroebus florentinus* (Herbst, 1801) (Coleoptera, Buprestidae) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 75-81.
- FRIEBE, B. (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 3. Die Käferfauna. - *Carolinea*, **41**: 45-80.
- FRIEBE, B. (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* Dieckmann 1982 in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **46**: 148-149.
- FUCHS, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cerambycidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 259.
- GLADITSCH, S. (1969): Die Wasserkäfer eines Kleinbiotops, mit einem Neufund für Süddeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 127-129.
- GLADITSCH, S. (1971): Neue Käferfunde für SW-Deutschland. 5. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleoptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 73-76.
- GLADITSCH, S. (1972): *Dactylosternum insulare* Cast., ein Erstfund für Deutschland und einige weitere für Baden neue Käferarten. 6. Beitrag z. Faunistik d. südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 153-159.
- GLADITSCH, S. (1976): Weitere Käfererstfunde für Südwest-Deutschland mit je einem Erstfund für Mitteleuropa und Deutschland. 9. Beitrag z. Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 149-167.
- GLADITSCH, S. (1978): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 149-158.
- GLADITSCH, S. (1983): 12. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Carolinea*, **41**: 81-86.
- GUIGNOT, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dytiscidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 233.
- HAVELKA, P. (1980): *Meloë violaceus* Marsh, 1802 (Coleoptera, Meloidae) und seine cantariphilen Begleiter an einem Standort nördlich Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 153-159.
- HORION, A. (1954): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 1. Abteilung: Carabidae bis Histeridae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 51-61.
- HORION, A. (1955): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 2. Abteilung: Clavicornia bis Rhyncho-phora. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 57-69.
- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tenebrionidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 235-238.
- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Meloidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 239-240.
- KLESS, J. (1969): *Hygrotus quinque-lineatus* Zett., ein für Mitteleuropa neuer Dytiscide. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 123-125.
- MANDL, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cicindelidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 231-232.
- MRO CZKOWSKI, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermestidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 223-226.
- SCHERPELTZ, O. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Staphylinidae (Coleoptera) 87 Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 249-253.
- SCHOURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. (1996): Laufkäferzönosen südwestdeutscher Wälder - Charakterisierung, Beurteilung und Bewertung von Standorten. - *Carolinea*, **54**: 91-138.
- SCHOPPMANN, A. (1980): Die Bockkäferfauna von Ulm und seiner württembergischen Umgebung (Insecta, Coleoptera: Cerambycidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 143-152.
- VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. (1994): Untersuchungen zur Biologie dreier Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) aus amazonischen Regenwäldern. - *Andrias*, **13**: 161-168.
- VOSS, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Curculionidae (Coleoptera) (131. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 241-248.
- WURST, C. (1997): *Arrhaphipterus zoroastres* n.sp., eine neue Rhipiceride aus dem südlichen Iran (Coleoptera, Dasciloidea, Rhipiceridae). - *Carolinea*, **55**: 105-107.
- ZAWADZKI, F. & SCHMIDT, K. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchung der Laufkäfer in der Rheinaue Rastatt (Coleoptera: Carabidae). - *Carolinea*, **52**: 83-92.

## Insecta: Diptera

- DRISSNER, J., HAVELKA, P. & FUNKE, W. (1994): Dipterenengesellschaften einer Streuobstwiese. 1. Ceratopogonidae. - *Carolinea*, **52**: 111-114.
- FRITZ, H.-G. (1983): Wenig bekannte und neue Diptera/Nematocera (Insecta) aus der nördlichen Oberrheinaue. - *Andrias*, **3**: 9-24.
- FROESE, A. & HAVELKA, P. (1991): Über die Ökologie von Ceratopogoniden (Diptera, Nematocera) auf Ackerflächen. - *Carolinea*, **49**: 126-128.
- GRUNEWALD, J. (1965): Zur Kenntnis der Simuliidenfauna (Diptera) des Südschwarzwaldes und seiner Randgebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 143-152.
- HAVELKA, P. (1978): Blütenbesuchende Ceratopogoniden (Diptera) aus der Umgebung von Tübingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 175-179.
- HAVELKA, P. & RIEDER, N. (1979): Zwei seltene Chironomiden im Oberheingebiet und ihre rasterelektronenmikroskopische Charakterisierung (*Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 125-129.
- HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. (1980): Die Wirkung von Liparol auf die Puppen von *Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer (Insecta, Diptera: Chironomidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 161-164.
- HERING, E. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trypetidae (Diptera) (56. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 319-331.
- HEYNEN, C. (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 11. Die Dipterenlarven. - *Carolinea*, **46**: 115-130.
- KORMANN, K. (1971): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 147-152.

- KORMANN, K. (1973): Beitrag zur Syrphidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Syrphidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 143-158.
- KORMANN, K. (1983): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae), 2. - Andrias, **3**: 25-28.
- KRIEGER-WOLFF, E. & WÜLKER, W. (1971): Chironomiden (Diptera) aus der Umgebung von Freiburg i. Br. (mit besonderer Berücksichtigung der Gattung Chironomus). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 133-145.
- MANNHEIMS, B. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tipulidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 309-311.
- MOUCHA, J. & CHVALA, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tabanidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 313-315.
- MOUCHA, J. & HRADSKY, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Asilidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 317-317.
- NIELSEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Limoniidae (Diptera, Nematocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 305-307
- OLDROYD, H. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Bombyliidae, Therevidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 301-303.
- SCHUMACHER, H. (1968): Die Schwebefliegenfauna im Raum Heidelberg (Ein Beitrag zur Fauna des Landes Baden-Württemberg). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 101-108.
- SMITH, K.G.V. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Conopidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 299-300.
- VOLZ, P. (1983): Zur Populationsökologie der mitteleuropäischen Walddipteren. - Caroleina, **41**: 105-126.
- Insecta: Heteroptera**
- ABRAHAM, R. & ABRAHAM, R. (1971): Beobachtungen an gallbildenden Wanzen Copium cornutum Thunb. und Copium teucii (Host) (Hem., Tingidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 49-56.
- HECKMANN, R. (1996): Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). - Caroleina, Beih., **10**: 1-146.
- HOBERLANDT, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Heteroptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 197-222.
- KÖGEL, F. (1983): Neue und seltene Wasserwanzen (Heteroptera: Amphibiocorisae und Hydrocorisae) aus dem nördlichen Oberrheintiefend. - Caroleina, **41**: 101-104.
- MELBER, A. (1988): Tropidothorax sternalis (Dallas) 1852, eine neue Wanzenart für Italien. - Caroleina, **46**: 147-148.
- RIEGER, C. (1986): Wanzen aus Malta (Insecta, Heteroptera). - Caroleina, **44**: 87-90.
- RIEGER, C. (1997): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). II. - Caroleina, **55**: 43-48.
- RIEGER, C. & GÜNTHER, H. (1982): Bemerkungen zur Gattung Temnostethus Fieber 1860 in Mitteleuropa (Heteroptera, Anthocoridae). - Caroleina, **40**: 100-101.
- RIETSCHEL, S. (1983): Massenvorkommen der Platanen-Gitterwanze Corythucha ciliata in Südfrankreich. - Caroleina, **41**: 132.
- RIETSCHEL, S. (1985): Naucoriden im Mittelmeer als Modellfall für das Vorkommen von Wasserwanzen in den Solnhofener Plattenkalken. - Caroleina, **42**: 143-144.
- VOIGT, K. (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 147-150.
- VOIGT, K. (1971): Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 153-154.
- VOIGT, K. (1977): Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Baden-Württemberg, mit einem Erstnachweis für Deutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 153-158.
- VOIGT, K. (1983): Erstnachweis einiger Wanzenarten für Baden-Württemberg (Hemiptera, Heteroptera). - Caroleina, **41**: 130-131.
- VOIGT, K. (1997): Acetropis gimmerthallii (Flor, 1860), eine für Baden-Württemberg neue Blindwanze (Heteroptera, Miridae). - Caroleina, **55**: 108-110.
- VOIGT, K. & RIETSCHEL, S. (1993): Zur Wanzenfauna der Sandäcker bei Wiesental/Baden. - Caroleina, **51**: 112-114.
- Insecta: Hymenoptera**
- ABRAHAM, R. (1977): Ein Beitrag zur Bionomie von Brachygaster minuta Olivier (Hymenoptera, Evaniidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 173-175.
- ABRAHAM, R. & SCHMIDT, K. (1977): Ein Beitrag zur Faunistik und Phänologie einiger Chalcididae (Chalcidoidea, Hymenoptera) aus der Umgebung von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 177-183.
- BEAUMONT, J. DE (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Sphecidae (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 271-276.
- BEAUMONT, J. DE (1962): Spheciden aus Zentral-Arabien der Ausbeute Diehl (Hym.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 221-224.
- BLÜTHGEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Diploptera und Apoidea (partim) (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 277-287
- COLLINGWOOD, C.A. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Formicidae (Hymenoptera Aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 289-298.
- DOCZKAL, D. & SCHMID-EGGER, C. (1992): Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera, Apoidea). - Caroleina, **50**: 173-176.
- FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. (1994): Diversität von Interaktionen zwischen Ameisen und Pflanzen im südostasiatischen Regenwald. - Andrias, **13**: 169-178.
- HEDWIG, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ichneumonidae, Braconidae (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 291-298.
- HILPERT, H. (1987): Schlupfwespen des Feldberggebietes (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Caroleina, **45**: 147-158.
- KLIMETZEK, D. (1977): Die Ameisenfauna des Naturschutzgebietes „Mindelsee“ (Hymenoptera:Formicidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 159-171.
- KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 10. Die Hymenopteren. - Caroleina, **45**: 135-146.
- LEININGER, H. (1951): Über Bienen, Grab-, Weg-, Faltenwespen und Ameisen aus dem Badischen Oberrheingebiet

- (Hym. aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 113-136.
- MARTINI, R. & RAQUÉ, K. F. (1986): Zwei bedrohte Roßbameisen-Arten in Heidelberg. - *Carolinea*, **44**: 171-172.
- MATTHES, W. & SCHMIDT, K. (1990): Zwei für die Fauna der Bundesrepublik Deutschland neue „Riesenschlupfwespen“ (*Megarhyssa gigas* und *M. perlata*, Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Carolinea*, **48**: 139-144.
- REBMANN, O. (1970): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Megachile* Latreille (Hymenopt., Apidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 155-159.
- ROSCISZEWSKI, K. & MASCHWITZ, U. (1994): Prey specialisation of army ants of the genus *Aenictus* in Malaysia. - *Andrias*, **13**: 179-187.
- SCHMIDT, K. (1979): Zur Kenntnis der Gasteruptionidae Badens (Hymenoptera, Evanoidea). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 117-123.
- SCHMIDT, K. & ZMUDZINSKY, F. (1983): Beiträge zur Kenntnis der badischen Schlupfwespenfauna (Hymenoptera, Ichneumonidae) 1. Xoridae, Acaenitiinae, Pimplinae (Poemeniini, Rhyssini). - *Andrias*, **3**: 97-103.
- SCHRÖDER, P. & STREIT, B. (1979): Zur Verbreitung von *Agrotypus armatus* Curtis (Hymenoptera: Agrotypidae) in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 113-115.
- SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. (1994): Prey spectrum of two army ant species in central Amazonia, with special attention on their effect on spider populations. - *Andrias*, **13**: 189-198.
- SONNENBURG, H. (1996): Die Ameisenfauna (Hymenoptera, Formicidae) von Streuobstwiesen bei Rastatt (Baden). - *Carolinea*, **54**: 139-148.
- STRITT, W. (1937): Pontische Blattwespen (*Megalodontes* Latr.) an pontischen Pflanzen (Hym., Tenth.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 217-220.
- STRITT, W. (1941): Die deutschen Arten der Halmwespengattung *Hartigia* Schdt. (Hym., Tenth.). - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 115-125.
- STRITT, W. (1951): Die Biologie der Blattwespe *Pamphilus aurantiacus* Gir. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 137-141.
- STRITT, W. (1952): Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 37-44.
- STRITT, W. (1954): Eine Massenzucht des Birkenblatt-Minierers *Heterarthrus* (*Phyllotoma*) *nemoratus* Hall. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 47-50.
- STRITT, W. (1960): Nachtrag zu: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 188-189.
- STRITT, W. (1960): Die bisher unbekannte Larve der Blattwespe *Arge melanochroma* Gmel. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 58-59.
- STRITT, W. (1961): Die Goldwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Chrysididae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 43-48.
- STRITT, W. (1962): Einige bemerkenswerte Hautflügler (Hymenoptera) aus dem Wutachgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 49-50.
- STRITT, W. (1963): Die Wegwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Pompilidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 97-106.
- STRITT, W. (1968): Ergänzungen zur Hautflüglerfauna Badens (Hymenoptera aculeata und Chrysididae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 109-112.
- STRITT, W. (1969): Seltene Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 131.
- STRITT, W. (1971): Zwei für Deutschland neue Grabwespen - *Alysson tricolor* Lepeletier und *Solierella c. compedita* Piccioli (Hym., Sphec.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 155-156.
- VERHAAGH, M. (1988): „Parasitierung“ einer Ameisen-Pflanzen-Symbiose im neotropischen Regenwald? - *Carolinea*, **46**: 150.
- VERHAAGH, M. (1994): *Pachycondyla luteola* (Hymenoptera, Formicidae), an inhabitant of *Cecropia* trees in Peru. - *Andrias*, **13**: 214-224.
- VERHAAGH, M. (1994): Neue Fundstellen einiger Ameisen in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **52**: 115-118.
- VERHAAGH, M. & ROSCISZEWSKI, K. (1994): Ants (Hymenoptera, Formicidae) of forest and savanna in the Biosphere Reserve Beni, Bolivia. - *Andrias*, **13**: 199-214.
- WESTRICH, P. (1982): Zur Verbreitung der Knopfnornblattwespen-Gattung *Corynis* in Baden-Württemberg (Hymenoptera, Cimbicidae). - *Carolinea*, **40**: 102-103.
- WESTRICH, P. (1983): Zur Biologie der Keulenwespe *Sapygina decemguttata* (Jurine) (Hymenoptera, Sapygidae). - *Carolinea*, **41**: 134-136.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1982): *Crossocerus acanthophorus* (Kohl 1892) neu für Deutschland (Hymenoptera, Sphecidae). - *Carolinea*, **40**: 104-105.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1985): Für Baden-Württemberg neue und seltene Bienen und Wespen (Hymenoptera Aculeata). - *Carolinea*, **42**: 115-120.
- WOLF, A. (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - *Carolinea*, **46**: 145-146.
- ZIRNGIEBL, L. (1936): Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Cenchi bei den Blattwespen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 37-41.
- ZIRNGIEBL, L. (1937): Die Legewerkzeuge der Blattwespen (Tenthredinoidea). 1. Teil. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 68-99.
- ZIRNGIEBL, L. (1938): Die Legewerkzeuge der Blattwespen (Tenthredinoidea). II. Teil (Schluß). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 39-65.

### Insecta: Lepidoptera

- AMSEL, H. G. (1950): Kleinschmetterlinge aus dem badischen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 26-28.
- AMSEL, H. G. (1953): Über einen tiergeographisch interessanten Kleinschmetterling Süddeutschlands. Die Unterartbildung bei *Pristophora florella* Mn. (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 12-16.
- AMSEL, H. G. (1955): Irakische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 119-129.
- AMSEL, H. G. (1955): Eine neue *Dysmasia*-Art aus Portugal (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 130-131.
- AMSEL, H. G. (1956): Kleinschmetterlinge vom mittleren Jordantal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 56-62.
- AMSEL, H. G. (1957): Neue *Microtineiden* aus Portugal (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 30-33.
- AMSEL, H. G. (1957): Pyraliden-Studien I (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 105-109.
- AMSEL, H. G. (1958): Eine neue *Anarsia*-Art aus den Basses-Alpes in Frankreich (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 179.
- AMSEL, H. G. (1958): Kleinschmetterlinge aus Nordost-Arabien der Ausbeute A. S. Talhouk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 61-82.



- AMSEL, H. G. (1961): Microlepidopteren aus SW-Arabien der Ausbeuten H. Scott und E.B. Britton 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 49-61.
- AMSEL, H. G. (1961): Über einige bemerkenswerte Kleinschmetterlinge des Naturschutzgebietes von Unteruhldingen am Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 93-98.
- AMSEL, H. G. (1961): Zwei neue Evippe-Arten aus Afghanistan, Iran und Nord-Syrien (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 99-103.
- AMSEL, H. G. (1961): Zur Systematik von *Margaretania superba* Amsel 1961 (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 105.
- AMSEL, H. G. (1964): Zur Herausgabe der "Microlepidoptera Palaearctica" - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 73-80.
- AMSEL, H. G. (1964): Ein neuer Kleinschmetterling als Pistazien-Schädling aus Iran (Lepidoptera: Oinophilidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 107-109.
- AMSEL, H. G. (1967): Eine neue afghanische *Stenoptilia*-Art (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 15-16.
- AMSEL, H. G. (1967): Die afghanischen Arten des Anarsia-Komplexes. Zugleich eine vorläufige Revision der sonstigen paläarktischen Arten (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 17-31.
- AMSEL, H. G. (1968): Über Homonymien bei afghanischen Coleophoriden (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 49-50.
- AMSEL, H. G. (1969): Eine neue chinesische *Ethmia*-Art (Lepidoptera: Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 75-76.
- AMSEL, H. G. (1969): Die afghanischen *Ethmia*-Arten (Lepidoptera: Ethmiidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Deutschen Afghanistan-Expedition d. Landessammlungen f. Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 115-119.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische Pyraustinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Afghanistan-Expedition d. Landessammlungen f. Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 25-66.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische quadrifine Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse d. 1. u. 2. Afghanistan-Expedition d. Landessammlungen f. Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 67-89.
- AMSEL, H. G. (1972): Depressarien aus Afghanistan, Iran, Irak und Arabien (Lepidoptera: Oecophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 133-144.
- AMSEL, H. G. (1974): Neue iranische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 197-203.
- AMSEL, H. G. (1977): Vier neue Kleinschmetterlinge aus Iran (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 227-236.
- AMSEL, H. G. (1978): Eine neue Carposinide aus West-Iran (Lepidoptera: Carposinidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 215-216.
- AMSEL, H. G. (1983): Die Gattungen *Lymira* Ragonot 1888 und *Hosidia* Hampson 1901 (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Peorini). - Andrias, **3**: 55-58.
- ARENBERGER, E. (1972): Eine neue *Agdistis*-Art aus Kleinasien (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 151-152.
- ARENBERGER, E. (1973): Eine neue *Agdistis*-Art von den Kanarischen Inseln (Lep., Pterophoridae) *Agdistis pseudocanariensis* spec. nov. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 179-180.
- ARENBERGER, E. (1977): Die palaearktischen *Agdistis*-Arten (Lepidoptera, Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 185-226.
- ARENBERGER, E. (1983): Ergänzungen zur Gattung *Agdistis* (Lepidoptera, Pterophoridae). - Andrias, **3**: 51-54.
- BALDIZZONE, G. (1983): Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XXXIV. (Les taxa décrites par H. G. Amsel). - Andrias, **3**: 37-50.
- BALDIZZONE, G. & KALTENBACH, T. (1983): Eine neue Coleophoride aus Sardinien (Lepidoptera, Coleophoridae). - Andrias, **3**: 33-36.
- BLESZYNSKI, S. (1959): Materialien zur Kenntnis der Crambinae. 21. Teil. Studien über eynale Crambinae aus dem Nahen Osten (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 112-116.
- BOURSIN, C. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Noctuidae-Trifinae (Lep.). (Beiträge zur Kenntnis der „Noctuidae-Trifinae“, 111) - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 373-398.
- CAPUSE, I. (1974): Beiträge zum Studium der Familie Coleophoridae, IX (Lepidoptera) Über die von A. Caradja beschriebenen Taxa der Gattung *Coleophora*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 179-195.
- DANIEL, F. (1958): Zwei neue *Rethera*-Arten aus Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 83-84.
- EBERT, G. (1964): Die Macrolepidopteren-Sammlungen der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe und ihre Neugestaltung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 87-106.
- EBERT, G. (1967): Bemerkungen zur Verbreitung, Ökologie und Phaenologie afghanischer Schmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 109-135.
- EBERT, G. (1971): Drei neue Macrolepidoptera-Arten aus Iran. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 65-71.
- EBERT, G. (1974): Zur Taxonomie und Verbreitung der Ocnogyna nordstroemi-Artengruppe (Lep./Arct.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 169-176.
- EBERT, G. (1974): Zwei neue Taxa der Gattung *Zygaena* (*Mesembrynus*) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 163-168.
- EBERT, G. (1977): Die Macrolepidopteren-Sammlung der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe und ihre Neugestaltung (2. Teil). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 247-260.
- EBERT, G. (1978): Neue Taxa paläarktischer Noctuidae aus dem wissenschaftlichen Nachlass von Charles Boursin (Lep./Noct. Trifin.). 1. Die Arten der Gattung *Oncocnemis* Lederer, 1853. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 193-207.
- FRITZ, A. (1954): Neue Schmetterlinge vom Kaiserstuhl. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 84-85.
- GREMMINGER, A. (1950): Die Schmetterlingsfauna des Wutachgebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 55-69.
- GREMMINGER, A. (1952): Nachtrag zum Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf (Oberrheinische Tiefebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 116-121.
- GREMMINGER, A. (1954): Die Schmetterlings-Eule *Thalpocharis* Ld. (*Porphyria* Hb.) *parva* Hb. in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 62-63.
- HERMANN, G. & STEINER, R. (1997): Eiablage- und Larvalhabitat des Komma-Dickkopffalters (*Hesperia comma* Linné, 1758) in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Hesperidae). - Caroleina, **55**: 35-42.
- HERRMANN, R. (1983): Die Arten der Gattungen *Dahlica* Enderlein und *Sideria* Meier in Südbaden (Lepidoptera, Psychidae). - Caroleina, **41**: 87-96.
- JACOBI, K. & MENNE, B. (1991): Zur Fortpflanzungsbiologie der troglomorphen Kreuzdornspanners *Tiphosa dubitata* L. (Lepidoptera, Geometridae). - Caroleina, **49**: 129-130.

- KALTENBACH, T. (1980): Beitrag zur Coleophoridenfauna Badens (Lepidoptera, Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 165-166.
- KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. (1994): Zur Autökologie und Verbreitung des Kreuzenian-Ameisenbläulings, *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904). - *Carolinea*, **52**: 93-109.
- KOUTSAFTIKIS, A. (1973): Nachträge, Ergänzungen und Ökologisch-Zoogeographische Berichtigungen der Nymphalidae-Fauna Griechenlands (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 169-177
- KÜPPERS, P. V. (1974): Eine Rasse von *Graphium agesilus* Guerin & Percheron, 1835 (Lep. Papilionidae) aus Nord-Peru. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 157-161.
- KÜPPERS, P. V. (1977): B) Zur Problematik der BATES'schen Mikriky bei *Papilio memnon* L. und seinen „Vorbildern“ Siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 134-151.
- KÜPPERS, P. V. (1977): Zur taxonomischen Neuorientierung der Adelidae Deutschlands (Adeliden-Studien I). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 239-246.
- KÜPPERS, P. V. (1978): Neue und wenig bekannte *Delias* (Lepidoptera, Pieridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 181-191.
- LATTIN, G. DE (1959): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Cynaeda* Hb. (Lepid., Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 106-111.
- LATTIN, G. DE (1963): Über die Arten der *Ethmia pusiella* L.-Gruppe (Lep.-Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 45-64.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 70-77
- LINGENHÖLE, A. (1985): Zucht und Flugverhalten von *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera). - *Carolinea*, **43**: 124-125.
- NICOLESU, E. V. (1977): *Amselma*, eine neue androkoniale Bildung im Thorax von Schmetterlingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 237.
- PASSERIN D'ENTREVES, P. (1983): Anmerkungen zu einigen palaearktischen Scythriden (Lepidoptera, Scythrididae) und Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Scythris*. - *Andrias*, **3**: 25-32.
- PEKARSKY, P. (1968): Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgruppe. *Zygaena diaphana* Stgr. im südlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 117
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus SW-Arabien der Ausbeuten H. Scott und E. B. Britton 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 63-65.
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus Riad (Zentral-Arabien) der Ausbeute von E. Diehl (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 107-110.
- PETERSEN, G. (1962): Beitrag zur Kenntnis der südeuropäischen Tineiden (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 205-220.
- PETERSEN, G. (1964): Tineiden von Karatschi (Pakistan) Fars (SW-Iran) und den Bahrein-Inseln. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 111-122.
- RAZOWSKI, J. (1957): Neue Wickler-Arten aus der Sammlung *Amsel* (Lepidoptera: Tortricidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 101-104.
- RAZOWSKI, J. (1967): Afghanische Wickler-Arten (Lepidoptera: Tortricidae und Cochyliidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 91-108.
- RENNER, F. (1983): Neues aus der *Pyrgus alveus*-Gruppe für den mitteleuropäischen Raum (Lepidoptera, Hesperidae). - *Carolinea*, **41**: 133-134.
- ROESLER, R. U. (1966): Beschreibung von neuen Taxa des *Homoeosoma-Ephestia*-Komplexes (Lepidoptera, Phycitidae) aus der Paläarktis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 43-69.
- ROESLER, R. U. (1977): A) Die verschiedenen Erscheinungsformen der *Mimikry*. Siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977) - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 113-133.
- ROESLER, R. U. (1978): Eine neue Pyralide an *Loranthus* aus Pakistan. Phycitinen-Studien XVI (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 209-214.
- ROESLER, R. U. (1982): Der Zünsler *Vitula biviella* (Zeller 1848) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) neu für die Fauna Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **40**: 105-106.
- ROESLER, R. U. (1982): Eine neue Futterpflanze für den Zünsler *Alispa angustella* (Hübner 1796) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae). - *Carolinea*, **40**: 106.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1979): Die Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih., **3**: 1-249.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1981): Die Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil B, Ökologie und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih., **4**: 1-282.
- SATTLER, K. (1962): Über *Parapodia sinaica* (Frauenfeld, 1860) (Lep., Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 51-53.
- SATTLER, K. (1967): Die Gattungen *Ornativalva* Gozmany und *Horridovalva* gen. n. (Lepidoptera, Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 33-90.
- SAUTER, W. (1973): Das *Retinaculum* als systematisches Merkmal bei den Pyraliden (Lep. Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 161-168.
- SPEIDEL, W. (1979): Eine für Baden neue *Pyraustine* (Lepidoptera, Crambidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 133-134.
- STAIB, W. (1974): Bemerkenswerte Schmetterlinge vom Kaiserstuhl und der näheren Umgebung, mit einer für Deutschland neuen Art. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 177-178.
- STROBEL, K. (1968): Beiträge zur Lepidopterenfauna von Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 113-115.
- THOMAS, W. (1974): *Cnephisa tyrhaenica* *Amsel* und *Grapholitha lobarzewskii* *Nowicki* (Lep., Tortr.) - zwei für Deutschland neue Wickler. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 205-207
- THOMAS, W. & RESHÖFT, K. (1983): Zur Biologie von *Ocnogyna afghanicola* Ebert 1974 (Lepidoptera, Arctiidae). - *Andrias*, **3**: 71-72.
- TOLL, S. v. & AMSEL, H. G. (1967): Coleophoriden aus Afghanistan (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 5-16.
- TRAUB, B. (1979): Eine für Baden-Württemberg neue Pyralide (Lepidoptera, Phycitinae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 131-132.
- TRAUB, B. & BAUER, E. (1983): Die Eulenfalter der Kapverdischen Inseln (Lepidoptera, Noctuidae). - *Andrias*, **3**: 59-70.
- WAGENER, S. (1983): Struktur und Skulptur der Eihüllen einiger *Melanargia*-Arten (Lepidoptera, Satyridae). - *Andrias*, **3**: 73-96.
- WILTSHIRE, E. P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Middle East Lepidoptera, XV. A second contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 337-371, Taf. II-IV.
- WILTSHIRE, E. P. (1967): Middle East Lepidoptera. XX. A third contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26** (3): 137-169.
- WILTSHIRE, E. P. (1971): Middle East Lepidoptera. XXIX: Noctuidae Quadrifinae. Taken by G. Ebert and colleagues in Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 57-63.

**Insecta: Odonata**

- BUCHWALD, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer *Cordulegaster bidentatus* (Odonata) in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **46**: 49-64.
- HEYMER, A. (1968): Über ein Vorkommen von *Platycnemis latipes* Rambur, 1842 im Ober-Elsaß (Odonata: Zygoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 35-36.
- JURZITZA, G. (1962): Die Libellen zweier Hochmoore des nördlichen Schwarzwaldes (Wildsee- und Hohloh-Moor bei Kaltenbronn) (Odonata). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **21**: 45-47.
- JURZITZA, G. (1963): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 3. Mitteilung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 107-111.
- JURZITZA, G. (1964): Ein Beitrag zur subspezifischen Gliederung der *Aeschna subarctica* Walker in Europa (Odonata, Aeschnidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 123-135.
- JURZITZA, G. (1964): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe. IV. Mitteilung: *Ceriagrion tenellum* (de Villers) in Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 71-72.
- JURZITZA, G. (1965): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 37-39.
- JURZITZA, G. (1965): Ein Beitrag zur Kenntnis der Odonatenfauna von Nordost-Spanien, mit Bemerkungen zur Rassenfrage der *Agrion haemorrhoidalis* (Van der Linden). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 183-187.
- JURZITZA, G. (1966): Über interspezifische Paarungsversuche bei Odonaten. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 71-72.
- JURZITZA, G. (1967): Ein Beitrag zur Kenntnis der *Boyeria irene* (Fonscolombe) (Odonata, Aeschnidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 149-154.
- JURZITZA, G. (1970): Beobachtungen zur Ökologie und Ethologie von *Ischnura pumilio* (Charp.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **29**: 151-153.
- JURZITZA, G. & KORMANN, K. (1960): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe (Baden). 2. Mitteilung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 56-57.
- KIAUTA, B. (1963): *Lindenia tetraphylla* v.d.Lind. und *Somatochlora metallica meridionalis* Nielsen aus Nordweststrien (Jugoslawien) (Odonata: Gomphidae, Corduliidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 65-66.
- KIAUTA, B. & JURZITZA, G. (1972): Erstes Europäisches Symposium für Odonatologie und Gründung der „Societas Internationalis Odonatologica“ - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 185.
- KORMANN, K. (1965): Libellensammlung nach modernen Gesichtspunkten (Odonata). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 189-191.
- KORMANN, K. (1966): Beitrag zur Odonatenfauna der Umgebung von Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 133-139.
- SCHMIDT, B. (1993): Die Sibirische Winterlibelle (Odonata) im südwestlichen Alpenvorland. - *Carolinea*, **51**: 83-92.
- SCHMIDT, E. (1957): Was ist *Somatochlora sibirica* Trybom? Ein Indizienbeweis, zugleich Versuch einer Gruppierung der paläarktischen Arten der Gattung (Odonata). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 92-100.
- SCHMIDT, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe, sowie der Expeditionen J. Klapperich, Bonn 1952-53 und Dr. K. Lindberg, Lund (Schweden) 1957-60. Libellen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 399-435, Taf. XI.

**Insecta: Orthoptera**

- DETZEL, P. (1987): Die Dornschrecke *Tetrix ceperoi* neu für Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **45**: 162.
- DIRSH, V. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Acridoidea (Orthoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 263-266.
- RIEDE, K. & DUFFNER, K. (1994): Systematik und Biogeographie nordwestamazonischer Orthopteren. - *Andrias*, **13**: 151-160.
- WEBER, J. & ZIMMERMANN, P. (1990): Neufunde der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **48**: 149-150.
- WOLF, A. (1993): Zur Verbreitung der Heuschrecken in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **51**: 115-118.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1991): Neufunde der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 137-138.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1993): Zur Verbreitung und Lebensweise der Rotflügeligen Schnarrschrecke im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 119-122.

**Insecta: Neuroptera**

- ASPÖCK, H. & ASPÖCK, U. (1965): Die Neuropteren Vorderasiens. 1. Coniopterygidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 159-181.
- HÖLZEL, H. (1967): Die Neuropteren Vorderasiens. II. Chrysopidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 19-45.
- HÖLZEL, H. (1968): Die Neuropteren Vorderasiens. III. Nempoteridae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 37-47.
- HÖLZEL, H. (1972): Die Neuropteren Vorderasiens. IV. Myrmeleonidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **Beih.**, **1**: 3-103.

**Insecta: Trichoptera**

- MALICKY, H. (1978): Beiträge z. Kenntnis der Insektenfauna Sumatras. Teil 7: Köcherfliegen (Trichoptera) aus Sumatra und West-Neuguinea. I. Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Stenopsychidae, Goeridae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 159-173.
- MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. (1985): Ein Gerät zur Freilandbeobachtung des nächtlichen Verhaltens von benthischen Bachtieren, mit Befunden aus der Gattung *Hydropsyche* (Trichoptera, Insecta). - *Carolinea*, **42**: 121-128.
- SCHMID, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trichoptera. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 333-336.
- SCHRÖDER, P. (1976): Zur Phänologie von *Hydropsyche instabilis* Curtis (Trichoptera, Köcherfliegen) im Föhrenbach/Schwarzwald, unter besonderer Berücksichtigung der Larvenstadien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 137-148.

**Insecta: Übrige Gruppen**

- BEIER, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Mantidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 267.
- BRECHTEL, F., EHRMANN, R. & DETZEL, P. (1996): Zum Vorkommen der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* (Linné, 1758) in Deutschland. - *Carolinea*, **54**: 73-90.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 7 Der Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia*. - *Carolinea*, **43**: 105-112.

- HINCKS, W. D. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermaptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 261.
- MALZACHER, P. (1973): Eintagsfliegen des Bodenseegebietes (Insecta, Ephemeroptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 123-142.
- MALZACHER, P. (1976): Nachtrag zur Eintagsfliegenfauna des Bodenseegebietes. - Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Caenis* (Insecta, Ephemeroptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 129-136.
- MARTIUS, C. (1994): Termite nests as structural elements of the Amazon floodplain forest. - *Andrias*, **13**: 137-150.
- PRINCIS, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Blattariae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 269-270.

### Crustacea: Allgemeines und mehrere Gruppen

- EINSLER, U. (1964): Das Crustaceenplankton des Mindelsees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 53-70.
- EINSLER, U. (1969): Populationsdynamische und synökologische Studien am Crustaceen-Plankton zweier Kleinseen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 53-73.
- KIEFER, F. (1957): Die Grundwasserfauna des Oberrheingebietes mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 65-91.
- KIEFER, F. & MUCKLE, R. (1959): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1957. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 5-41.
- MUCKLE, R. (1972): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1962. II. Jahreszeitliches Auftreten der Arten 1957-1962 und Tiefenverteilung *A. Vorbemerkung, Diaphanosoma brachyurum* und *Leptodora kindtii* (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 103-131.

### Crustacea: Phyllozoa

- EINSLER, U. (1959): Über *Dunhevedia crassa* King (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 62-64.
- FRENZEL, P. (1977): Zur Populationsdynamik und Morphologie pelagischer Cladocera in einem Baggersee der nördlichen Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 91-108.
- FRENZEL, P. (1980): Neue Nachweise von *Scapholeberis aurita* (Fischer, 1849) in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 177-179.
- MUCKLE, R. & DILLMANN-VOGEL, H. (1976): Die bisexuelle Fortpflanzung in der *Daphnia longispina*-Gruppe des Bodensee-Obersees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 81-94.
- RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H. (1979): Über das Auftreten einiger seltener Blattfußkrebse im Raum Karlsruhe (*Triops cancrivorus* Bosc, *Limnadia lenticularis* (Linnaeus), *Siphonophanes grubei*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 135-139.
- RITZI, M. (1940): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). 2. *Daphnia longispina* und *Daphnia cucullata* (Phyllozoa) im Gnadensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 62-71.
- RÖBEN, P. (1970): Zur Crustaceenfauna (freilebende Cyclopida, Calanoida und Cladocera) der Heidelberger Umgebung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 115-146.

### Crustacea: Ostracoda

- LÖFFLER, H. (1961): Grundwasser- und Brunnenostracoden aus Südwestdeutschland und den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 31-42.

### Crustacea: Copepoda

- EINSLER, U. (1959): Zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 59-61.
- EINSLER, U. (1992): Nordamerikanische Arten der Gattungen *Eucyclops* und *Acanthocyclops* (Crustacea, Copepoda) aus alten Proben der Sammlung F. Kiefer. - *Andrias*, **9**: 195-210.
- EINSLER, U. (1992): Neu- und Wiederbeschreibungen einiger Arten der Gattung *Cyclops* s. str. (Copepoda, Cyclopoida) aus der Türkei und Asien. - *Andrias*, **9**: 179-194.
- FRANKE, U. (1989): Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. Friedrich Kiefer. - *Carolinea, Beiheft*, **5**: 3-433.
- FRENZEL, P. (1976): Beitrag zur Kenntnis der Fimbriatus-Gruppe des Genus *Paracyclops*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 119-124.
- FRENZEL, P. (1977): Fortpflanzungsrate bei *Paracyclops fimbriatus* s.l. (Fischer, 1853) (Crustacea: Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 109-112.
- KIEFER, F. (1936): Über die Krebstiere, insbesondere die Ruderfußkrebse des Eichener Sees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 157-162.
- KIEFER, F. (1936): Über das Vorkommen von Blattfußkrebsen (Euphyllopoda) in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 255-262.
- KIEFER, F. (1953): Ruderfußkrebse aus dem Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 4-11.
- KIEFER, F. (1954): Zur Kenntnis der freilebenden Ruderfußkrebse des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 86-92.
- KIEFER, F. (1958): Verzeichnis der in Südwestdeutschland gefundenen freilebenden Ruderfußkrebse. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 46-60.
- KIEFER, F. (1959): Unterirdisch lebende Ruderfußkrebse vom Hochrhein und Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 42-52.
- KIEFER, F. (1959): Über einige Ruderfußkrebse aus Südschweiz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 53-58.
- KIEFER, F. (1974): Zwei neue Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus Malaysia. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 219-222.
- KIEFER, F. (1974): Beitrag zur Kenntnis der castor-Gruppe der Gattung *Diatomus* (sens. restr.) (Crustacea, Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 209-218.
- KIEFER, F. (1976): Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sandlickensystem einiger Bäche der Ostalpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 111-118.
- KIEFER, F. (1976): Revision der *robustus-vernalis*-Gruppe der Gattung *Acanthocyclops* Kiefer (Crustacea, Copepoda) (Mit eingehender Beurteilung des „*Cyclops americanus* Marsh 1892“). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 95-110.
- KIEFER, F. (1981): Ein neuer brunnenbewohnender Cyclopide (Copepoda, Cyclopoida) aus Syrien. - *Andrias*, **1**: 101-102.

### Crustacea: Malacostraca

- BESCH, W. (1968): Zur Verbreitung der Arten des Genus *Rivulogammarus* in Fließgewässern Nordbadens und Südwürttembergs. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 27-33.

- HAUER, J. (1959): Raumparasitische Rotatorien aus der Kiemenhöhle des Steinkrebse (Potamobius torrentium Schrank). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 92-105.
- KINZELBACH, R. (1965): Ein Strandfloh, *Orchestia cavimana* Heller, am Oberrhein. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 153-157
- STORCH, V. & BURKHARDT, P. (1986): Die Reaktion der Mitteldarmdrüse des Süßwasserstrandfloh *Orchestia cavimana* auf verschiedene Nahrung. - Caroleinea, **44**: 149-152.
- VERHOEFF, K. W. (1937): Die Isopoden des alemannischen Gäues und ihre geographisch-ökologische Beurteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 22-39.

### Arachnida: Araneae

- BLANKE, R. (1974): Der Zusammenhang zwischen Beuteangebot und Reproduktionsrate bei *Cyrtophora citricola* Forskal (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 223-228.
- BLANKE, R. (1976): Über das bisher unbekannt Männchen von *Cyrtophora stellata* Simon (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 125-127
- BONALDO, A. B. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Revision of the neotropical spider genus *Stethorrhagus* (Araneae, Corinnidae). - Andrias, **13**: 33-64.
- BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldboden 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - Caroleinea, **52**: 61-74.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Amazoromus*, a new genus of the spider family Gnaphosidae (Araneae) from central Amazonia, Brazil. - Andrias, **13**: 65-70.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Heidrunea*, a new genus of the spider subfamily Rhoicininae (Araneae, Trechaleidae) from central Amazonia, Brazil. - Andrias, **13**: 71-80.
- BRIGNOLI, P. M. (1978): Spinnen aus Brasilien. IV. Zwei neue blinde Bodenspinnen aus Amazonien (Arachnida, Araneae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 143-147.
- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 4. Die Spinnenfauna. - Caroleinea, **42**: 75-106.
- HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Ergebnisse der Bolivien-Expedition des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe: Spinnen (Araneae). - Andrias, **13**: 99-112.
- HÖFER, H., BRESCOVIT, A. D. & GASNIER, T. (1994): The wandering spiders of the genus *Ctenus* (Ctenidae, Araneae) of Reserva Ducke, a rainforest reserve in central Amazonia. - Andrias, **13**: 81-98.
- HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Schneckengehäuse für die Überwinterung und das Brutverhalten von *Pellenes nigrociliatus* L. KOCH, 1874 in Steppenrasenformationen (Araneae, Salticidae). Heidelberger Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Gebietes. Nr. 2. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 167-175.
- NÄHRIG, D. (1991): Zur Phänologie und Ökologie der *Enoplophagata ovata*-Gruppe (Araneae: Theridiidae). - Caroleinea, **49**: 131-133.
- SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. (1994): Prey spectrum of two army ant species in central Amazonia, with special attention on their effect on spider populations. - Andrias, **13**: 189-198.
- WOLF, A. (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - Caroleinea, **46**: 145-146.

### Arachnida: Opiliones

- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 5. Die Weberknechte. - Caroleinea, **42**: 107-114.
- FRIEBE, B. (1978): Ein weiterer Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigii* Panzer 1794 (Opiliones) im Nordschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 109-111.
- HAGEN, H.-O. v. (1973): Ein Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigii* (Opiliones) aus dem nördlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 159-160.
- PINTO-DA-ROCHA, R. (1994): A new species of *Santinezia* from central Amazonia, with systematic comments on the genus (Arachnida, Opiliones, Cranidae). - Andrias, **13**: 29-32.

### Arachnida: Pseudoscorpiones

- BEIER, M. (1967): Ein phoretischer Allochernes (Pseudoscorp.) aus Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 17-18.
- BEIER, M. (1969): Ein neuer Allochernes (Pseudoscorp.) vom Elbursgebirge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 121-122.
- BRAUN, M. & BECK, L. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 9. Die Pseudoskorpione. - Caroleinea, **44**: 139-148.
- STREBEL, O. (1937): Beobachtungen am einheimischen Bücherskorpion *Chelifer cancelloides* L. (Pseudoscorpiones). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 143-155.

### Arachnida: Acari

- BECK, L. & WOAS, S. (1991): Die Oribatiden-Arten (Acari) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. I. - Caroleinea, **49**: 37-82.
- BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. (1990): Zur Taxonomie der Phtiracarur-Arten (Acari, Oribatei) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. - Andrias, **7**: 61-90.
- EBERMANN, E. (1986): Zur Kenntnis der Scutacariden Südamerikas (Acari, Tarsonemina). - Andrias, **5**: 15-14.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some basic oppiid-like taxa (Acari, Oribatei) from Amazonia. - Andrias, **9**: 57-74.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some oribatid mites of the family Oppiidae (Acari, Oribatei) from Amazonia. - Andrias, **9**: 5-56.
- JÖRGER, V. (1987): *Saprosecan lateroplumosa* n. sp. (Gamasina, Halolaelapidae), eine neue Raubmilbenart. - Caroleinea, **45**: 163-166.
- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 155-160.
- NÜBEL-REIDELBACH, E. (1994): Taxonomie und Systematik der Gattung *Tectocepheus* Berlese, 1895 (Acari, Oribatei). - Andrias, **12**: 3-94.
- NÜBEL-REIDELBACH, E. & WOAS, S. (1992): Einige basale Arten der cepheiden und der pterogasterinen Entwicklungslinie der Höheren Oribatiden (Acari, Oribatei). - Andrias, **9**: 75-119.
- SCHWOERBEL, J. (1961): Quell- und grundwasserbewohnende Arrenuriden in der Fauna Südwestdeutschlands (Acari: Arrenuridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 85-92.
- SCHWOERBEL, J. (1962): Subterrane Süßwassermilben (Hydrachnellae) aus dem Bregenger Wald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 33-43.
- WALTER, G. (1990): Zeckenfunde (Ixodoidea, Ixodidae) aus Paraguay und Peru. - Andrias, **7**: 169-170.
- WAUTHY, G., VERA, H., LIONS, J.-C., SCHONNE, E. & DENÈGRE, M. (1986): Enzymatic and chronological discrimination in *Quadrupia quadricarinata* (Michael, 1885) (Acari, Oribatida). - Andrias, **5**: 15-20.

- WEIGMANN, G. & WUNDERLE, I. (1990): Zur Taxonomie der europäischen Scheloribatidae (Acari, Oribatei). II. Beschreibung des baumbewohnenden Scheloribates ascendens n. sp. - *Andrias*, 7: 9-14.
- WOAS, S. (1978): Die Arten der Gattung *Hermannia* Nicolet 1855 (Acari, Oribatei). I. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 113-141.
- WOAS, S. (1981): Die Arten der Gattung *Hermannia* Nicolet 1855 (Acari, Oribatei). II. - *Andrias*, **1**: 89-100.
- WOAS, S. (1981): Zur Taxonomie und Phylogenie der *Hermannidae* Sellnick 1928 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **1**: 7-88.
- WOAS, S. (1986): Beitrag zur Revision der *Oppioidea* sensu Balogh, 1972 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **5**: 21-224.
- WOAS, S. (1990): Die phylogenetischen Entwicklungslinien der Höheren Oribatiden (Acari). I. Zur Monophylie der *Poronota Grandjean*, 1953. - *Andrias*, **7**: 91-168.
- WOAS, S. (1992): *Hermannia* (Phyllohermannia) neotropica, eine neue *Hermannidae* aus Südbrasilien (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 163-178.
- WOAS, S. (1992): Beitrag zur Revision der *Gymnodamaeidae* Grandjean, 1954 (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 121-161.
- WUNDERLE, I. (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitate eines Buchenwaldes. - *Carolinea*, **50**: 79-144.
- WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Scheloribatidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - *Andrias*, **7**: 15-60.

## Myriapoda

- FRÜND, H. C. (1991): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 14. Die Hundertfüßer (Chilopoda). - *Carolinea*, **49**: 83-94.
- SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. (1992): Die Biologie eines Buchenwaldbodens 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - *Carolinea*, **50**: 145-170.
- VERHOEFF, K. W. (1936): Unsere Kenntnisse von den Diplopoden des alemannischen Gaues. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 228-254.

## Annelida

- JANS, W. & RÖMBKE, J. (1989): Funde eines terrestrischen Polychaeten (Annelida) in Wäldern Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **47**: 158-162.
- RÖMBKE, J. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 6. Die Regenwürmer. - *Carolinea*, **43**: 93-104.
- RÖMBKE, J. (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 12. Die Enchytraeen. - *Carolinea*, **47**: 55-92.
- RÖMBKE, J. & HANAGARTH, W. (1994): The present faunistic knowledge on terrestrial Oligochaeta from Bolivia. - *Andrias*, **13**: 7-16.

## Mollusca

- FRANKE, U. & GREVEN, H. (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 13. Die Schnecken. - *Carolinea*, **48**: 131-138.
- JAECKEL, S. G. A. (jun.) (1958): Molluskenfunde aus einigen Landesteilen Südwestdeutschlands. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 35-45.
- KIEFER, F. (1956): Ein neuer Fund von *Lartetia rhenana* R. Lais. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 125.
- KUSS, S. E. (1958): Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 166-173.
- WAGNER, G. & BURCHARDT, S. (1978): Molluskenschalen in Sedimenten aus dem Bodensee-Obersee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 103-107

## Nemathelminthes: Nematoda

- HIRLING, W. (1989): Ein räuberischer Nematode, *Parveyellus vorax* n. gen., n. spec. (Nematoda: Mononchida) in Mooren Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **47**: 133-140.
- ZELL, H. (1982): Nematoden eines Buchenwaldbodens 1. *Wilsonema tentaculatum* (Fuchs 1930) (Nematoda, Araeolaimida). - *Carolinea*, **40**: 99-100.
- ZELL, H. (1983): Nematoden eines Buchenwaldbodens 2. *Rhabditis silvatica* Volz 1951 (Nematoda, Rhabditida) - *Carolinea*, **41**: 127-130.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 3. *Prionchulus muscorum* (Nematoda, Monochida). - *Carolinea*, **42**: 57-74.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 4. Die Neotylenchiden (Nematoda, Neotylenchoidea). - *Carolinea*, **43**: 65-76.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 5. Die *Wilsonematinae* (Nematoda, Araeolaimida) - *Carolinea*, **43**: 77-92.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 6. Die *Dorylaimen* (Nematoda, Dorylaimida). - *Carolinea*, **44**: 91-118.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 7. Die *Teratocephaliden* (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **44**: 119-128.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 8. Die *Criconemen* (Nematoda, Criconematina). - *Carolinea*, **45**: 107-120.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 9. Die *Cephaloben* (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **45**: 121-134.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 10. Die *Tylenchen* (Nematoda, Tylenchoidea). - *Carolinea*, **46**: 75-98.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 11. Die *Anguiniden* (Nematoda, Anguinoidea). - *Carolinea*, **46**: 99-114.
- ZELL, H. (1990): Nematoden eines Buchenwaldbodens 12. Die *Aphelenchen* (Nematoda, Aphelenchida). - *Carolinea*, **48**: 121-130.
- ZELL, H. (1991): Nematoden eines Buchenwaldbodens 13. Die Gattung *Bunonema* (Nematoda, Bunonematidae). - *Carolinea*, **49**: 27-36.
- ZELL, H. (1993): Die Gattung *Plectus* Bastian, 1865 sensu lato (Nematoda, Plectidae) - Ein Beitrag zur Ökologie, Biogeographie, Phylogenie und Taxonomie der Plectidae. - *Andrias*, **11**: 3-171.

## Nemathelminthes: Rotatoria

- HAUER, J. (1936): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 129-152.
- HAUER, J. (1937): Zur Kenntnis der Rotatorienfauna des Eicher Sees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 165-173.
- HAUER, J. (1939): Zur Kenntnis der Rüsselrädertiere (Bdelloidea) des Schwarzwaldes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 163-175.
- HAUER, J. (1952): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet „Wutachtal“ - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 45-53.
- HAUER, J. (1956): Ein neuer *Brachionus* (Rotatoria) aus Venezuela. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **15**: 63-64.
- HAUER, J. (1958): Beitrag zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 174-178.
- HAUER, J. (1959): Raumparasitische Rotatorien aus der Kiemenhöhle des Steinkrebse (*Potamobius torrentium* Schrank). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 92-105.

- HAUER, J. (1961): Zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 67-69.
- HAUER, J. (1965): Über einige im Stromgebiet des Amazonas neu entdeckte Rädertiere. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 41-46.
- HAUER, J. (1966): *Brachionus gillardi* n.sp. (Rotatoria). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 73-74.

### Plathelminthes: Turbellaria

- ABRAHAM, R. (1974): Über landlebende Turbellarien *Rhynchodemus bilineatus* (Mecznikow) und *Bipalium kewense* Moseley. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 229-232.
- HAUER, J. (1950): Der nordamerikanische Strudelwurm *Euplana tigrina* (Girard) am Oberrhein. Mit Hinweis auf einige andere aquatile Einwanderer im Stromgebiet des Rheines. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 70-75.
- RIXEN, J.-U. (1965): Einige Turbellarienfundstücke aus dem Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 137-141.

### Coelenterata: Hydrozoa

- LUDWIG, H.W., BECKER, N. & RAMBOW, C. (1979): Die Süßwassermeduse *Craspedacusta sowerbii* (Hydrozoa: Limnomedusae) im Rhein-Neckar-Gebiet. Heidelberger Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Gebietes. Nr. 1. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 141-153.

### Limnologie

- AUERBACH, M. (1940): Zwanzig Jahre Anstalt für Bodenseeforschung der Stadt Konstanz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 55-61.
- AUERBACH, M. (1953): Ein quantitativer Bodengreifer. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 17-22.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 117-119.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee) 1925-1931. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 120-162.
- BESCH, W. (1966): Biologischer Zustand und Abwasserbelastung der Fließgewässer Nordbadens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 141-154.
- CASPERS, N. (1980): Die Makrobenthos-Gesellschaften des Hochrheins bei Bad Säckingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 115-142.
- EIDEL, K. (1937): Beiträge zur Insektenfauna des Rheins. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 40-48.
- EINSLE, U. (1959): Zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 67-69.
- EINSLE, U. (1959): Über *Dunhevedia crassa* King (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 62-64.
- EINSLE, U. (1964): Das Crustaceenplankton des Mindelsees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 53-70.
- EINSLE, U. (1969): Populationsdynamische und synökologische Studien am Crustaceen-Plankton zweier Kleinseen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 53-73.
- EINSLE, U. (1992): Nordamerikanische Arten der Gattungen *Eucyclops* und *Acanthocyclops* (Crustacea, Copepoda) aus alten Proben der Sammlung F. Kiefer. - Andrias, **9**: 195-210.
- EINSLE, U. (1992): Neu- und Wiederbeschreibungen einiger Arten der Gattung *Cyclops* s. str. (Copepoda, Cyclopoida) aus der Türkei und Asien. - Andrias, **9**: 179-194.
- ELSTER, H. J. (1959): Bodensee-Felchen (Coregonen) im Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 87-91.
- FRANKE, U. (1989): Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. Friedrich Kiefer. - Carolinea, Beiheft, **5**: 3-433.
- FRENZEL, P. (1976): Beitrag zur Kenntnis der *Fimbriatus*-Gruppe des Genus *Paracyclops*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 119-124.
- FRENZEL, P. (1977): Fortpflanzungsrate bei *Paracyclops fimbriatus* s.l. (Fischer, 1853) (Crustacea: Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 109-112.
- FRENZEL, P. (1977): Zur Populationsdynamik und Morphologie pelagischer Cladocera in einem Baggersee der nördlichen Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 91-108.
- FRENZEL, P. (1980): Neue Nachweise von *Scapholeberis aurita* (Fischer, 1849) in Südwestdeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 177-179.
- FRIEDRICH, G. & MEIER-BROOK, C. (1987): Die Makrofauna der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen in Kleingewässern in der Umgebung von Tübingen. - Carolinea, **45**: 99-106.
- GRETLE, T. & OSTENDORP, W. (1997): Die Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate am Bodensee. - Carolinea, **55**: 23-34.
- HAUER, J. (1936): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 129-152.
- HAUER, J. (1937): Zur Kenntnis der Rotatorienfauna des Eichener Sees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 165-173.
- HAUER, J. (1939): Zur Kenntnis der Rüsselrädertiere (*Bdeloidea*) des Schwarzwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 163-175.
- HAUER, J. (1950): Der nordamerikanische Strudelwurm *Euplana tigrina* (Girard) am Oberrhein. Mit Hinweis auf einige andere aquatile Einwanderer im Stromgebiet des Rheines. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 70-75.
- HAUER, J. (1952): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet „Wutachtal“. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 45-53.
- HAUER, J. (1956): Ein neuer *Brachionus* (Rotatoria) aus Venezuela. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 63-64.
- HAUER, J. (1958): Beitrag zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 174-178.
- HAUER, J. (1959): Raumparasitische Rotatorien aus der Kiemenhöhle des Steinkrebsses (*Potamobius torrentium* Schrank). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 92-105.
- HAUER, J. (1961): Zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 67-69.
- HAUER, J. (1965): Über einige im Stromgebiet des Amazonas neu entdeckte Rädertiere. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 41-46.
- HAUER, J. (1966): *Brachionus gillardi* n.sp. (Rotatoria). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 73-74.
- HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. (1980): Die Wirkung von Liparal auf die Puppen von *Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer (Insecta, Diptera: Chironomidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 161-164.
- HOPP, I. (1986): Benthalfauna und Steinbesiedlung in einem Schwarzwaldbach. - Carolinea, **44**: 153-162.
- KIEFER, F. (1936): Über die Krebstiere, insbesondere die Ruderfußkrebse des Eichener Sees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 157-162.
- KIEFER, F. (1936): Über das Vorkommen von Blattfußkrebsen (*Euphyllipoda*) in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 255-262.

- KIEFER, F. (1953): Ruderfußkrebse aus dem Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“ - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 4-11.
- KIEFER, F. (1954): Zur Kenntnis der freilebenden Ruderfußkrebse des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 86-92.
- KIEFER, F. (1956): Ein neuer Fund von *Lartetia rhenana* R. Lais. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 125.
- KIEFER, F. (1957): Die Grundwasserfauna des Oberrheingebietes mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 65-91.
- KIEFER, F. (1958): Verzeichnis der in Südwestdeutschland gefundenen freilebenden Ruderfußkrebse. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 46-60.
- KIEFER, F. (1959): Unterirdisch lebende Ruderfußkrebse vom Hochrhein und Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 42-52.
- KIEFER, F. (1959): Über einige Ruderfußkrebse aus Südchile. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 53-58.
- KIEFER, F. (1974): Zwei neue Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus Malaysia. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 219-222.
- KIEFER, F. (1974): Beitrag zur Kenntnis der *castor*-Gruppe der Gattung *Diaptomus* (sens. restr.) (Crustacea, Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 209-218.
- KIEFER, F. (1976): Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sandlückensystem einiger Bäche der Ostalpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 111-118.
- KIEFER, F. (1976): Revision der *robustus-vernalis*-Gruppe der Gattung *Acanthocyclops* Kiefer (Crustacea, Copepoda) (Mit eingehender Beurteilung des „*Cyclops americanus* Marsh 1892“). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 95-110.
- KIEFER, F. (1981): Ein neuer brunnenbewohnender Cyclopoide (Copepoda, Cyclopoida) aus Syrien. - *Andrias*, **1**: 101-102.
- KIEFER, F. & MUCKLE, R. (1959): Beobachtungen am Crustaceen-Plankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1957. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 5-41.
- KINZELBACH, R. (1965): Ein Strandfloh, *Orchestia cavimana* Heller, am Oberrhein. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 153-157.
- KLESS, J. (1969): *Hygrotus quinquelineatus* Zett., ein für Mitteleuropa neuer Dytiscide. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 123-125.
- LEHN, H. (1959): Zur Dynamik im Hypolimnion des Überlinger Sees (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 75-86.
- LÖFFLER, H. (1961): Grundwasser- und Brunnenostracoden aus Südwestdeutschland und den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 31-42.
- LÖFFLER, H. (1977): Fischereibiologische Bewertung der Großen Lauter, einem Forellenbach der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 81-89.
- LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbaches im südlichen Odenwald. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. (1985): Ein Gerät zur Freilandbeobachtung des nächtlichen Verhaltens von benthischen Bachtieren, mit Befunden aus der Gattung *Hydropsyche* (Trichoptera, Insecta). - *Carolinea*, **42**: 121-128.
- MUCKLE, R. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 5-109.
- MUCKLE, R. (1972): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1962. II. Jahreszeitliches Auftreten der Arten 1957-1962 und Tiefenverteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 103-131.
- MUCKLE, R. & DILLMANN-VOGEL, H. (1976): Die bisexuelle Fortpflanzung in der *Daphnia longispina*-Gruppe des Bodensee-Obersees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 81-94.
- RIEDER, N., GRÖSSLE, L., HAVELKA, P. & OTT, H. (1979): Über das Auftreten einiger seltener Blattfußkrebse im Raum Karlsruhe (*Triops cancriformis* Bosc, *Limnadia lenticularis* (Linnaeus), *Siphonophanes gubesi*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 135-139.
- RITZI, M. (1940): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). 2. *Daphnia longispina* u. *Daphnia cucullata* (Phyllozoa) im Gnadensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 62-71.
- RITZI, M. & VOGEL, H. (1959): Ein Beitrag zur Besiedlungsdichte der Tiefenfauna im Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 65-74.
- RIXEN, J.-U. (1965): Einige Turbellarienfundes aus dem Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 137-141.
- RÖBEN, P. (1970): Zur Crustaceenfauna (freilebende Cyclopoida, Calanoida und Cladocera) der Heidelberger Umgebung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 115-146.
- SCHWOERBEL, J. (1961): Quell- und grundwasserbewohnende Arrenuriden in der Fauna Südwestdeutschlands (Acari: Arrenuridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 85-92.
- SCHWOERBEL, J. (1962): Subterrane Süßwassermilben (Hydrachnellae) aus dem Bregenzler Wald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 33-43.
- STORCH, V. & BURKHARDT, P. (1986): Die Reaktion der Miteldarmdrüse des Süßwasserstrandfloh *Orchestia cavimana* auf verschiedene Nahrung. - *Carolinea*, **44**: 149-152.
- VOIGT, K. (1971): Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 153-154.
- WAGNER, G. & BURKHARDT, S. (1978): Molluskenschalen in Sedimenten aus dem Bodensee-Obersee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 103-107.

## Terrestrische Ökologie und Biologie der Tiere

- ABRAHAM, R. (1972): Die Wirkung verschiedener Kulturmaßnahmen auf den Fang flugaktiver Insekten im Botanischen Garten der Universität Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 145-149.
- ABRAHAM, R. (1974): Über landlebende Turbellarien *Rhynchodemus bilineatus* (Mecznikow) und *Bipalium kewense* Moseley. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 229-232.
- ABRAHAM, R. (1977): Ein Beitrag zur Bionomie von *Brachygaster minuta* Olivier (Hymenoptera, Evaniidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 173-175.
- ABRAHAM, R. & ABRAHAM, R. (1971): Beobachtungen an gallbildenden Wanzen *Copium cornutum* Thunb. und *Copium teucii* (Host) (Hem., Tingidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 49-56.
- AUERBACH, M. (1940): Die Wirbeltiere Badens in ihrer Beziehung zur Umwelt und zur Landschaftsform. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 3-54.
- BECK, L. (1978): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 1. Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 93-101.
- BECK, L. (1990): Bodenzoologie und Taxonomie in Karlsruhe. - *Andrias*, **7**: 5-8.
- BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. (1994): Tropische Diversität, ihre Aufrechterhaltung und deren Mechanismen. - *Andrias*, **13**: 5-6.



- BLANKE, R. (1974): Der Zusammenhang zwischen Beuteangebot und Reproduktionsrate bei *Cyrtophora citricola* Forskål (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 223-228.
- BLANKE, R. (1976): Über das bisher unbekannte Männchen von *Cyrtophora stellata* Simon (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 125-127
- BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - Caroleinea, **52**: 61-74.
- BRAUN, M. & BECK, L. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 9. Die Pseudoskorpione. - Caroleinea, **44**: 139-148.
- BRAUN, M. & KISCHNICK, P. (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - Caroleinea, **45**: 159-160.
- BUCHWALD, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer *Cordulegaster bidentatus* (Odonata) in Südwestdeutschland. - Caroleinea, **46**: 49-64.
- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 4. Die Spinnenfauna. - Caroleinea, **42**: 75-106.
- EBERT, G. (1967(3)): Bemerkungen zur Verbreitung, Ökologie und Phaenologie afghanischer Schmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 109-135.
- FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. (1994): Diversität von Interaktionen zwischen Ameisen und Pflanzen im südostasiatischen Regenwald. - Andrias, **13**: 169-178.
- FLOREN, A. & LINSENMAIR, K. E. (1994): Zur Diversität und Wiederbesiedlungsdynamik von Arthropoden auf drei Baumarten in einem Regenwald in Sabah, Malaysia. - Andrias, **13**: 23-28.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 5. Die Weberknechte. - Caroleinea, **42**: 107-114.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 7. Der Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia*. - Caroleinea, **43**: 105-112.
- FRANKE, U. & GREVEN, H. (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 13. Die Schnecken. - Caroleinea, **48**: 131-138.
- FRIEBE, B. (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 3. Die Käferfauna. - Caroleinea, **41**: 45-80.
- FRIEBE, B. (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* Dieckmann 1982 in Südwestdeutschland. - Caroleinea, **46**: 148-149.
- FROESE, A. & HAVELKA, P. (1991): Über die Ökologie von Cera-topogoniden (Diptera, Nematocera) auf Ackerflächen. - Caroleinea, **49**: 126-128.
- FRÜND, H. C. (1991): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 14. Die Hundertfüßer (Chilopoda). - Caroleinea, **49**: 83-94.
- HEYNEN, C. (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 11. Die Dipterenlarven. - Caroleinea, **46**: 115-130.
- HÖLZINGER, J. & SCHILHANSL, K. (1972): Untersuchungen zur Brutbiologie an einer südwestdeutschen Population des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 93-101.
- HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Schneckengehäuse für die Überwinterung und das Brutverhalten von *Pellenes nigroclivatus* L. Koch, 1874 in Steppenrasenformationen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 167-175.
- HORNBERGER, F. (1957): Der Weiße Storch in Baden-Württemberg 1956. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 52-58.
- JACOBI, K. & MENNE, B. (1991): Zur Fortpflanzungsbiologie der troglolithen Kreuzdornspanners *Tiphosa dubitata* L. (Lepidoptera, Geometridae). - Caroleinea, **49**: 129-130.
- JURZITZA, G. (1966): Über interspezifische Paarungsversuche bei Odonaten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 71-72.
- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 155-160.
- KALKO, E. (1991): Zum Jagd- und Echoortungsverhalten der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*, Kuhl, 1819) in den Rheinauen bei Karlsruhe. - Caroleinea, **49**: 95-100.
- KLIMETZEK, D. (1977): Die Ameisenfauna des Naturschutzgebietes „Mindelsee“ (Hymenoptera:Formicidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 159-171.
- KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. (1994): Zur Autökologie und Verbreitung des Kreuzenzian-Ameisenbläulings, *Maculinea rebeli* (Hirsche, 1904). - Caroleinea, **52**: 93-109.
- KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 10. Die Hymenopteren. - Caroleinea, **45**: 135-146.
- LINGENHÖLE, A. (1985): Zucht und Flugverhalten von *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera). - Caroleinea, **43**: 124-125.
- MARTINI, R. & RAQUÉ, K. F. (1986): Zwei bedrohte Roßameisen-Arten in Heidelberg. - Caroleinea, **44**: 171-172.
- MARTIUS, C. (1994): Termite nests as structural elements of the Amazon floodplain forest. - Andrias, **13**: 137-150.
- MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. (1994): Terrestrial arthropods colonizing an abandoned termite nest in a floodplain forest of the Amazon River during the flood. - Andrias, **13**: 17-22.
- NÄHRIG, D. (1991): Zur Phänologie und Ökologie der *Enoploghata ovata*-Gruppe (Araneae: Theridiidae). - Caroleinea, **49**: 131-133.
- ROESLER, R. U. (1977): A) Die verschiedenen Erscheinungsformen der Mimikry. Siehe ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977) - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 113-133.
- ROESLER, R. U. (1982): Eine neue Futterpflanze für den Zünsler *Alispa angustella* (Hübner 1796) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae). - Caroleinea, **40**: 106.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras Teil 6: Betrachtungen zum Problemkreis „Mimikry“ am Beispiel südostasiatischer Insekten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 113-151.
- RÖMBKE, J. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 6. Die Regenwürmer. - Caroleinea, **43**: 93-104.
- RÖMBKE, J. (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 12. Die Enchytraeen. - Caroleinea, **47**: 55-92.
- ROSCISZEWSKI, K. & MASCHWITZ, U. (1994): Prey specialisation of army ants of the genus *Aenictus* in Malaysia. - Andrias, **13**: 179-187.
- SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. (1992): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - Caroleinea, **50**: 145-170.
- SCHOURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. (1996): Laufkäferzönosen südwestdeutscher Wälder - Charakterisierung, Beurteilung und Bewertung von Standorten. - Caroleinea, **54**: 91-138.
- SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. (1993): Siebenschläfer in Nistkästen - eine Langzeitstudie zur Habitatwahl. - Caroleinea, **51**: 93-100.
- SCHMIDT, B. (1993): Die Sibirische Winterlibelle (Odonata) im südwestlichen Alpenvorland. - Caroleinea, **51**: 83-92.
- SCHRÖDER, P. (1976): Zur Phänologie von *Hydropsyche instabilis* Curtis (Trichoptera, Köcherfliegen) im Föhrenbach/Schwarzwald, unter besonderer Berücksichtigung der Larvenstadien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 137-148.
- SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. (1994): Prey spectrum of two army ant species in central Amazonia, with special attention on their effect on spider populations. - Andrias, **13**: 189-198.

- STREBEL, O. (1937): Beobachtungen am einheimischen Bücherskorpion *Chelifer cancroides* L. (Pseudoscorpiones). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 2: 143-155.
- STRITT, W. (1951): Die Biologie der Blattwespe *Pamphilus aurantiacus* Gir. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 10: 137-141.
- STRITT, W. (1954): Eine Massenzucht des Birkenblatt-Minierers *Heterarthrus (Phyllotoma) nemoratus* Hall. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 13: 47-50.
- STRITT, W. (1960): Die bisher unbekannte Larve der Blattwespe *Arge melanochroma* Gmel. (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 19: 58-59.
- THOMAS, W. & RESHÖFT, K. (1983): Zur Biologie von *Ocnogyna afghanicola* Ebert 1974 (Lepidoptera, Arctiidae). - Andrias, 3: 71-72.
- VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. (1994): Untersuchungen zur Biologie dreier Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) aus amazonischen Regenwäldern. - Andrias, 13: 161-168.
- VERHAAGH, M. (1988): „Parasitierung“ einer Ameisen-Pflanzen-Symbiose im neotropischen Regenwald? - Caroleina, 46: 150.
- VERHAAGH, M. (1994): *Pachycondyla luteola* (Hymenoptera, Formicidae), an inhabitant of *Cecropia* trees in Peru. - Andrias, 13: 214-224.
- VERHAAGH, M. & ROSCISZEWSKI, K. (1994): Ants (Hymenoptera, Formicidae) of forest and savanna in the Biosphere Reserve Beni, Bolivia. - Andrias, 13: 199-214.
- VOLZ, P. (1983): Zur Populationsökologie der mitteleuropäischen Walddipteren. - Caroleina, 41: 105-126.
- VOLZ, P. (1989): Jahresrhythmen bei Collembolen (Insecta, Apterygota) - Untersuchungen in der Hörlder Rheinaue. - Caroleina, 47: 93-116.
- WESTRICH, P. (1983): Zur Biologie der Keulenwespe *Sapygina decemguttata* (Jurine) (Hymenoptera, Sapygidae). - Caroleina, 41: 134-136.
- WOLF, A. (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - Caroleina, 46: 145-146.
- WUNDERLE, I. (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitate eines Buchenwaldes. - Caroleina, 50: 79-144.
- WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Schelorbitidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - Andrias, 7: 15-60.
- ZAWADZKI, F. & SCHMIDT, K. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchung der Laufkäfer in der Rheinaue Rastatt (Coleoptera: Carabidae). - Caroleina, 52: 83-92.
- ZELL, H. (1993): Die Gattung *Plectus* Bastian, 1865 sensu lato (Nematoda, Plectidae) - Ein Beitrag zur Ökologie, Biogeographie, Phylogenie und Taxonomie der Plectidae. - Andrias, 11: 3-171.
- ZIMMERMANN, P. (1988): Die Schlingnatter (*Coronella austriaca*) im Weinberg „Höllstein“ bei Freudenstein (Enzkreis, Baden-Württemberg). - Caroleina, 46: 65-74.
- ZINK, G. (1963): Der Weißstorch-Bestand in Baden-Württemberg 1960-62. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 22: 89-96.
- BECK, L. & MITTMANN, H.-W. (1982): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 2. Klima, Streuproduktion und Bodenstreu. - Caroleina, 40: 65-90.
- BECK, L. & WOAS, S. (1991): Die Oribatiden-Arten (Acari) eines südwestdeutschen Buchenwaldes I. - Caroleina, 49: 37-82.
- BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. (1990): Zur Taxonomie der Phthiracarus-Arten (Acari, Oribatei) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. - Andrias, 7: 61-90.
- BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - Caroleina, 52: 61-74.
- BRAUN, M. & BECK, L. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 9. Die Pseudoskorpione. - Caroleina, 44: 139-148.
- BRAUN, M. & KISCHNICK, P. (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - Caroleina, 45: 159-160.
- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 4. Die Spinnenfauna. - Caroleina, 42: 75-106.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 5. Die Weberknechte. - Caroleina, 42: 107-114.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 7. Der Waldohrwurm *Cheildurella acanthopygia*. - Caroleina, 43: 105-112.
- FRANKE, U. & GREVEN, H. (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 13. Die Schnecken. - Caroleina, 48: 131-138.
- FRIEBE, B. (1978): Ein weiterer Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* Panzer 1794 (Opiliones) im Nord-schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 37: 109-111.
- FRIEBE, B. (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 3. Die Käferfauna. - Caroleina, 41: 45-80.
- FRIEBE, B. (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* Dieckmann 1982 in Südwestdeutschland. - Caroleina, 46: 148-149.
- FRÜND, H. C. (1991): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 14. Die Hundertfüßer (Chilopoda). - Caroleina, 49: 83-94.
- HEYNEN, C. (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 11. Die Dipterenlarven. - Caroleina, 46: 115-130.
- KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 10. Die Hymenopteren. - Caroleina, 45: 135-146.
- RÖMBKE, J. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 6. Die Regenwürmer. - Caroleina, 43: 93-104.
- RÖMBKE, J. (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 12. Die Enchytraeen. - Caroleina, 47: 55-92.
- SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. (1992): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - Caroleina, 50: 145-170.
- SCHÖNBORN, W. & DUMPERT, K. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 8. Die Mikroflora. - Caroleina, 44: 129-138.
- VOLZ, P. (1983): Zur Populationsökologie der mitteleuropäischen Walddipteren. - Caroleina, 41: 105-126.
- WEIGMANN, G. & WUNDERLE, I. (1990): Zur Taxonomie der europäischen Schelorbitidae (Acari, Oribatei). II. Beschreibung des baumbewohnenden *Schelorbitates ascendens* n. sp. - Andrias, 7: 9-14.
- WUNDERLE, I. (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitate eines Buchenwaldes. - Caroleina, 50: 79-144.
- WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Schelorbitidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - Andrias, 7: 15-60.
- ZELL, H. (1982): Nematoden eines Buchenwaldbodens 1. *Wilsonema tentaculatum* (Fuchs 1930) (Nematoda, Araeolaimida). - Caroleina, 40: 99-100.
- ZELL, H. (1983): Nematoden eines Buchenwaldbodens 2. *Rhabditis silvatica* Volz, 1951 - Caroleina, 41: 127-130.

### **Bodenbiologische Untersuchungen im „Stadt Wald Ettlingen“ (Schlottenbach)**

- BECK, L. (1978): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 1. Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 37: 93-101.
- BECK, L. (1988): Bestandes- und Bodenklima eines Buchenwaldes im nördlichen Schwarzwaldvorland. - Caroleina, 46: 141-144.

- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 3. *Prionchulus muscorum* (Nematoda, Monochida) - *Carolinea*, **42**: 57-74.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 4. Die Neotylenchiden (Nematoda, Neotylenchoidea) - *Carolinea*, **43**: 65-76.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens 5. Die Wilsonematinæ (Nematoda, Araeolaimida) - *Carolinea*, **43**: 77-92.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 6. Die Dorylaimen (Nematoda, Dorylaimida) - *Carolinea*, **44**: 91-118.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens 7. Die Teratocephaliden (Nematoda, Rhabditida) - *Carolinea*, **44**: 119-128.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 8. Die Criconemen (Nematoda, Criconematina) - *Carolinea*, **45**: 107-120.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens 9. Die Cephaloben (Nematoda, Rhabditida) - *Carolinea*, **45**: 121-134.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 10. Die Tylenchen (Nematoda, Tylenchoidea) - *Carolinea*, **46**: 75-98.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens 11. Die Anguiniden (Nematoda, Anguinoidea) - *Carolinea*, **46**: 99-114.
- ZELL, H. (1990): Nematoden eines Buchenwaldbodens 12. Die Aphelenchen (Nematoda, Aphelenchida) - *Carolinea*, **48**: 121-130.
- ZELL, H. (1991): Nematoden eines Buchenwaldbodens 13. Die Gattung *Bunonema* (Nematoda, Bunonematidae) - *Carolinea*, **49**: 27-36.

## Hydrologie

- AUERBACH, M. (1940): Zwanzig Jahre Anstalt für Bodenseeforschung der Stadt Konstanz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **5**: 55-61.
- AUERBACH, M. (1952): Indirekte Temperaturschichtung im Bodensee (Obersee) im Frühjahr 1947 - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **11**: 72-74.
- AUERBACH, M. (1952): Der Wasserabfluß aus der Konstanzer Bucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **11**: 54-58.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **4**: 117-119.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee) 1925-1931. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **4**: 120-162.
- BESCH, W. (1966): Biologischer Zustand und Abwasserbelastung der Fließgewässer Nordbadens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **25**: 141-154.
- KIEFER, F. (1957): Höchst-, Mittel- und Niedrigstwasserstände des Bodensees im Zeitraum 1871-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **16**: 39-43.
- LEHN, H. (1959): Zur Dynamik im Hypolimnion des Überlinger Sees (Bodensee). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **18**: 75-86.
- LEHN, H. (1960): Biologische Voruntersuchung für die Bodenseewasserversorgung in der Versuchsfilterstation Sipplingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 17-55.

- RITZ, M. (1940): Das Rheindelta und der „Rheinbrech“ im Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **5**: 72-75.

## Landeskunde

- MÜLLER, K. (1936): Der badische Wald in der badischen Landschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 211.
- SEIFERT, A. (1936): Die Versteppung Deutschlands. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 197-204.
- WOLF, R. & LINK, F. G. (1989): Der Füllmenbacher Hofberg - Ein Rest historischer Weinberglandschaft im westlichen Stromberg. - *Carolinea*, Beih., **6**: 3-83.

## Vor- und Frühgeschichte

- DAUBER, A., mit Beiträgen von FIETZ, A. & LANG, G. (1955): Römische Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **14**: 43-56.
- FIETZ, A. (1951): Frühmittelalterliches Getreide aus Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **10**: 102-104.
- FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturmes von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **12**: 116-118.
- FIETZ, A. (1954): Römische Getreidereste aus dem nördlichen Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **13**: 99-104.
- FIETZ, A. (1961): Pflanzenreste aus den römischen Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **20**: 23-29.
- GUTMANN, K. (1936): Grabhügelstudien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 263-286.
- JÖRG, E. (1962): Das Einhorn im Volksglauben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **21**: 3-5.
- KUSS, S. E. (1958): Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **17**: 166-173.
- LAIS, R. (1937): Nachneolithische Ablagerungen „auf dem Berg“ bei Munzingen am Tuniberg (Breisgau). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **2**: 174-216.
- MÜNKER, W. (1936): Reklame in der Landschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 214-218.
- UNGERER, E. (1936): Naturwissenschaft als nationale Kultur-tätigkeit. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 3-34.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1974): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras T. 2: Geographie, Entstehungsgeschichte und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **33**: 129-156.

## Natur- und Umweltschutz

- ASAL, K. (1936): Das Reichsnaturschutzgesetz. Vortrag gehalten beim Badischen Naturschutztag am 14. Januar 1936 im Studentenhäus der Technischen Hochschule Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 167-176.
- AUERBACH, M. (1936): Naturschutz in Baden und badische Naturschutzgebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **1**: 177-189.
- BÖTTGER, M. (1983): Die Böschungsgestaltung in Baggerseen der Sand-Kiesvorkommen des mittleren Oberrheingebietes. - *Carolinea*, **41**: 21-32.
- BRAUN, M. (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **43**: 129-132.

- HAVELKA, P. (1995): Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten - eine Aufgabe des Naturschutzes. - *Carolinea*, Beiheft, **9**: 3-64.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1990): Der Kolkrabe im Schwarzwald. - *Carolinea*, **48**: 151-152.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1997): Der Kolkrabe (*Corvus corax* L., 1758) in Nordbaden. - *Carolinea*, **55**: 117-118.
- HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. (1994): Laupheim, die bedeutendste Saatkrahen-Kolonie in Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. (1980): Die Wirkung von Liparol auf die Puppen von *Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer (Insecta, Diptera: Chironomidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 161-164.
- KRÜSS, A. & ROHDE, U. (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten „Sandhausener Dünen“. - *Carolinea*, **48**: 109-120.
- LEININGER, H. (1936): Naturschutz und Schule. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 205-210.
- LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. (1993): 1992: 14 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 129-158.
- MÜLLER, G. (1967): Der Weißstorchbestand in Baden-Württemberg 1963-1965. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 141-148.
- OBBERDORFER, E. (1937): Die Bedeutung des Naturschutzgebietes am Michelsberg (Kaiserberg) bei Untergrombach. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 124-142.
- OBBERDORFER, E. (1949): Die Lage des Naturschutzes nach dem Kriege. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **8** (1943/49): 19-21.
- OBBERDORFER, E. (1951): Die Naturschutzarbeit in Nordbaden 1948/50. Herrn Oberregierungsrat H. Schurhammer zum 70. Geburtstag gewidmet. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 57-61.
- OBBERDORFER, E. (1954): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Nordbaden. Die Naturschutzarbeit 1951/54. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 105-108.
- POTT, R. & HÜPPE, J. (1995): Die Bedeutung der Extensivbewirtschaftung für die Pflege und Erhaltung nordwestdeutscher Hudelandschaften am Beispiel des NSG Borkener Paradies im Emstal bei Meppen (Emsland). - *Carolinea*, **53**: 99-111.
- RIEDER, N. & ROHRER, P. (1982): Über die Möglichkeit der Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **40**: 91-98.
- RIETSCHEL, S. (1985): Arten-, Natur- und Umweltschutz als Problemkreis für das Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **42**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1987): Berühren verboten, vernichten erlaubt. - *Carolinea*, **45**: 5-6.
- SCHMIEDER, (1936): Über die Reklame in Stadt und Dorf. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 212-213.
- SEIFERT, A. (1936): Die Versteppung Deutschlands. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 197-204.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1989): 1987 und 1988: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **47**: 162-190.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1990): 1989: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **48**: 155-176.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1991): 1990: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **49**: 139-168.
- STADLER, H. (1936): Praktischer Naturschutz. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 190-196.
- WOLF, R. (1988): Organisation und Arbeit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL). - *Carolinea*, **46**: 163-160.
- WOLF, R. (1997): 70 Jahre Naturschutz in Baden. Aus der Geschichte der BNL Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 147-152.
- WOLF, R. & LOEHNERT-BALDERMANN, E. (1992): 1991: 12 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **50**: 177-206.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1994): 1993: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1995): 1994: 11 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **53**: 263-288.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1996): 1995: 9 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 197-216.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1997): 1996: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 125-146.
- N. N. (1936): Badischer Naturschutztag am 14. Januar 1936 in Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet*, **6**: 163-166.

## Medizin

- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 155-160.
- SCHINDLER, H. (1988): Zur Geschichte der Anwendung von Flechten (Lichenes) in der Medizin. - *Carolinea*, **46**: 31-42.

## Reiseberichte

- AMSEL, H. G. (1957): Die Deutsche Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 5-29.
- AMSEL, H. G. (1967): Die zweite Deutsche Afghanistan-Expedition 1966 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Ein Reisebericht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 3-14.
- HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Ergebnisse der Bolivien-Expedition des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe: Spinnen (Araneae). - *Andrias*, **13**: 99-112.
- KNIPPER, H. (1963): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafrika der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 73-87.
- KNIPPER, H. (1964): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafrika der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. II. Teil. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 7-30.
- MALSCH, W. (1954): Eine Schwedenreise zur Totalen Sonnenfinsternis am 30. Juni 1954. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 71-79.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras (Ergebnisse einer entomologischen Forschungsreise). Teil 1: Reisebericht und Landschaftsbeschreibung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 97-121.

## 4. Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten nach Regionen

### Südwestdeutschland insgesamt

- AHRENS, M. (1993): *Gymnostomum viridulum* Brid., ein für Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der Bergstraße. - *Carolinea*, **51**: 75-82.
- AHRENS, M. (1995): Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* Culm. am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutschland). - *Carolinea*, **53**: 229-241.
- BESCH, W. (1968): Zur Verbreitung der Arten des Genus *Rivulogammarus* in Fließgewässern Nordbadens und Südwürttembergs. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 27-33.
- BETZ, M. (1965): Der trockene Juli 1964. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 127-136.
- BÖHLING, N. (1996): *Poa alpina* L. in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **54**: 177-180.
- BRAUN, M. (1987): Der Feldhamster in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **45**: 160-161.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1997): Funde der Großen Bartfleddermaus in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **55**: 113-116.
- BRECHTEL, F. & KOSTENBADER, H. (1994): Der Florentiner-Prachtkäfer *Coroebus florentinus* (Herbst, 1801) (Coleoptera, Buprestidae) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 75-81.
- BRÜNNER, H. & BRAUN, M. (1991): Zur Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus*) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 115-120.
- BUCHWALD, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer *Cordulegaster bidentatus* (Odonata) in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **46**: 49-64.
- BÜCKING, W. (1995): Vegetationsstruktur des Bannwaldes „Bildhau“ (Gemeindewald Riederich bei Reutlingen, Südwestdeutschland). - *Carolinea*, **53**: 127-146.
- DEMUTH, S. (1992): Über einige seltenen Orobanchaceen-Arten (Orobanchaceae) in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **50**: 57-66.
- DETZEL, P. (1987): Die Dornschröcke *Trixix ceperoi* neu für Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **45**: 162.
- DOCZKAL, D. & SCHMID-EGGER, C. (1992): Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera, Apoidea). - *Carolinea*, **50**: 173-176.
- DRISSNER, J., HAVELKA, P. & FUNKE, W. (1994): Dipterengesellschaften einer Streuobstwiese. 1. *Ceratopogonidae*. - *Carolinea*, **52**: 111-114.
- FRENZEL, P. (1980): Neue Nachweise von *Scapholeberis aurita* (Fischer, 1849) in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 177-179.
- FREY, W. & PROBST, W. (1974): Morphologische und vegetationsanalytische Untersuchungen an rezenten Kalktuffen im Keupergebiet des südlichen Schönbuchs. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 59-79.
- FRIEDRICH, G. & MEIER-BROOK, C. (1987): Die Makrofauna der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen in Kleingewässern in der Umgebung von Tübingen. - *Carolinea*, **45**: 99-106.
- GLADITSCH, S. (1969): Die Wasserkäfer eines Kleinbiotops, mit einem Neufund für Süddeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 127-129.
- GLADITSCH, S. (1971): Neue Käferfunde für SW-Deutschland. 5. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleoptera. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 73-76.
- GLADITSCH, S. (1972): *Dactylosternum insulare* Cast., ein Erstfund für Deutschland und einige weitere für Baden neue Käferarten. 6. Beitrag z. Faunistik d. südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 153-159.
- GLADITSCH, S. (1976): Weitere Käfererfunde für Südwestdeutschland mit je einem Erstfund für Mitteleuropa und Deutschland. 9. Beitrag z. Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 149-167.
- GLADITSCH, S. (1978): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 149-158.
- GLADITSCH, S. (1983): 12. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *Carolinea*, **41**: 81-86.
- GÖRS, S. (1958): Ein Beitrag zur Kenntnis des *Crepido-Junccetum acutiflori* (Br.-Bl.15) Oberd. 56 auf basenreichen Standorten in Südwest-Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 8-10.
- HAVELKA, P. (1978): Blütenbesuchende *Ceratopogoniden* (Diptera) aus der Umgebung von Tübingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 175-179.
- HAVELKA, P. (1996): Erste Ergebnisse zur Lebensraumnutzung des Wiedehopfes. - *Carolinea*, **54**: 191-194.
- HAVELKA, P., BOMMER, K., BUCHMANN, H. & MITTMANN, H.-W. (1994): Laupheim, eine bedeutende Saatkrähen-Kolonie in Württemberg. - *Carolinea*, **52**: 119-121.
- HAVELKA, P., RUGE, K., MUSCHKETAT, L., GÖRZE, H.-J., SIKORA, L. G. & STÖHR, A. (1996): Der Dreizehenspecht in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **54**: 187-188.
- HECKMANN, R. (1996): Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). - *Carolinea, Beih.*, **10**: 1-146.
- HERMANN, G. & STEINER, R. (1997): Eiablage- und Larvalhabitat des Komma-Dickkopffalters (*Hesperia comma* Linné, 1758) in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Hesperidae). - *Carolinea*, **55**: 35-42.
- HIRLING, W. (1989): Ein räuberischer Nematode, *Parveyellus vorax* n. gen., n. spec. (Nematoda: Mononchida) in Mooren Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **47**: 133-140.
- HÖLZINGER, J. & SCHILHANS, K. (1972): Untersuchungen zur Brutbiologie an einer südwestdeutschen Population des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 93-101.
- HORNBERGER, F. (1957): Der Weiße Storch in Baden-Württemberg 1956. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 52-58.
- HRUBY, J. (1950): Die Brombeeren des Karlsruher Florengiebtes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **9** (2): 15-25.
- HRUBY, J. (1954): Zum Vorkommen der Zwergglockenblume (*Campanula cochlearifolia* Lam.) in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 43.
- JAECKEL, S. G. A. (1958): Molluskenfunde aus einigen Landesteilen Südwestdeutschlands. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 35-45.
- JANS, W. & RÖMBKE, J. (1989): Funde eines terrestrischen Polychaeten (Annelida) in Wäldern Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **47**: 158-162.
- JUSATZ, H. J. & WELLMER, H. (1979): Landschaftsökologische Analyse der in Baden-Württemberg aufgetretenen Zecken-Encephalitis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 155-160.
- KIEFER, F. (1958): Verzeichnis der in Südwestdeutschland gefundenen freilebenden Ruderfußkrebse. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 46-60.

- KLEINSTEUBER, A. & WOLFF, P. (1996): Potamogeton polygonifolius und Potamogeton coloratus in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **54**: 180-182.
- KOCKELKE, K., HERMANN, G., KAULE, G., VERHAAGH, M. & SETTELE, J. (1994): Zur Autökologie und Verbreitung des Kreuzen-zian-Ameisenbläulings, *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904). - *Carolinea*, **52**: 93-109.
- KORMANN, K. (1971): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 147-152.
- KORMANN, K. (1973): Beitrag zur Syrphidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Syrphidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 143-158.
- KORMANN, K. (1983): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae). 2. - *Andrias*, **3**: 25-28.
- KÜBLER-THOMAS, M. (1994): Extensivierung zum Schutz von Ackenwildkräutern. - *Carolinea*, **52**: 35-44.
- KUHN, O. (1937): Bemerkungen zur Entstehung und Gliederung des oberen Keupers in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 156-160.
- LANG, G. (1952): Späteiszeitliche Pflanzenreste in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 89-110.
- LÖFFLER, H. (1961): Grundwasser- und Brunnenostracoden aus Südwestdeutschland und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 31-42.
- MÜLLER, G. (1967): Der Weißstorchbestand in Baden-Württemberg 1963-1965. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 141-148.
- MÜLLER, T. (1961): Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 111-122.
- MÜLLER, T. (1967): Die geographische Gliederung des Galio-Carpinetum und des Stellario-Carpinetum in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 47-65.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1960): Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 60-100.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1990): Zur Wohnkammervollung bei Ceratiten aus dem germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias). - *Carolinea*, **48**: 7-12.
- MUSCHKETAT, L., MUSCHKETAT, R., HAVELKA, P. & RUGE, K. (1996): Aktionsgebietsgrößen des Schwarzspechtes im Winterhalbjahr. - *Carolinea*, **54**: 188-190.
- PHILIPPI, G. (1974): Verbreitung, Ökologie und Soziologie des Laubmooses *Brotherella lorentziana* (Mol.) Loeske in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 41-53.
- PHILIPPI, G. (1996): Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B.S.G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - *Carolinea*, **54**: 45-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinea*, **51**: 51-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1995): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD. in den Vogesen und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinea*, **53**: 21-32.
- RIEDER, N. & ROHRER, P. (1982): Über die Möglichkeit der Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **40**: 91-98.
- RIEGER, C. (1997): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera) II. - *Carolinea*, **55**: 43-48.
- ROESLER, R. U. (1982): Der Zünsler *Vitula biviella* (Zeller 1848) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) neu für die Fauna Baden-Württembergs. - *Carolinea*, **40**: 105-106.
- RÜCKERT, G. (1974): Bryologische Studien an Ziegeldächern. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 55-57.
- SCHOURIG, M., HOHNER, W., WEICK, D., BRECHTEL, F. & BECK, L. (1996): Laufkäferzönosen südwestdeutscher Wälder - Charakterisierung, Beurteilung und Bewertung von Standorten. - *Carolinea*, **54**: 91-138.
- SCHLESINGER, S. (1991): Zweiter Fund von *Orobancha picridis* F. W. Schultz in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 125.
- SCHLUND, W., STAUSS, M. J. & BURKHARDT, J. F. (1993): Siebenschläfer in Nistkästen - eine Langzeitstudie zur Habitatwahl. - *Carolinea*, **51**: 93-100.
- SCHOLZ, H. & BÖHLING, N. (1997): *Poa langiana* Rchb. und *Poa compressa* L. var. *expansa* var. nov. (Graminaeae, Poaceae). - *Carolinea*, **55**: 5-12.
- SCHOPPMANN, A. (1980): Die Bockkäferfauna von Ulm und seiner württembergischen Umgebung (Insecta, Coleoptera: Cerambycidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 143-152.
- SCHRÖDER, P. & STREIT, B. (1979): Zur Verbreitung von *Agriotypus armatus* Curtis (Hymenoptera: Agriotypidae) in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 113-115.
- SCHÜTZ, W. (1991): Der Donau-Altarm bei Laiz. - *Carolinea*, **49**: 9-12.
- SCHWOERBEL, J. (1961): Quell- und grundwasserbewohnende Arrenuriden in der Fauna Südwestdeutschlands (Acari: Arrenuridae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 85-92.
- SEBALD, O. (1975): Zur Kenntnis der Quellfluren und Waldsümpfe des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 295-327.
- STRICKER, P. (1954): Die Ausbreitung des Tintenfischpilzes *Anthurus aseroeformis* Mc.Alpine (Anth.Muellerianus Kalchbr.var.Ed.Fischer). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 93-98.
- STRIIT, W. (1937): Pontische Blattwespen (*Megalodontes* Latr.) an pontischen Pflanzen (Hym., Tenth.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 217-220.
- STRIIT, W. (1941): Die deutschen Arten der Halmwespengattung *Hartigia* Schdt. (Hym., Tenth.). - *Beitr. naturk. Forsch. Oberheingebiet*, **6**: 115-125.
- STRIIT, W. (1951): Die Biologie d er Blattwespe *Pamphilus aurantiacus* Gir. (Hym., Symph.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 137-141.
- STROBEL, K. (1968): Beiträge zur Lepidopterenfauna von Württemberg. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 113-115.
- TRAUB, B. (1979): Eine für Baden-Württemberg neue Pyralide (Lepidoptera, Phycitinae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 131-132.
- TRUNKÓ, L. & EBERT, G. (1976): Spuren von Bohrorganismen in fossilem Treibholz des mitteloligozänen Meeressandes von Steinhardt bei Bad Kreuznach. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 169-179.
- TRUNKÓ, L. & MUNK, W. (1990): Makrofloren aus dem Unterrotliegenden (Unterperm) von Alsenz bei Bad Kreuznach / Rheinland-Pfalz. - *Carolinea*, **48**: 21-30.
- URLICHS, M. (1992): Vermeintlicher Zwergwuchs bei Muscheln aus dem untersten Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk, Mitteltrias) Württembergs. - *Carolinea*, **50**: 9-26.
- URLICHS, M. & MUNDLOS, R. (1987): Zur Entstehung von Ceratiten-Pflastern im Germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias) Südwestdeutschlands. - *Carolinea*, **45**: 12-30.
- VERHAAGH, M. (1994): Neue Fundstellen einiger Ameisen in Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **52**: 115-118.
- VOIGT, K. (1971): Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 153-154.
- VOIGT, K. (1977): Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Baden-Württemberg, mit einem Erstnachweis für Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 153-158.

- VOIGT, K. (1983): Erstnachweis einiger Wanzenarten für Baden-Württemberg (Hemiptera, Heteroptera). - *Carolinea*, **41**: 130-131.
- VOIGT, K. (1997): *Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860), eine für Baden-Württemberg neue Blinderwanze (Heteroptera, Miridae). - *Carolinea*, **55**: 108-110.
- WEBER, H. E. (1989): Zwei neue *Rubus*-Arten aus Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **47**: 47-54.
- WEBER, H. E. (1995): *Rubus oberdorferi* nov. spec., eine neue Brombeerart aus Südwestdeutschland. - *Carolinea*, **53**: 7-11.
- WEBER, J. & ZIMMERMANN, P. (1990): Neufunde der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **48**: 149-150.
- WESTRICH, P. (1982): Zur Verbreitung der Knopfhornblattwespen-Gattung *Corynis* in Baden-Württemberg (Hymenoptera, Cimbicidae). - *Carolinea*, **40**: 102-103.
- WESTRICH, P. (1983): Zur Biologie der Keulenwespe *Sapygina decemguttata* (Jurine) (Hymenoptera, Sapygidae). - *Carolinea*, **41**: 134-136.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1985): Für Baden-Württemberg neue und seltene Bienen und Wespen (Hymenoptera, Aculeata). - *Carolinea*, **42**: 115-120.
- WILMANN, O. (1958): Zur standörtlichen Parallelisierung von Epiphyten- und Waldgesellschaften. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **17**: 11-19.
- WILMANN, O. (1962): Rindenbewohnende Epiphytengemeinschaften in Südwestdeutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **21**: 87-164.
- WINTERHOFF, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der südwestdeutschen Tieflagen. - *Carolinea*, **53**: 251-258.
- WIRTH, V. & VEZDA, A. (1972): Zur Systematik der Lecidea cyathoides-Gruppe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 91-92.
- WOLF, A. (1993): Zur Verbreitung der Heuschrecken in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **51**: 115-118.
- WOLFF, P. & ORSCHIEDT, O. (1993): *Lemna turionifera* Landolt - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. - *Carolinea*, **51**: 9-26.
- WUNDERLE, I., BECK, L. & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Schelorbitidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - *Andrias*, **7**: 15-60.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1991): Neufunde der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* in Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **49**: 137-138.
- ZIMMERMANN, P. & ROHDE, U. (1989): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Ackerwildkrautgesellschaften. - *Carolinea*, **47**: 153-156.
- ZINK, G. (1963): Der Weißstorch-Bestand in Baden-Württemberg 1960-62. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 89-96.
- ARNOLD, A., BRAUN, M., HÄUSSLER, U., HEINZ, B., NAGEL, A. & RIETSCHEL, G. (1997): Rheinbrücke bei Mannheim als Fledermausfalle. - *Carolinea*, **55**: 81-93.
- ARNOLD, A., SCHOLZ, A., STORCH, V. & BRAUN, M. (1996): Zur Rauhhauffledermaus (*Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839) in den nordbadischen Rheinauen. - *Carolinea*, **54**: 149-158.
- BECK, L. (1978): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 1. Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 93-101.
- BECK, L. (1988): Bestandes- und Bodenklima eines Buchenwaldes im nördlichen Schwarzwaldvorland. - *Carolinea*, **46**: 141-144.
- BECK, L. & MITTMANN, H.-W. (1982): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 2. Klima, Streuproduktion und Bodenstreue. - *Carolinea*, **40**: 65-90.
- BECK, L. & WOAS, S. (1991): Die Oribatiden-Arten (Acari) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. I. - *Carolinea*, **49**: 37-82.
- BERG, J., WOAS, S. & BECK, L. (1990): Zur Taxonomie der Phthiracarus-Arten (Acari, Oribatei) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. - *Andrias*, **7**: 61-90.
- BESSLER, J. (1936): Doggerfossilien aus dem oligozänen Konglomerat der Tongruhe von Rot-Malsch. Vorläufige Mitteilung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 43-48.
- BÖTTGER, M. (1983): Die Böschungsgestaltung in Baggerseen der Sand-Kiesvorkommen des mittleren Oberrheingebietes. - *Carolinea*, **41**: 21-32.
- BRAND, C., HÖFER, H. & BECK, L. (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - *Carolinea*, **52**: 61-74.
- BRAUN, M. (1996): Die Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus* Linné, 1758) in Nordbaden. - *Carolinea*, **54**: 167-173.
- BRAUN, M. & BECK, L. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 9. Die Pseudoskorpione. - *Carolinea*, **44**: 139-148.
- BRAUN, M. & KISCHNICK, P. (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - *Carolinea*, **45**: 159-160.
- BREUNIG, T. & HAISCH, B. (1988): Neufunde des Quirl-Tännels (*Elatine alsinastrum* L.) in der Offenburger Rheinebene. - *Carolinea*, **46**: 137.
- BREUNIG, T. & PHILIPPI, G. (1988): Der Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) in der mittelbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **46**: 131-134.
- BREUNIG, T. & SCHACH, J. (1989): Ein Fund des Scheiden-Gelbsterns (*Gagea spathaceae*) in der nordbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **47**: 151-152.
- BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. (1979): Ausgewählte Kapitel zur Oberrheingraben-Tektogenese. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 17-51.
- BUTTNER, K. P. & STIEGLITZ, W. (1976): Floristische Untersuchungen im Meßbischblatt 6417 (Mannheim-Nordost). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 9-51.
- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- CASPERS, N. (1980): Die Makrobenothos-Gesellschaften des Hochrheins bei Bad Säckingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **39**: 115-142.
- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 4. Die Spinnenfauna. - *Carolinea*, **42**: 75-106.
- ECKERT, H. (1951): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. Vorläufige Mitteilung. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **10**: 44-45.
- ECKERT, H. (1955): Die Fauna des oberen Muschelkalkes (Trochitenkalkes) von Wiesloch. 1. Pleurotomariidae und Neritopsidae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 101-113.

## Oberrrheingebiet

- ABRAHAM, R. (1972): Die Wirkung verschiedener Kulturmaßnahmen auf den Fang flugaktiver Insekten im Botanischen Garten der Universität Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **31**: 145-149.
- ABRAHAM, R. & ABRAHAM, R. (1971): Beobachtungen an gallbildenden Wanzen *Copium cornutum* Thunb. und *Copium teucii* (Host) (Hem., Tingidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 49-56.
- ABRAHAM, R. & SCHMIDT, K. (1977): Ein Beitrag zur Faunistik und Phänologie einiger Chalcididae (Chalcidoidea, Hymenoptera) aus der Umgebung von Karlsruhe. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 177-183.

- EIDEL, K. (1937): Beiträge zur Insektenfauna des Rheins. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 2: 40-48.
- FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturmes von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 12: 116-118.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 5. Die Weberknechte. - Caroleina, 42: 107-114.
- FRANKE, U. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 7. Der Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia*. - Caroleina, 43: 105-112.
- FRANKE, U. & GREVEN, H. (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 13. Die Schnecken. - Caroleina, 48: 131-138.
- FRENTZEN, K. (1964): Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebiets. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 23: 31-51.
- FRENZEL, P. (1976): Beitrag zur Kenntnis der Fimbrriatus-Gruppe des Genus *Paracyclops*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 35: 119-124.
- FRENZEL, P. (1977): Zur Populationsdynamik und Morphologie pelagischer Cladocera in einem Baggersee der nördlichen Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 36: 91-108.
- FRIEBE, B. (1978): Ein weiterer Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* Panzer 1794 (Opiliones) im Nord-schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 37: 109-111.
- FRIEBE, B. (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 3. Die Käferfauna. - Caroleina, 41: 45-80.
- FRIEBE, B. (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* Dieckmann 1982 in Südwestdeutschland. - Caroleina, 46: 148-149.
- FRITZ, A. (1954): Neue Schmetterlinge vom Kaiserstuhl. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 13: 84-85.
- FRITZ, H.-G. (1983): Wenig bekannte und neue Diptera/Nematocera (Insecta) aus der nördlichen Oberrheinaue. - Andrias, 3: 9-24.
- FRÜND, H. C. (1991): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens 14. Die Hundertfüßer (Chilopoda). - Caroleina, 49: 83-94.
- GALL, H. J. (1969): Zum Vorkommen von *Carex arenaria* auf den Silbergrasfluren bei Speyer. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 11: 111-114.
- GEHLKER, H. (1974): Ökologie und Parasitismus am Beispiel der Spargel-Wurzelfäule im Rheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 33: 113-127.
- GREMMINGER, A. (1952): Nachtrag zum Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf (Oberrheinische Tiefebene). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 11: 116-121.
- GRIESE, J. & KLEINSTEUBER, A. (1996): Ein Fund von *Linaria lupina* im badischen Oberrheingebiet. - Caroleina, 54: 183-185.
- GROSSMANN, A. L. (1977): Der Lorbeerseidelbast - *Daphne laureola* L. - noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 36: 61-65.
- HAUER, J. (1936): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 1: 129-152.
- HAUER, J. (1937): Zur Kenntnis der Rotatorienfauna des Eicher Sees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 2: 165-173.
- HAUER, J. (1950): Der nordamerikanische Strudelwurm *Euplarnia tigrina* (Girard) am Oberrhein. Mit Hinweis auf einige andere aquatile Einwanderer im Stromgebiet des Rheines. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 9 (1): 70-75.
- HAVELKA, P. (1980): *Meloë violaceus* Marsh, 1802 (Coleoptera, Meloidae) und seine cantariphen Begleiter an einem Standort nördlich Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 153-159.
- HAVELKA, P. & RIEDER, N. (1979): Zwei seltene Chironomiden im Oberrheingebiet und ihre rasterelektronenmikroskopische Charakterisierung (*Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 38: 125-129.
- HAVELKA, P., OTT, H. A. & RIEDER, N. (1980): Die Wirkung von Liparol auf die Puppen von *Xenopelopia nigricans* Fittkau und *X. falcigera* Kiefer (Insecta, Diptera, Chironomidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 161-164.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1996): Das Schloß in Heidelberg (Baden-Württemberg) als Fledermaus-Quartier. - Caroleina, 54: 159-166.
- HEINZ, B. & BRAUN, M. (1997): Untersuchungen zur Fledermausfauna im Schloßgarten Schwetzingen. - Caroleina, 55: 49-56.
- HERRMANN, R. (1983): Die Arten der Gattungen *Dahlica* Enderlein und *Sideria* Meier in Südbaden (Lepidoptera, Psychidae). - Caroleina, 41: 87-96.
- HEYMER, A. (1968): Über ein Vorkommen von *Platycnemis latipes* Rambur, 1842 im Ober-Elsaß (Odonata: Zygoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 27: 35-36.
- HEYNEN, C. (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 11. Die Dipterenlarven. - Caroleina, 46: 115-130.
- HIRSCH, L. G. (1949): Eiszeitliche Frostböden in der Oberrheinebene bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 8 (1943/49): 61-73.
- HIRSCH, L. G. (1950): Echte und falsche Dauerfrostböden auf der Oberrheinischen Niederterrasse zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 9 (2): 3-14.
- HIRSCH, L. G. (1952): Der Albschuttkegel bei Ettlingen und seine Stellung im oberrheinischen Diluvium. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 11: 1-11.
- HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Schneckengehäuse für die Überwinterung und das Brutverhalten von *Pellenes nigrocellatus* L. Koch, 1874 in Steppenrasenformationen (Araneae, Salticidae). Heidelberg Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Gebietes. Nr. 2. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 39: 167-175.
- HÜBL, H. H. (1942): Der gebleichte Mittlere Buntsandstein (Rehbergsschichten „b<sup>2m</sup>“) von Bergzabern-Westmark. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, 7: 301-358.
- HUNDT, R. (1960): Das Vorkommen gotlandischer graptolithenführender Gerölle im Rheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 19: 132-137.
- JAUCH, F. (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 3: 76-147.
- JÖRG, E. (1962): Das Einhorn im Volksglauben. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 21: 3-5.
- JÖRG, E. (1969): Eine Fischfauna aus dem Oberen Buntsandstein (Unter-Trias) von Karlsruhe-Durlach (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 28: 87-102.
- JÖRGER, V. (1987): *Saprosecans lateroplumosa* n. sp. (Gamaisina, Halalaelapidae), eine neue Raubmilbenart. - Caroleina, 45: 163-166.
- JURZITZA, G. (1963): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 3. Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 22: 107-111.
- JURZITZA, G. (1964): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe. IV. Mitteilung: *Ceriatrigon tenellum* (de Villers) in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 23: 71-72.
- JURZITZA, G. (1965): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 24: 37-39.
- JURZITZA, G. (1970): Beobachtungen zur Ökologie und Ethologie von *Ischnura pumilio* (Charp.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., 29: 151-153.



- JURZITZA, G. & KORMANN, K. (1960): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe (Baden) 2. Mitteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 56-57.
- KALKO, E. (1991): Zum Jagd- und Echoortungsverhalten der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*, Kuhl, 1819) in den Rheinauen bei Karlsruhe. - *Carolinea*, **49**: 95-100.
- KÄMMER, F. & DIENST, M. (1982): Zum Vorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in der trockenengefallenen südlichen Oberrheinaue. - *Carolinea*, **40**: 49-64.
- KIEFER, F. (1936): Über die Krebstiere, insbesondere die Ruderfußkrebse des Eichener Sees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 157-162.
- KIEFER, F. (1953): Ruderfußkrebse aus dem Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“ - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 4-11.
- KIEFER, F. (1956): Ein neuer Fund von *Lartetia rhenana* R. Lais. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 125.
- KIEFER, F. (1957): Die Grundwasserfauna des Oberrheingebietes mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 65-91.
- KINZELBACH, R. (1965): Ein Strandfloh, *Orchestia cavimana* Heller, am Oberrhein. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 153-157.
- KLEINSTEUBER, A. (1995): Ein Fund von *Crassula tillaea* in der nordbadischen Rheinebene. - *Carolinea*, **53**: 259-261.
- KLESS, J. (1969): *Hygrotus quinqueineatus* Zett.: ein für Mitteleuropa neuer Dytiscide. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 123-125.
- KLIESCH, C., ARNOLD, A. & BRAUN, M. (1997): Fledermausquartier in einer Stollenanlage bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). - *Carolinea*, **55**: 57-64.
- KOENIGSWALD, W. v. (1985): Der dritte Lemurenrest aus dem mitteleozänen Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **42**: 145-148.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Apatemyiden-Skelette aus dem Mitteleozän von Messel und ihre paläobiologische Aussage. - *Carolinea*, **45**: 31-35.
- KOENIGSWALD, W. v. (1987): Ein zweites Skelett von *Buxolestes* (Pantolestidae, Protheriidae, Mammalia) aus dem Mitteleozän von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **45**: 36-42.
- KÖGEL, F. (1983): Neue und seltene Wasserwanzen (Heteroptera: Amphibiocorisae und Hydrocorisae) aus dem nördlichen Oberrheintiefland. - *Carolinea*, **41**: 101-104.
- KORMANN, K. (1966): Beitrag zur Odonatenfauna der Umgebung von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 133-139.
- KORNECK, D. (1960): Beobachtungen an Zwergbinsengesellschaften im Jahre 1959. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 101-110.
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. I. Das *Molinietum medioeuropaeum*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 55-77.
- KORNECK, D. (1962): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Die *Molinietum* feuchter Standorte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 165-190.
- KORNECK, D. (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. III. Kontaktgesellschaften A. Binsenwiesen, Verband: *Calthion* Tx. 1936 1. *Juncus acutiflorus*-Naßwiese. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 19-44.
- KORNECK, D. & FINK, H. G. (1979): Der Schweizer Alant (*Inula helvetica* Weber) noch immer in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 53-59.
- KRAMER, F. (1942): Die Verbreitung von *Linum perenne* L. in der Rheinebene; ein badischer Standort auf Flugsand. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 110-122.
- KRAUSE, W. (1975): Siedlungen gefährdeter Pflanzen in Baggerseen der Oberrheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 187-199.
- KRAUSE, W. (1985): Über die Standortansprüche und das Ausbreitungsverhalten der Stern-Armleuchteralge *Nitellopsis obtusa* (Desvaux) J. Groves. - *Carolinea*, **42**: 31-42.
- KRIEGER-WOLFF, E. & WÜLKER, W. (1971): Chironomiden (Diptera) aus der Umgebung von Freiburg i. Br. (mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Chironomus*). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 133-145.
- KRISTAN-WOLLMAN, E. (1965): Revision der Arbeit von K. Frenzen: Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 17-20.
- KRÜSS, A. & RÖHDE, U. (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten „Sandhausener Dünen“. - *Carolinea*, **48**: 109-120.
- KUNZ, H. (1956): *Ranunculus polyanthemophyllus* Koch et Heß, *Neslia apiculata* Fischer et Meyer und *Callitriche obtusangula* Le Gall in Südbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 52-55.
- KUSS, S. E. (1955): Die stratigraphische Verteilung der altpleistocänen Fauna aus dem Tonlager von Jockgrim in der Pfalz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 93-100.
- KUSSMAUL, K. & SCHMIDT, K. (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 10. Die Hymenopteren. - *Carolinea*, **45**: 135-146.
- LAIS, R. (1937): Nachneolithische Ablagerungen „auf dem Berg“ bei Munzingen am Tuniberg (Breisgau). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 174-216.
- LAYER, H.-G. (1962): Der Albtalwind. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 19-31.
- LEININGER, H. (1951): Über Bienen, Grab-, Weg-, Faltenwespen und Ameisen aus dem Badischen Oberrheingebiet (Hym. aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 113-136.
- LEOPOLD, M., MUNK, W. & TRUNKO, L. (1990): Erster Nachweis von Landsäugetierresten im marinen Mittel-Oligozän des Mittleren Oberrheingrabens bei Eschbach, Pfalz, BRD. - *Carolinea*, **48**: 13-20.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 70-77.
- LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1959): Physiologie und Ökologie der Felsflurvegetation auf dem Isteiner Klotz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 144-174.
- LODEMANN, W. (1960): Die „Entfärbungsbänderung“ im Trochitenkalk (mo.) von Nordbaden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 10-16.
- LUDWIG, H.W., BECKER, N. & RAMBOW, C. (1979): Die Süßwassermeduse *Craspedacusta sowerbii* (Hydrozoa: Limnomedusae) im Rhein-Neckar-Gebiet. Heidelberger Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Rhein-Neckar-Gebietes. Nr. 1. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 141-153.
- MALSCH, W. (1953): Die Bodenwindverhältnisse in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 120-127.
- MARTIN, O. & MUNK, W. (1992): Erster Nachweis eines Planorbiden (Mollusca, Gastropoda) aus dem Ölschiefer von Messel bei Darmstadt. - *Carolinea*, **50**: 171-172.
- MARTINI, R. & RAQUÉ, K. F. (1986): Zwei bedrohte Roßameisen-Arten in Heidelberg. - *Carolinea*, **44**: 171-172.
- MATTHES, W. & SCHMIDT, K. (1990): Zwei für die Fauna der Bundesrepublik Deutschland neue „Riesenschlupfwespen“ (*Megarhyssa gigas* und *M. perlata*, Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Carolinea*, **48**: 139-144.

- MAYER, G. (1952): Bisher bekannte und neue Vorkommen der Trias-Lebensspur *Rhizocorallium jenense* Zenker. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 111-115.
- MAYER, G. (1954): Ein bemerkenswerter Flugsandaufschluß bei Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 44-46.
- MAYER, G. (1962): Ölschieferbergbau bei Ubstadt im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 191-203.
- MAYER, G. (1964): Notizen über Pleistozänaufschlüsse im Stadtgebiet von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 137-139.
- MAYER, G. (1966): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. I. Eine paläontologische Ausgrabung bei Oos 1837/38. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 75-91.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. III. Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* von Daxlanden und seine Geschichte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 157-163.
- MICKLICH, N. (1985): Biologisch paläontologische Untersuchungen zur Fischfauna der Messeler Ölschiefer (Mittel-Eozän, Lutetium). - Andrias, **4**: 3-171.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1951): Über seltene und ausgestorbene Salzpflanzen der Wetterau. Ein Beitrag zur Geschichte der rhein-mainischen Halophyten-Flora. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 35-43.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1985): Pollenanalytische Untersuchungen des altpleistozänen Tonlagers von Jockgrim (Rheinpfalz). - Caroleina, **42**: 9-29.
- MÜNCH, W. D. (1983): 100 Jahre Kiesabbau in der nordbadischen Rheinebene (Regierungsbezirk Karlsruhe). - Caroleina, **41**: 9-20.
- MURAWSKI, H. (1957): Periglaziale Klimazeugen des Pleistozäns im Raum von Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 59-64.
- NOWOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 46-56.
- OBBERDORFER, E. (1936): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Pflanzenformen des Oberrheingebietes. Zur Frage natürlicher Buchenwaldgesellschaften in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 49-88.
- OBBERDORFER, E. (1952): Die Wiesen des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 75-88.
- OBBERDORFER, E. (1954): Kurze Bemerkung zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 109-110.
- OBBERDORFER, E. (1957): Das Papaverkraut *argemone*, eine für Süddeutschland neue Getreideunkrautgesellschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 47-51.
- OESAU, A. (1995): Zum Auftreten des Erdmandelgrases *Cyperus esculentus* L. bei Offenburg (Baden-Württemberg). - Caroleina, **53**: 17-20.
- OESAU, A. & FROEBE, H. A. (1972): Pflanzensoziologische Beobachtungen an hochwasserbeeinflussten Kulturfleichen im nördlichen Oberrheintal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 65-86.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 91-124.
- PHILIPPI, G. (1960): Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 138-187.
- PHILIPPI, G. (1968): Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydrophiler Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 61-81.
- PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triquetus*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 9-18.
- PHILIPPI, G. (1971): Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 9-47.
- PHILIPPI, G. (1971): Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flugsandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 113-131.
- PHILIPPI, G. (1972): Die Moosvegetation der Wälder in der Rheinaue zwischen Basel und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 5-64.
- PHILIPPI, G. (1973): Zur Kenntnis einiger Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 53-95.
- PHILIPPI, G. (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 71-114.
- PHILIPPI, G. (1985): *Potamogeton x zizii* Koch ex Roth, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. - Caroleina, **42**: 139-142.
- PHILIPPI, G. (1988): Zum Vorkommen des Ufer-Reitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* [Hall. f.] Koel.) im mittleren Oberrheingebiet. - Caroleina, **46**: 138-139.
- PHILIPPI, G. (1995): Hainbuchen-Wälder feuchter Standorte im mittleren Oberrheingebiet. - Caroleina, **53**: 165-174.
- RIEDER, N., GRÖSSEL, L., HAVELKA, P. & OTT, H. (1979): Über das Auftreten einiger seltener Blattfußkrebse im Raum Karlsruhe (*Triops cancriformis* Bosc, *Limnadia lenticularis* (Linnaeus), *Siphonophanes grubei* Dybowski). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 135-139.
- RIEPEL, O. (1980): Ein Lacertilier aus dem Eozän von Messel bei Darmstadt. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 57-69.
- RIETSCHEL, S. (1983): *Aleurochiton petri* n.sp., eine Mottenschildlaus (Homoptera, Aleyrodina) aus dem Pliozän von Neu-Isenburg, Hessen. - Caroleina, **41**: 97-100.
- RÖBEN, P. (1970): Zur Crustaceafauna (freielebende Cyclopoida, Calanoida und Cladocera) der Heidelberger Umgebungen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 115-146.
- ROESLER, R. U. (1982): Eine neue Futterpflanze für den Zünsler *Alispa angustella* (Hübner 1796) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae). - Caroleina, **40**: 106.
- RÖMBKE, J. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 6. Die Regenwürmer. - Caroleina, **43**: 93-104.
- RÖMBKE, J. (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 12. Die Enchytraeen. - Caroleina, **47**: 55-92.
- SCHALLNASS, H.-J., RÖMBKE, J. & BECK, L. (1992): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - Caroleina, **50**: 145-170.
- SCHÖN, M., HABECK, F., OSTERMANN, R. & REIF, A. (1995): Die Schwarze Johannisbeere (*Ribes nigrum* L.) im Bereich des Rheingrabens: Standorte, Vergesellschaftung und Ökologie. - Caroleina, **53**: 147-163.
- SCHÖNBORN, W. & DUMPERT, K. (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 8. Die Mikroflora. - Caroleina, **44**: 129-138.
- SCHUMACHER, H. (1968): Die Schwebefliegenfauna im Raum Heidelberg (Ein Beitrag zur Fauna des Landes Baden-Württemberg). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 101-108.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. Nr. 2. Goldwaschen im Jahre 1911 in Philippsburg und Untersuchung des gewonnenen Materials. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 100-113.

- SCHWÖBEL, H. & STANGL, J. (1982): Zwei neue Rißpilz-Arten, gefunden im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinea*, **40**: 9-14.
- SONNENBURG, H. (1996): Die Ameisenfauna (Hymenoptera, Formicidae) von Streuobstwiesen bei Rastatt (Baden). - *Carolinea*, **54**: 139-148.
- STAIB, W. (1974): Bemerkenswerte Schmetterlinge vom Kaiserstuhl und der näheren Umgebung, mit einer für Deutschland neuen Art. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 177-178.
- STORCH, G. (1993): Amphiptherium goethei, ein weiteres Beuteltier aus dem Eozän von Messel (Mammalia, Didelphidae). - *Carolinea*, **51**: 123-124.
- STORCH, V. & BURKHARDT, P. (1986): Die Reaktion der Mitteldarmdrüse des Süßwasserstrandfloh *Orchestia cavimana* auf verschiedene Nahrung. - *Carolinea*, **44**: 149-152.
- STRICKER, P. (1942): *Anthurus aseroeformis* (McAlpine). Ein für Deutschland neuer australischer Pilz im Oberrheingebiet. - *Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet*, **7**: 287-300.
- STRIIT, W. (1960): Die bisher unbekannte Larve der Blattwespe *Arge melanochroma* Gmel. (Hym., Symph.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 58-59.
- STRIIT, W. (1961): Die Goldwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Chrysididae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 43-48.
- STRIIT, W. (1963): Die Wegwespen des badischen Oberrheingebietes (Hym., Pompilidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 97-106.
- STRIIT, W. (1969): Seltener Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe (Hymenoptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 131.
- STRIIT, W. (1971): Zwei für Deutschland neue Grabwespen - *Alysson tricolor* Lepeletier und *Solierella c. compedita* Piccioli (Hym., Sphec.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 155-156.
- TRUNKÓ, L. (1969): Das holozäne Kalktuff-Vorkommen von Werrabronn bei Weingarten (Nordbaden). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 103-105.
- TRUNKÓ, L. & MAYER, G. (1996): Aufschluß in einer tektonisch eingeklemmten Scholle mit Mittlerem Muschelkalk in Weingarten/Kr. Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 175-176.
- VOGEL, P. (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 37-44.
- VOIGT, K. & RIETSCHEL, S. (1993): Zur Wanzenfauna der Sandäcker bei Wiesental/Baden. - *Carolinea*, **51**: 112-114.
- VOLZ, P. (1983): Zur Populationsökologie der mitteleuropäischen Walddipteren. - *Carolinea*, **41**: 105-126.
- VOLZ, P. (1989): Jahresrhythmen bei Collembolen (Insecta, Apterygota) - Untersuchungen in der Hörlder Rheinaue. - *Carolinea*, **47**: 93-116.
- WEHRLE, E. (1939): Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingartener Moor bei Karlsruhe a. Rh. Ökologische und floristische Studien an einem eutrophen Flachmoor. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 3-84.
- WEIGMANN, G. & WUNDERLE, I. (1990): Zur Taxonomie der europäischen Schelorbitidae (Acari, Oribatei). II. Beschreibung des baumbewohnenden *Schelorbitates ascendens* n. sp. - *Andrias*, **7**: 9-14.
- WESTRICH, P. & SCHMIDT, K. (1982): *Crossocerus acanthophorus* (Kohl 1892) neu für Deutschland (Hymenoptera, Sphecidae). - *Carolinea*, **40**: 104-105.
- WILMANN, O. (1975): Wandlungen des Geranio-Allietum in den Kaiserstühler Weinbergen? - Pflanzensozioökologische Tabellen als Dokumente. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 429-443.
- WILMANN, O. (1988): Können Trockenrasen derzeit trotz Imisationen überleben? - Eine kritische Analyse des Xerobrometum im Kaiserstuhl. - *Carolinea*, **46**: 5-16.
- WILMANN, O. (1995): Ein Vergleich der Texturen von Weinbergsgesellschaften im Elsaß und in Südfrankreich. - *Carolinea*, **53**: 55-66.
- WINTERHOFF, W. (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 445-462.
- WINTERHOFF, W. (1983): Die Großpilze des Wingertsbuckels bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - *Carolinea*, **41**: 33-44.
- WINTERHOFF, W. & BON, M. (1994): Zum Vorkommen seltener Schirmlinge (*Lepiota* s.l.) im nördlichen Oberrheingebiet. - *Carolinea*, **52**: 5-10.
- WINTERHOFF, W., FABER, U. & HENGE, E. (1985): Der Schwarzpurpurne Lauch (*Allium atropurpureum* Waldst. & Kit.), ein für die Bundesrepublik Deutschland neuer Neophyt. - *Carolinea*, **43**: 122-123.
- WITSCHEL, M. (1993): Zur Synsystematik der *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen im südlichen Oberrheinraum. - *Carolinea*, **51**: 27-40.
- WITTENBERGER, G. (1969): Die Steinklee-Goldruten-Gesellschaft bei Offenbach am Main. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 107-110.
- WOLF, A. (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - *Carolinea*, **46**: 145-146.
- WOLFF, P. & ORSCHIEDT, O. (1993): *Lemna turionifera* Landolt - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. - *Carolinea*, **51**: 9-26.
- WUNDERLE, I. (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitate eines Buchenwaldes. - *Carolinea*, **50**: 79-144.
- ZAWADZKI, F. & SCHMIDT, K. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchung der Laufkäfer in der Rheinaue Rastatt (Coleoptera: Carabidae). - *Carolinea*, **52**: 83-92.
- ZELL, H. (1982): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 1. *Wilsonema tentaculatum* (Fuchs 1930) (Nematoda, Araeolaimida). - *Carolinea*, **40**: 99-100.
- ZELL, H. (1983): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 2. *Rhabditis silvatica* Volz 1951 (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **41**: 127-130.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 5. Die *Wilsonematininae* (Nematoda, Araeolaimida). - *Carolinea*, **43**: 77-92.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 3. *Prionchulus muscorum* (Nematoda, Monochida). - *Carolinea*, **42**: 57-74.
- ZELL, H. (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 4. Die *Neotylenchiden* (Nematoda, Neotylenchoidea). - *Carolinea*, **43**: 65-76.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 6. Die *Dorylaimen* (Nematoda, Dorylaimida). - *Carolinea*, **44**: 91-118.
- ZELL, H. (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 7. Die *Teratocephaliden* (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **44**: 119-128.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 9. Die *Cephaloben* (Nematoda, Rhabditida). - *Carolinea*, **45**: 121-134.
- ZELL, H. (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 8. Die *Criconemen* (Nematoda, Criconematina). - *Carolinea*, **45**: 107-120.
- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 10. Die *Tylenchen* (Nematoda, Tylechoidea). - *Carolinea*, **46**: 75-98.

- ZELL, H. (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 11. Die Anguiniden (Nematoda, Anguinoidea). - *Carolinea*, **46**: 99-114.
- ZELL, H. (1990): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 12. Die Aphelenchen (Nematoda, Aphelenchida). - *Carolinea*, **48**: 121-130.
- ZELL, H. (1991): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 13. Die Gattung *Bunonema* (Nematoda, Bunonematidae). - *Carolinea*, **49**: 27-36.
- ZIMMERLE, W. (1961): Zur Petrographie zweier Bohrkerne aus dem Grundgebirge des Rheingrabens. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 77-83.
- Bodenseegebiet mit Alpenvorland und Hegau**
- AMSEL, H. G. (1961): Über einige bemerkenswerte Kleinschmetterlinge des Naturschutzgebietes von Unteruhldingen am Bodensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 93-98.
- AUERBACH, M. (1940): Zwanzig Jahre Anstalt für Bodenseeforschung der Stadt Konstanz. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **5**: 55-61.
- AUERBACH, M. (1952): Indirekte Temperaturschichtung im Bodensee (Obersee) im Frühjahr 1947. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 72-74.
- AUERBACH, M. (1952): Der Wasserabfluß aus der Konstanzer Bucht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **11**: 54-58.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 117-119.
- AUERBACH, M. & SCHMALZ, J. (1939): 1. Studien über die Hydrographie und Biologie des freien Wassers im Gnadensee (Untersee) 1925-1931. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 120-162.
- BEAUMONT, G. DE (1986): Les Carnivores (Mammifères) du Néogène de Höwenegg/Hegau, Baden-Württemberg. - *Carolinea*, **44**: 35-45.
- BERNOR, R. L., TOBIEN, H., HAYEK, L.-A. C. & MITTMANN, H.-W. (1997): *Hippotherium primigenium* (Equidae, Mammalia) from the late Miocene of Höwenegg (Hegau, Germany). - *Andrias*, **10**: 1-230.
- EINSLE, U. (1959): Zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna des Bodensees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 59-61.
- EINSLE, U. (1959): Über *Dunhevedia crassa* King (Crustacea, Cladocera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 62-64.
- EINSLE, U. (1964): Das Crustaceenplankton des Mindelsees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **23**: 53-70.
- EINSLE, U. (1969): Populationsdynamische und synökologische Studien am Crustaceen-Plankton zweier Kleinseen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 53-73.
- FELSCH, K. (1936): Beobachtungen im Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried“. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 219-227.
- GÖTTLICH, K. (1955): Über die Moortypen in Oberschwaben. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 83-87.
- GÖTTLICH, K. (1955): Ein Pollendiagramm ungestörter späteiszeitlicher Verlandungsschichten im Federseebecken. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 88-92.
- GRETLER, T. & OSTENDORF, W. (1997): Die Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate am Bodensee. - *Carolinea*, **55**: 23-34.
- HORION, A. (1954): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 1. Abteilung: Carabidae bis Histeridae. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 51-61.
- HORION, A. (1955): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 2. Abteilung: Clavicornia bis Rhynchophora. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 57-69.
- HÜNERMANN, K. A. (1989): Die Nashornskellette (*Aceratherium incisivum* Kaup 1832) aus dem Jungtertiär vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 5-116.
- JÖRG, E. (1957): Ein Erstfund von *Asteriacites* Schlotheim (*Cubichnia*, Asterozoa) aus der burdigalen Meeresmolasse des Bodenseegebietes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 34-36.
- JÖRG, E. (1965): *Ophisaurus acuminatus* nov.spec. (Anguidae, Rept.) von der pontischen Wirbeltier-Fundstätte Höwenegg/Hegau. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **24**: 23-30.
- JÖRG, E. & ROTHAUSEN, K. (1991): Zur Schichtenfolge und Biostratonomie der Wirbeltierfundstätte Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän). - *Andrias*, **8**: 13-64.
- JÖRG, E., REST, H. & TOBIEN, H. (1955): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1950-54. Ein technischer Bericht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 3-21.
- KIEFER, F. (1954): Zur Kenntnis der freilebenden Ruderfußkrebse des Bodensees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 86-92.
- KIEFER, F. (1957): Höchst-, Mittel- und Niedrigwasserstände des Bodensees im Zeitraum 1871-1955. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 39-43.
- KIEFER, F. (1959): Unterirdisch lebende Ruderfußkrebse vom Hochrhein und Bodensee. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 42-52.
- KIEFER, F. (1976): Revision der *robustus-vernalis*-Gruppe der Gattung *Acanthocyclops* Kiefer (Crustacea, Copepoda) (Mit eingehender Beurteilung des „*Cyclops americanus* Marsh 1892“). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 95-110.
- KIEFER, F. & MUCKLE, R. (1959): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1957. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 5-41.
- KLEINSTEUBER, A. & WOLF, T. (1993): *Utricularia stygia* und *Hammarbya paludosa* am Blauensee bei Vogt/Kreis Ravensburg. - *Carolinea*, **51**: 107-108.
- KLIMETZEK, D. (1977): Die Ameisenfauna des Naturschutzgebietes „Mindelsee“ (Hymenoptera: Formicidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 159-171.
- KRAUSE, W. & GRÜTTNER, A. (1990): Über einen Fund der *Chara tenuispina* im Bodenseegebiet mit Blick auf die Gesamtverbreitung der Pflanze. - *Carolinea*, **48**: 31-36.
- KÜBLER-THOMAS, M. & THOMAS, P. (1989): Über ein Vorkommen von *Teucrium scordium* und *Ophioglossum vulgatum* am östlichen Hochrhein. - *Carolinea*, **47**: 147-148.
- LEHN, H. (1959): Zur Dynamik im Hypolimnion des Überlinger Sees (Bodensee). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **18**: 75-86.
- LEHN, H. (1960): Biologische Voruntersuchung für die Bodenseewasserversorgung in der Versuchsfilterstation Sipplingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **19**: 17-55.
- LEHN, H. (1968): Litorale Aufwuchsalgen im Pelagial des Bodensees. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **27**: 97-100.
- MALZACHER, P. (1973): Eintagsfliegen des Bodenseegebietes (Insecta, Ephemeroptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 123-142.
- MALZACHER, P. (1976): Nachtrag zur Eintagsfliegenfauna des Bodenseegebietes. - Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Caenis* (Insecta, Ephemeroptera). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 129-136.

- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landes-sammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. IX. Eine Aktion zur Gewinnung Öhninger Fossilien 1854-1860. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 5-30.
- MUCKLE, R. (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 5-109.
- MUCKLE, R. (1972): Beobachtungen am Crustaceenplankton des Überlinger Sees (Bodensee) 1952-1962. II. Jahreszeitliches Auftreten der Arten 1957-1962 und Tiefenverteilung A. Vorbemerkung, *Diaphanosoma brachyurum* und *Leptodora kindtii* (Crustacea, Cladocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 103-131.
- MUCKLE, R. & DILLMANN-VOGEL, H. (1976): Die bisexuelle Fortpflanzung in der *Daphnia longispina*-Gruppe des Bodensee-Obersees. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 81-94.
- MÜLLER, T. (1961): Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 15-21.
- MÜLLER, T. & GÖRS, S. (1958): Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im Württembergischen Oberland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 88-165.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1986): Der Cyanophyceen-Bewuchs der Furchen- oder Hirnsteine des Bodensees. - *Carolinea*, **44**: 51-60.
- OBERDORFER, E. (1962): Zur Eröffnung des neu eingerichteten Vivariums u. der neuen Schausäle mit den Tertiärfunden von Höwenegg sowie Tiergruppen der Heimat in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe am 23. März 1962. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 83-86.
- OSTENDORP, W. (1990): Die Ursachen des Röhrichtrückgangs am Bodensee - Untersee. - *Carolinea*, **48**: 85-102.
- PEINTINGER, M. (1986): *Ceratophyllum submersum* L., das Zarte Hornkraut, im westlichen Bodensee und Hegau. - *Carolinea*, **44**: 163-164.
- PEINTINGER, M. (1988): Die Vegetation des Litzelsees bei Markelfingen (Westliches Bodenseegebiet). - *Carolinea*, **46**: 17-22.
- PEINTINGER, M. (1990): Bestandsschwankungen bei seltenen Pflanzenarten in Pfeifengraswiesen des westlichen Bodenseegebietes. - *Carolinea*, **48**: 69-84.
- PEINTINGER, M. (1994): Verbreitung, Rückgang und Soziologie von *Gratiola officinalis* L. am Bodensee. - *Carolinea*, **52**: 25-34.
- PEINTINGER, M. (1995): Die Strandschmielengesellschaft (*Deschampsium rhenanae* Oberdorfer 1957) im westlichen Bodenseegebiet - ein Vergleich von Vegetationsaufnahmen 1959 und 1993. - *Carolinea*, **53**: 67-74.
- PHILIPPI, G. (1968): Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydrophiler Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 61-81.
- RITZI, M. (1940): Das Rheindelta und der „Rheinbrech“ im Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 72-75.
- RITZI, M. (1940): Hydrographische, biologische und fischereibiologische Untersuchungen im Untersee (Bodensee). 2. *Daphnia longispina* u. *Daphnia cucullata* (Phyllopoda) im Gnadensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 62-71.
- RITZI, M. & VOGEL, H. (1959): Ein Beitrag zur Besiedlungsdichte der Tiefenfauna im Bodensee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 65-74.
- ROTHAUSEN, K. (1991): Heinz Tobien 80 Jahre - Höwenegg Forschung 53 Jahre. - *Andrias*, **8**: 5-12.
- SCHLEICH, H. H. (1986): Vorläufige Mitteilungen zur Bearbeitung der fossilen Schildkröten der Fundstelle Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 47-50.
- SCHLEICH, H. H. (1990): Zur Taxonomie von „*Emys scutella* Meyer H. v.“ (= *Testudo scutella*) (Reptilia, Testudines). - *Carolinea*, **48**: 145-148.
- SCHMIDT, B. (1993): Die Sibirische Winterlibelle (Odonata) im südwestlichen Alpenvorland. - *Carolinea*, **51**: 83-92.
- SCHWOERBEL, J. (1962): Subterrane Süßwassermilben (Hydrachnellae) aus dem Bregenzer Wald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 33-43.
- TOBIEN, H. (1986): Die jungtertiäre Fossilgrabungsstätte Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). Ein Statusbericht. - *Carolinea*, **44**: 9-34.
- TOBIEN, H. & JÖRG, E. (1959): Die Ausgrabungen an der jungtertiären Fossilfundstätte Höwenegg/Hegau 1955-59. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 175-181.
- TRUNKÓ, L. (1986): Geologische Aufschlußgrabung am Höwenegg. - *Carolinea*, **44**: 179-181.
- WAGNER, G. & BURCHARDT, S. (1978): Molluskenschalen in Sedimenten aus dem Bodensee-Obersee. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 103-107.
- WEHRLE, E. (1953): Die Schmuckalge *Cosmarium subquadratum* (Nordstedt) und deren kaum bekannter Formenkreis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 90-115.
- ZAPPE, H. (1989): *Chalicotherium goldfussi* Kaup aus dem Vallesien vom Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland). - *Andrias*, **6**: 117-126.

## Schwarzwald

- AMSEL, H. G. (1950(2)): Kleinschmetterlinge aus dem badi-schen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9**: 26-28.
- BOGENRIEDER, A. & STIETENCRON, A. v. (1985): Morphologische und cytologische Untersuchungen an *Anthoxanthum alpinum* A. & D. Löve und *Anthoxanthum odoratum* L. vom Feldberg im Schwarzwald. - *Carolinea*, **42**: 51-56.
- BOGENRIEDER, A. & WERNER, H. (1979): Experimentelle Untersuchungen an zwei Charakterarten der Eisseggenflur des Feldberges (*Carex frigida* All. und *Soldanella alpina* L.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 61-69.
- BOGENRIEDER, A., BÜHLER, M. & HÄRRINGER, P. (1993): *Anthoxanthum odoratum* L. und *Anthoxanthum alpinum* (A. & D. Löve) am Feldberg (Schwarzwald). Ein Beispiel für Höhenvikarianz. - *Carolinea*, **51**: 41-50.
- BOGENRIEDER, A., RASBACH, H. & RASBACH, K. (1989): Neufund von *Botrychium matricariifolium* im Schwarzwald. - *Carolinea*, **47**: 149-150.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1990): Fortpflanzungsnachweis der Nordfledermaus im Nordschwarzwald. - *Carolinea*, **48**: 153-154.
- DIETZ, C. & BRAUN, M. (1997): Zur Fledermausfauna im Landkreis Freudenstadt (Regierungsbezirk Karlsruhe). - *Carolinea*, **55**: 65-80.
- ELSTER, H. J. (1959): Bodensee-Felchen (*Coregonen*) im Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 87-91.
- FRITZ, K. (1989): Königsfarn (*Osmunda regalis*) und Straußenfarn (*Matteuccia struthiopteris*) im Mittleren Schwarzwald. - *Carolinea*, **47**: 157.
- GREINER, C. (1936): Die Flußverlegung des Ravennabachs von der Gutach-Wutach zur Dreisam im südlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 35-36.
- GRUNEWALD, J. (1965): Zur Kenntnis der Simuliidenfauna (Diptera) des Südschwarzwaldes und seiner Randgebiete. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 143-152.

- HAGEN, H.-O. v. (1973): Ein Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* (Opiliones) aus dem nördlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 159-160.
- HAUER, J. (1939): Zur Kenntnis der Rüsselrädertiere (Bdeloidea) des Schwarzwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: 163-175.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1990): Der Kolkrahe im Schwarzwald. - Carolinea, **48**: 151-152.
- HERRMANN, R. (1983): Die Arten der Gattungen *Dahlica* Enderlein und *Sideria* Meier in Südbaden (Lepidoptera, Psychidae). - Carolinea, **41**: 87-96.
- HILPERT, H. (1987): Schlupfwespen des Feldberggebietes (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Carolinea, **45**: 147-158.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1987): Paläoökologische Mooruntersuchungen an der Hornisgrinde im Nordschwarzwald. - Carolinea, **45**: 43-50.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1988): Untersuchungen zur jüngeren Vegetations- und Siedlungsgeschichte im Blindensee-Moor (Mittlerer Schwarzwald). - Carolinea, **46**: 23-30.
- HÖLZER, A. & HÖLZER, A. (1995): Zur Vegetationsgeschichte des Hornisgrinde-Gebietes im Nordschwarzwald: Pollen, Großreste und Geochemie. - Carolinea, **53**: 199-228.
- HOPP, I. (1986): Benthalfauna und Steinbesiedlung in einem Schwarzwaldbach. - Carolinea, **44**: 153-162.
- HÜGIN, G. & HÜGIN, H. (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen). - Carolinea, **53**: 45-53.
- JURZITZA, G. (1962): Die Libellen zweier Hochmoore des nördlichen Schwarzwaldes (Wildsee- und Hohloh-Moor bei Kaltenbrunn) (Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 45-47.
- KLEINSTEUBER, A. (1992): Die Bärwurz (*Meum athamanticum* Jacq.) im Nordschwarzwald. - Carolinea, **50**: 67-78.
- KNOCH, D. (1995): Zum Vorkommen kalkliebender Pilze auf Gneisstandorten des südöstlichen Schwarzwaldes. - Carolinea, **53**: 243-250.
- LANG, G. (1954): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. I. Der Hotzenwald im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 3-42.
- LANG, G. (1955): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. II. Das absolute Alter der Tannenzeit im Südschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 24-31.
- LANG, G. (1958): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. III. Der Schurmsee im Nordschwarzwald. Ein Beitrag zur Kiefernfrage. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 20-34.
- LANG, G. (1973): Neue Untersuchungen über die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Schwarzwaldes. IV. Das Baldenwegemoor und das einstige Waldbild am Feldberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 31-51.
- LANG, G. (1975): Palynologische, großrestanalytische und paläolimnologische Untersuchungen im Schwarzwald, ein Arbeitsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 201-208.
- LOTTER, A. F. & HÖLZER, A. (1989): Spätglaziale Umweltverhältnisse im Südschwarzwald: Erste Ergebnisse paläolimnologischer und paläoökologischer Untersuchungen an Seesedimenten des Hirschenmoores. - Carolinea, **47**: 7-14.
- LUDEMANN, T. (1994): Zum Samenvorrat von Waldböden im Feldberggebiet. - Carolinea, **52**: 45-60.
- LUDWIG, W. (1968): Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 21-25.
- MATHEIS, W. (1985): Discomyceten aus Süddeutschland. II. Raum Hornberg - Triberg (mittlerer Schwarzwald). - Carolinea, **43**: 61-64.
- MERKEL, H. (1997): Verbreitung und Bestandsentwicklung der Wasseramsel im Flußsystem der Alb im Nordschwarzwald. - Carolinea, **55**: 95-104.
- MOGEL, R., RIEDER, N. & STATZNER, B. (1985): Ein Gerät zur Freilandbeobachtung des nächtlichen Verhaltens von benthischen Bachtieren, mit Befunden aus der Gattung *Hydropsyche* (Trichoptera, Insecta). - Carolinea, **42**: 121-128.
- MÜLLER, G. (1997): Extrem frühe Brut der Wasseramsel am Rand des Nordschwarzwaldes. - Carolinea, **55**: 119.
- OBERDORFER, E. (1938): Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. Erläuterung der vegetationskundlichen Karte Bühlertal-Herrenwies (Bad. Meßtischbl. 73). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 149-270.
- OBERDORFER, E. (1952): Die Wiesen des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 75-88.
- OBERDORFER, E. (1954): Kurze Bemerkung zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen - Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 109-110.
- OBERDORFER, E. (1974): *Galium lucidum* All. am Schwarzwaldrand des südlichen Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 107-111.
- PEKARSKY, P. (1968): Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgruppe. *Zygaena diaphana* Stgr. im südlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 117.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 91-124.
- PHILIPPI, G. (1963): Zur Gliederung der Flachmoosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 113-135.
- PHILIPPI, G. (1970): Vorkommen basi- und neutrophiler Pflanzen im Buntsandsteingebiet des Nordschwarzwaldes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 17-23.
- PHILIPPI, G. (1970): *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., das Purpurreitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 107-110.
- REICHEL, G. (1955): Untersuchungen zur Deutung von Schuttmassen des Südschwarzwaldes durch Schotteranalysen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 32-42.
- RIXEN, J.-U. (1965): Einige Turbellarienfunde aus dem Hochschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 137-141.
- RÖSCH, M. (1989): Pollenprofil Breitenau-Neuhof: Zum zeitlichen Verlauf der holozänen Vegetationsentwicklung im südlichen Schwarzwald. - Carolinea, **47**: 15-24.
- SCHINDLER, H. (1968): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (1. Mitt. Parmeliaceae, Teil 1). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 83-96.
- SCHINDLER, H. (1970): Über das Vorkommen von *Sphaerophorus melanocarpus* (Sw.) Dc. im nördlichen Schwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 111-114.
- SCHINDLER, H. (1974): Die Flechte *Alectoria fremontii* Tuck. im Nordschwarzwald. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 103-106.
- SCHINDLER, H. (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes (2. Mitt.: Parmeliaceae, Teil 2 und Nachtrag zu Teil 1). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 53-73.
- SCHINDLER, H. (1983): Über den Nachweis der Diffractasäure in der Flechte *Usnea ceratina* Ach. aus dem Schwarzwald. - Andrias, **2**: 5-8.

- SCHINDLER, H. (1985): Erstfund der Flechte *Parmelia glabra* (Schaer.) Nyl. im Schwarzwald und ihre Verbreitung in Deutschland und angrenzenden Gebieten. - *Carolinaea*, **42**: 43-50.
- SCHINDLER, H. (1990): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 5. *Baeomyces*, *Sphaerophorus*, *Leprocaulon* und *Stereocaulon*. - *Carolinaea*, **48**: 37-44.
- SCHINDLER, H. (1991): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 6. *Cladonia norvegica*. - *Carolinaea*, **49**: 123-124.
- SCHINDLER, H. (1992): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 7. *Ramalina* und *Evernia*. - *Carolinaea*, **50**: 45-56.
- SCHINDLER, H. (1994): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 8. Über *Placopsis lambii*, *Pannaria pezizoides* und andere seltenere Arten. - *Carolinaea*, **52**: 11-24.
- SCHINDLER, H. (1996): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 9. Die Gattungen *Lobaria*, *Sticta*, *Nephroma* und *Peltigera*. - *Carolinaea*, **54**: 53-72.
- SCHINDLER, H. (1997): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 10. Die Verbreitung von *Parmelia submontana*, ihr weiteres Vorkommen im übrigen Deutschland und Nachtrag zu *Lobaria*. - *Carolinaea*, **55**: 13-21.
- SCHINDLER, H. & BIBINGER, H. (1987): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde. 4. Die Gattung *Usnea*. - *Carolinaea*, **45**: 77-88.
- SCHINDLER, H. & HAWKSWORTH, D. L. (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwalde (3. Mitt.: Die Arten der Gattung *Alectoria*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 75-80.
- SCHLOSS, S. (1978): Pollenanalytische Untersuchungen in der Seemisse beim Wildsee/Ruhestein (Nordschwarzwald). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **37**: 37-53.
- SCHLOSS, S. (1987): Ein spätglaziales Pollenprofil von der Hornisgründe - Nordschwarzwald. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **45**: 167-168.
- SCHRÖDER, P. (1976): Zur Phänologie von *Hydropsyche instabilis* Curtis (Trichoptera, Köcherfliegen) im Föhrenbach/Schwarzwald, unter besonderer Berücksichtigung der Larvenstadien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **35**: 137-148.
- SCHUMACHER, A. (1937): Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwalde (Moore der Meßtschblätter Feldberg, St. Blasien). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 221-283.
- SCHWABE, A. (1990): Syndynamische Prozesse in Borstgrasrasen: Reaktionsmuster von Brachen nach erneuter Rinderbeweidung und Lebensrhythmus von *Arnica montana* L. - *Carolinaea*, **48**: 45-68.
- SCHWARZMANN, M. (1939): Mineralogische Mitteilungen aus den Landessammlungen für Naturkunde zu Karlsruhe. 1. Apophyllite und Thumasit aus dem Hartsteinbruch bei Haslach i.K. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **4**: 85-99.
- STRITT, W. (1954): Eine Massenzucht des Birkenblatt-Minierers *Heterarthrus (Phyllotoma) nemoratus* Hall. (Hym., Symph.). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **13**: 47-50.
- WEBER, H. E. (1996): Die Gattung *Rubus* im mittleren Schwarzwald mit Nachbargebieten. - *Carolinaea*, **54**: 9-36.
- WIRTH, V. (1966): Die Flechten des Südschwarzwalde (1. Teil: *Umbilicariaceae*, *Parmeliaceae*, *Stictaceae* und *Peltigeraeae*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 119-131.
- WIRTH, V. (1969): Die Flechten des Südschwarzwalde (II. Teil: *Placynthiaceae*, *Lichinaceae*, *Collemataceae*, *Pannariaceae*, *Physciaceae*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 19-31.
- WIRTH, V. (1974): Die Flechten des Südschwarzwalde. Ein ökologisch orientierter Florenkatalog. III. Teil: *Buellieaceae*, *Teloschistaceae*, *Usneaceae*, *Ramalinaceae*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 81-101.
- WIRTH, V. (1975): Die Vegetation des Naturschutzgebietes Utzenfluh (Südschwarzwald), besonders in lichenologischer Sicht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 463-476.
- ZIMMERMANN, P. (1990): Gefährdung der Quellmoore bei Bad Rippoldsau-Schapbach (Mittlerer Schwarzwald). - *Carolinaea*, **48**: 103-108.

## Vogesen und Pfälzer Wald

- CARBIENER, R., OURISSON, N. & BERNARD, A. (1975): Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 37-56.
- HAILER, N. (1975): Bemerkungen über *Luzula forsteri* bei Annweiler am Trifels. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 125-130.
- HÜGIN, G. & HÜGIN, H. (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen). - *Carolinaea*, **53**: 45-53.
- KAULE, G. (1974): Die Übergangs- und Hochmoore der Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 9-40.
- KORNECK, D. (1975): Das *Narduretum lachenalii*, eine neue Thero-Airion-Assoziation. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 161-166.
- KORNECK, D. (1988): Die Felsenleimkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaft (*Sileno rupestris*-*Sedetum annui*) in den Südvogesen. - *Carolinaea*, **46**: 139-140.
- LÖFFLER, H. (1961): Grundwasser- und Brunnenostracoden aus Südwestdeutschland und den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **20**: 31-42.
- PHILIPPI, G. (1963): Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwalde und der Hochvogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 113-135.
- PHILIPPI, G. (1970): *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., das Purpurreitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **29**: 107-110.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinaea*, **51**: 51-52.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & JÉRÔME, C. (1995): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* Willd. in den Vogesen und dem benachbarten Deutschland. - *Carolinaea*, **53**: 21-32.
- TRUNKÓ, L. (1979): Geologische und paläontologische Beobachtungen im Unterrotliegenden von Heimkirchen/Pfalz. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **38**: 11-16.

## Kraichgau und Neckarland

- ABRAHAM, R. (1977): Ein Beitrag zur Bionomie von *Brachygaster minuta* Olivier (Hymenoptera, Eviinidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 173-175.
- BESSLER, J. (1938): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B. Funde von *Hadrocheilus* Till im oberen Lias Gamma (Davoel-Schichten) der Langenbrückener Senke. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **3**: 66-75.
- BÜCKING, W. (1977): Nährstoffverhältnisse im Bannwald „Greifenberg“ (Kraichgau). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 67-79.

- DAUBER, A., mit Beiträgen von FIETZ, A. & LANG, G. (1955): Römische Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 43-56.
- FIETZ, A. (1951): Frühmittelalterliches Getreide aus Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 102-104.
- FIETZ, A. (1954): Römische Getreidereste aus dem nördlichen Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 99-104.
- FIETZ, A. (1961): Pflanzenreste aus den römischen Brunnen in Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 23-29.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. I. Neue Funde von Isopoden (Asseln) im Lias Südwestdeutschlands. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 100-103.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. II. Mecochirus eckerti nov. spec. aus dem Lias Epsilon (Posidonienschiefer) von Langenbrü. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 103-105.
- FROESE, A. & HAVELKA, P. (1991): Über die Ökologie von Ceratopogoniden (Diptera, Nematocera) auf Ackerflächen. - Caroleina, **49**: 126-128.
- HOFFMANN, K. (1936): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke. I. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 287-303.
- HOFFMANN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. IV. Neue Saurierreste aus dem unteren Lias Alpha der Langenbrückener Senke. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 115-120.
- HOFFMANN, K. (1938): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke. II. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **3**: 3-38.
- HÖLZER, A. (1978): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 55-92.
- KUSS, S. E. (1958): Tierreste aus römischen Brunnen von Pforzheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 166-173.
- MAYER, G. (1951): Palaeontologische Notizen aus dem Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 105-112.
- MAYER, G. (1952): Bisher bekannte und neue Vorkommen der Trias-Lebensspur Rhizocorallium jenense Zenker. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 111-115.
- MAYER, G. (1953): Bohnerzgräberei bei Diedelsheim (Bretten) im 17. Jhd. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 119.
- MAYER, G. (1954): Ein neues Rhizocorallium aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 80-83.
- MAYER, G. (1955): Eine mäandrierende Kriechspur aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 22-23.
- MAYER, G. (1955): Eine interessante Schichtfläche aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 114-118.
- MAYER, G. (1956): Eine Schichtfläche mit Biocoenosen, Strömungsmarken und Lebensspuren aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 6-10.
- MAYER, G. (1956): Bergbauliche Versuche und Unternehmungen bei Langenbrücken und Mingsolsheim im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 126-127.
- MAYER, G. (1957): Beobachtungen an einer Arenicolites-Platte. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 37-38.
- MAYER, G. (1971): Beiträge zur Geschichte der Bad. Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe II. Aus der Frühzeit der pleistozänen Fossilfundstellen Mauer bei Heidelberg. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 77-83.
- MUNDLOS, R. & URLICHS, M. (1987): Rhizocorallium als Begleiter der Bruchsaler Ceratiten-Pflaster (SW-Deutschland; Mitteltrias, Oberer Muschelkalk, evolutus-Zone). - Caroleina, **45**: 7-11.
- NÄHRIG, D. (1991): Zur Phänologie und Ökologie der Enoplophagata ovata-Gruppe (Araneae: Theridiidae). - Caroleina, **49**: 131-133.
- OVERDORFER, E. (1937): Die Bedeutung des Naturschutzgebietes am Michelsberg (Kaiserberg) bei Untergrombach. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 124-142.
- OVERDORFER, E. (1952): Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 12-36.
- PHILIPPI, G. (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. - Caroleina, **40**: 15-48.
- SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. Ein Beitrag zur Urlandschaftsfrage. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 5-114.
- WOLF, R. & LINK, F. G. (1989): Der Füllmenbacher Hofberg - Ein Rest historischer Weinberglandschaft im westlichen Stromberg. - Caroleina, Beiheft, **6**: 3-83.
- ZIMMERMANN, P. (1988): Die Schlingnatter (Coronella austriaca) im Weinberg „Höllstein“ bei Freudenstein (Enzkreis, Baden-Württemberg). - Caroleina, **46**: 65-74.

### Baar-Wutach-Gebiet

- FRENTZEN, K. (1941): Die Foraminiferenfauna des Lias, Doggers und unteren Malmes der Umgegend von Blumberg (Oberes Wutachgebiet). - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 125-402.
- GREMMINGER, A. (1950): Die Schmetterlingsfauna des Wutachgebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 55-69.
- HAUER, J. (1952): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet „Wutachtal“. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 45-53.
- OVERDORFER, E. (1949): Die Pflanzengesellschaften der Wutachschlucht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 22-60.
- STOFFLER, H.-D. (1975): Zur Kenntnis der Tannen-Mischwälder auf Tonböden zwischen Wutach und Eyach (Pyrolo-Abietetum Oberd. 1957). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 357-370.
- STRICKER, P. (1950): Der Pilzbestand der Wutachschlucht, einiger Seitenschluchten und der angrenzenden Wälder. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (1): 3-54.
- STRITT, W. (1952): Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym. Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 37-44.
- STRITT, W. (1960): Nachtrag zu: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes (Hym., Symph.). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 188-189.
- STRITT, W. (1962): Einige bemerkenswerte Hautflügler (Hymenoptera) aus dem Wutachgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 49-50.
- WEHRLE, E. (1942): Algen in Gebirgsbächen am Südostrande des Schwarzwaldes. Ökologische und floristische Untersuchungen im Wutach-Gauchach-Naturschutzgebiet. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 128-286.

### Odenwald mit Bauland und Taubergebiet

- CEZANNE, R. & EICHLER, M. (1991): Parmelia mougeotii Schaeffer ex. Diatr. im badischen Odenwald. - Caroleina, **49**: 121-122.
- DEMUTH, S. (1988): Über zwei bemerkenswerte Mauerfarne an der Bergstraße. - Caroleina, **46**: 135-136.



- LINCK, O. (1965): Eine weitere Crinoide (*Entrochus multifurcatus* n.sp.) aus dem Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 31-35.
- LUDWIG, M., MARTHALER, H. & NEUGEBAUER, H. (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbaches im südlichen Odenwald. - *Carolinea*, **46**: 43-48.
- PHILIPPI, G. (1986): Die Moosvegetation auf Buntsandsteinblöcken im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - *Carolinea*, **44**: 67-86.
- PHILIPPI, G. (1987): Die Wassermoosvegetation im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. - *Carolinea*, **45**: 89-98.
- PHILIPPI, G. (1993): *Thymelaea passerina* im Taubergebiet. - *Carolinea*, **51**: 108-111.
- PHILIPPI, G. (1993): Epiphytische Moosvegetation des südlichen Spessarts, des östlichen Odenwaldes und des angrenzenden Baulandes. - *Carolinea*, **51**: 53-74.
- SACHS, F. (1953): Die Vogelwelt im Kreise Buchen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 71-89.
- SACHS, F. (1961): Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 7-14.
- SCHÄFER, H. (1996): *Orlaya grandiflora* L. im Taubergebiet. - *Carolinea*, **54**: 185-186.
- SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. Ein Beitrag zur Urlandschaftsfrage. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **6**: 5-114.

## Schwäbische Alb

- BARANYI, I. (1980): Untersuchungen über die Veränderungen von Sedimentgesteinseinschlüssen im Suevit des Nördlinger Rieses. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 37-56.
- FRENTZEN, K. (1936): Ein fossiler Mageninhalt aus dem Lias Delta (Amaltheen-Schichten) von Reichenbach, O. A. Aalen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 153-156.
- FRENTZEN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i.B. III. Über einige Decapoden aus dem Lias Delta Schwabens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 106-115.
- HÜGIN, G. & HÜGIN, H. (1995): Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäbische Alb, Vogesen). - *Carolinea*, **53**: 45-53.
- LINGENHÖLE, A. (1985): Zucht und Flugverhalten von *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera). - *Carolinea*, **43**: 124-125.
- LÖFFLER, H. (1977): Fischereibiologische Bewertung der Großen Lauter, einem Forellentbach der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 81-89.
- MÜLLER, T. (1975): Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 233-249.
- RIETSCHEL, S. (1986): Eine große *Seiurocrinus*-Platte im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **44**: 176-178.
- STOFFLER, H.-D. (1975): Zur Kenntnis der Tannen-Mischwälder auf Tonböden zwischen Wutach und Eyach (Pyrolo-Abietetum Oberd. 1957). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 357-370.
- SUESSENGUTH, K. & RONNIGER, K. (1942): Über *Orobancha alsatica* Kirschl. var. *Mayeri* Sss. et *Ronniger*. Eine neue *Orobancha* aus der Schwäbischen Alb. - Beitr. naturk. Forsch. Oberrheingebiet, **7**: 123-127.
- WILMANN, O. (1956): Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 30-51.

## Nordbaden

- BESCH, W. (1966): Biologischer Zustand und Abwasserbelastung der Fließgewässer Nordbadens. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 141-154.
- BRAUN, M. (1985): Erstnachweis einer Nordfledermaus *Eptesicus nilssonii* (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - *Carolinea*, **43**: 127-128.
- BRAUN, M. (1985): Zum Vorkommen der Breitflügel-Fledermaus *Eptesicus serotinus* Schreber, 1774 (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - *Carolinea*, **43**: 126-127.
- BRAUN, M. (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **43**: 129-132.
- BRAUN, M. (1986): Funde der Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 (Mammalia, Chiroptera) in Nordbaden. - *Carolinea*, **44**: 169-170.
- BRAUN, M. (1988): Der Große Abendsegler in Nordbaden. - *Carolinea*, **46**: 151-152.
- BRAUN, M. (1991): Zum Vorkommen der Mopsfledermaus in Nordbaden. - *Carolinea*, **49**: 133-136.
- BRAUN, M. & HÄUSSLER, U. (1993): Der Kleine Abendsegler in Nordbaden. - *Carolinea*, **51**: 101-106.
- HAVELKA, P. & HEPP, K. (1997): Der Kolkkrabe (*Corvus corax* L., 1758) in Nordbaden. - *Carolinea*, **55**: 117-118.
- LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. (1993): 1992: 14 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 129-158.
- OBERDORFER, E. (1951): Die Naturschutzarbeit in Nordbaden 1948/50. Herrn Oberbürgermeister H. Schurhammer zum 70. Geburtstag gewidmet. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 57-61.
- OBERDORFER, E. (1954): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Nordbaden. Die Naturschutzarbeit 1951/54. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 105-108.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1989): 1987 und 1988: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **47**: 162-190.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1990): 1989: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **48**: 155-176.
- SEVERIN, I. & WOLF, R. (1991): 1990: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **49**: 139-168.
- WOLF, R. (1988): Organisation und Arbeit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL). - *Carolinea*, **46**: 153-160.
- WOLF, R. & LOEHNERT-BALDERMANN, E. (1992): 1991: 12 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **50**: 177-206.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1994): 1993: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **52**: 123-150.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1995): 1994: 11 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **53**: 263-288.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1996): 1995: 9 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 197-216.
- WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1997): 1996: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 125-146.
- ZIMMERMANN, P. & HAFNER, A. (1993): Zur Verbreitung und Lebensweise der Rotflügeligen Schnarrschrecke im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 119-122.

## Baden

- AUERBACH, M. (1940): Die Wirbeltiere Badens in ihrer Beziehung zur Umwelt und zur Landschaftsform. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 3-54.
- GREMMINGER, A. (1954): Die Schmetterlings-Eule *Thalpocharis* L. (*Porphyria* Hb.) *parva* Hb. in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 62-63.
- HAND, R. & SCHLESINGER, S. (1997): Ein Vorkommen der westmediterranen Wiesenraute *Thalictrum speciosissimum* L. in Südbaden. - *Carolinea*, **55**: 120.
- KALTENBACH, T. (1980): Beitrag zur Coleophoridaenfauna Badens (Lepidoptera, Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 165-166.
- KIEFER, F. (1936): Über das Vorkommen von Blattfußkrebsen (Euphyllopoda) in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 255-262.
- MÜLLER, G. (1979): Kommentiertes Verzeichnis der vogelkundlichen Literatur in Baden bis zum Jahr 1943. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 71-111.
- MÜLLER, K. (1936): Der badische Wald in der badischen Landschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 211.
- OVERDORFER, E. (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 121-123.
- POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze Badens. II. Teil. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **5**: 76-103.
- SCHMIDT, K. (1979): Zur Kenntnis der Gasteruptionidae Badens (Hymenoptera, Evanoidea). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 117-123.
- SCHMIDT, K. & ZMUDZINSKY, F. (1983): Beiträge zur Kenntnis der badischen Schlupfwespenfauna (Hymenoptera, Ichneumonidae) 1. Xoridinae, Acaenitiinae, Pimplinae (Poemeniini, Rhyssini). - *Andrias*, **3**: 97-103.
- SPEIDEL, W. (1979): Eine für Baden neue *Pyraustine* (Lepidoptera, Crambidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **38**: 133-134.
- STRITT, W. (1968): Ergänzungen zur Hautflüglerfauna Badens (Hymenoptera aculeata und Chrysoidea). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 109-112.
- VERHOEFF, K. W. (1936): Unsere Kenntnisse von den Diplopoden des alemannischen Gaus. 145. Diplopoden-Aufsatz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 228-254.
- VERHOEFF, K. W. (1937): Die Isopoden des alemannischen Gaus und ihre geographisch-ökologische Beurteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 22-39.
- VOIGT, K. (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 147-150.
- WOLF, R. (1997): 70 Jahre Naturschutz in Baden. Aus der Geschichte der BNL Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 147-152.

## Alpen

- AMSEL, H. G. (1958): Eine neue *Anarsia*-Art aus den Bassen-Alpen in Frankreich (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 179.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1975): Fragmenta Phytosociologica Raetica VI. *Agropyro-Alnetum incanae*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 25-36.
- JACOBI, K. & MENNE, B. (1991): Zur Fortpflanzungsbiologie der trogliphilen Kreuzdornspanners *Tiphosa dubitata* L. (Lepidoptera, Geometridae). - *Carolinea*, **49**: 129-130.
- KIEFER, F. (1976): Ruderfußkrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sandlückensystem einiger Bäche der Ostalpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 111-118.

- KOLLMANN, J., NOBIS, M., BOGENRIEDER, A. & BÖHM, R. (1995): Feinanalytische Untersuchungen zum Vegetationsmosaik zweier subalpiner Buckelweiden. - *Carolinea*, **53**: 113-125.
- OVERDORFER, E. (1950): Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **9** (2): 29-98.
- OVERDORFER, E. (1959): Borstgras- und Krummseggen-Rasen in den Alpen. Ein Beitrag zur Frage der Abgrenzung der Nardo-Callunetea gegen die *Caricetea curvulae*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 117-143.
- OVERDORFER, E. (1964): Der insubrische Vegetationskomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und der Südschweiz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 141-187.
- PHILIPPI, G. (1975): Quellflurgesellschaften der Allgäuer Alpen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 259-287.
- PHILIPPI, G. (1983): Epiphytische Moosvegetation des Garda-see-Gebietes. - *Andrias*, **2**: 23-52.
- SCHWABE, A. (1995): *Kochia prostrata*-reiche Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe unter besonderer Berücksichtigung des Aostatales. - *Carolinea*, **53**: 83-98.
- WAGNER, H. (1975): Zum Gesellschaftsanschluss von *Betula humilis* und *Pedicularis sceptrum-carolinum* bei Edlach im Palental, Steiermark. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 403-409.

## Süddeutschland

- AMSEL, H. G. (1953): Über einen tiergeographisch interessanten Kleinschmetterling Süddeutschlands. Die Unterart-Bildung bei *Pristophora florella* Mn. (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 12-16.
- GÖRS, S. (1975): Das *Cladietum marisci* All. 1922 in Süddeutschland. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 103-123.
- GUTMANN, K. (1936): Grabhügelstudien. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **1**: 263-286.
- KOHLER, A. (1975): Submerse Makrophyten und ihre Gesellschaften als Indikatoren der Gewässerbelastung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 149-159.
- OVERDORFER, E. (1956): Übersicht der Süddeutschen Pflanzengesellschaften. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 11-29.
- SEIBERT, P. (1975): Veränderungen der Auenvegetation nach Anhebung des Grundwasserspiegels in den Donauauen bei Offingen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 329-343.
- STUMPF, J. & SZEPTYCKI, A. (1989): *Eosentomon rusekianum* sp. n., a new species of Protura (Arthropoda: Insecta) from South Germany. - *Carolinea*, **47**: 141-146.

## Mitteleuropa

- BEHR, O., HRUBY, J. & MACHULE, M. (1966): *Catalogus simul Monumentum Florae Germaniae Orientalis enumerans omnes stirpes Pteridophytas et Anthophytas in Bohemia et Moravia septentrionali, Borussia orientali et occidentali, Lusatia orientali, Neomarchia, Pomerania, provincia Posania et Silesia sponte crescentes*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 3-41.
- BRECHTEL, F., EHRMANN, R. & DETZEL, P. (1996): Zum Vorkommen der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* (Linné, 1758) in Deutschland. - *Carolinea*, **54**: 73-90.
- DIERSCHKE, H. (1995): Phänologischer Jahresrhythmus eines Tollkirschen (*Atropion*)-Waldsaumes. - *Carolinea*, **53**: 75-81.

- DIERSSEN, K. (1983): Zur Verbreitung und Soziologie von *Sphagnum riparium* Angstr. in Mitteleuropa. - *Andrias*, **2**: 9-22.
- FUCHS, G. (1973): Zur Geschichte eines quartären Westeifel-Vulkans, der Rusbüsch bei Niederbettingen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **32**: 181-193.
- FUCHS, G. (1974): Das Unterdevon am Ostrand der Eifeler Nordsüd-Zone. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Beih.*, **2**: 3-163.
- HEISS, E. (1997): Erstnachweis einer Aneurinae aus dem Baltischen Bernstein: *Aneurus ancestralis* n.sp. (Heteroptera, Aradidae). - *Carolinea*, **55**: 111-112.
- KÖHLER, A. (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **22**: 3-18.
- KRAL, F., MAYER, H. & ZUKRIGL, K. (1975): Die geographischen Rassen der Waldgesellschaften in vegetationskundlicher, waldbeschichtlicher und waldbaulicher Sicht. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 167-185.
- KRAL, F. (1975): Waldgeschichtliche Analyse der geographischen Rassenbildung. Siehe Kral, F., Mayer, H. & Zukrigl, K. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 171-174.
- KÜPPERS, P. V. (1977): Zur taxonomischen Neuorientierung der Adelidae Deutschlands (Adeliden-Studien I). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **36**: 239-246.
- LOHMEYER, W. (1975): Zur Kenntnis der anthropogenen Flora und Vegetation des Tomberges bei Rheinbach im Rhein-Siegkreis. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 209-213.
- LUDWIG, W. (1995): Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) in Hessen und einigen Nachbargebieten. - *Carolinea*, **53**: 13-16.
- MADER, D. (1985): Entstehung des germanischen Buntsandsteins. - *Carolinea*, **43**: 5-60.
- MÄGDEFRAU, K. (1937): Lebensspuren fossiler „Bohr“-Organismen. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **2**: 54-67.
- MOOR, M. (1975): Die soziologisch-systematische Gliederung des Hirschzungen-Ahornwaldes. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 215-223.
- MÜLLER, T. (1995): Die systematische Stellung des *Aceri-Fagetum*. - *Carolinea*, **53**: 175-184.
- MÜLLER-STOLL, W. R. (1936): Zur Kenntnis der Tertiärfloora der Rhön. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **1**: 89-128.
- NEUBERT, H. (1985): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. II. Erstfund von *Trichia erecta* REX. - *Carolinea*, **43**: 117-119.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1986): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. III. Liste der bislang bekannten Arten. - *Carolinea*, **44**: 61-66.
- NEUBERT, H. & BAUMANN, K. (1987): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland, Schlüssel zu den Ordnungen und den Familien, Gattungen und Arten der Ordnung Trichiales. - *Carolinea*, **45**: 51-76.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1989): Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. V. (mit Berücksichtigung der Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **47**: 25-46.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1991): Myxomyceten aus Deutschland. VII. (Mit Berücksichtigung der Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **49**: 13-26.
- NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & BAUMANN, K. (1992): Myxomyceten aus Deutschland. VIII. (Mit Berücksichtigung der Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolinea*, **50**: 27-44.
- NOIRFALISE, A. & THILL, A. (1975): Les Boissements d'Épicéa et leurs Types pédobotaniques en Ardenne (Belgique). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 251-257.
- ÖBERDORFER, E. (1953): Der europäische Auenwald. Eine soziologische Studie über die Gesellschaften des Alneto-Ulmion. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **12**: 23-70.
- ÖBERDORFER, E. (1971): Zur Syntaxonomie der Trittpflanzen-Gesellschaften. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **30**: 95-111.
- PHILIPPI, G. (1967): Zur Kenntnis des Wassermooses *Cinclidotus danubicus* Schiffn. et Baumgartn. und seiner Verbreitung in Europa. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **26**: 77-81.
- POTT, R. & HÜPPE, J. (1995): Die Bedeutung der Extensivbewirtschaftung für die Pflege und Erhaltung nordwestdeutscher Hudelandschaften am Beispiel des NSG Borkener Paradies im Emstal bei Meppen (Emsland). - *Carolinea*, **53**: 99-111.
- RENNER, F. (1983): Neues aus der *Pyrgus alveus*-Gruppe für den mitteleuropäischen Raum (Lepidoptera, Hesperidae). - *Carolinea*, **41**: 133-134.
- RIEGER, C. & GÜNTHER, H. (1982): Bemerkungen zur Gattung *Temnostethus* Fieber 1860 in Mitteleuropa (Heteroptera, Anthocoridae). - *Carolinea*, **40**: 100-101.
- SCHNEEDLER, W. (1995): Arbeitsaufwand für floristische Nachweis-Karten und deren Aussagekraft. - *Carolinea*, **53**: 33-44.
- SCHWÖBEL, H. (1985): *Entoloma* (*Rhodophyllus*) *scabiosum* (Fries) Quéé. erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland gefunden. - *Carolinea*, **43**: 119-122.
- SOUGNEZ, N. & DETHIUX, M. (1975): La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 345-356.
- SUKOPP, H., MARKSTEIN, B. & TREPL, L. (1975): Röhrichte unter intensivem Großstadteinfluß. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 371-385.
- THOMAS, W. (1974): *Cnephasia tyrhaenica* Amsel und *Grapholitha lobarzewskii* Nowicki (Lep., Tortr.) - zwei für Deutschland neue Wickler. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **33**: 205-207.
- TRUNKO, L. (1966): Ein seltener Crinoiden-Kelch aus dem rheinischen Mitteldevon. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **25**: 93-95.
- TÜXEN, R. & OHBA, T. (1975): Zur Kenntnis von Bach- und Quell-Erlenwäldern (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* und *Ribis sylvestris-Alnetum glutinosae*). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 387-401.
- ZUKRIGL, K. (1975): Zur vegetationskundlichen Ansprache von geographischen Rassen. Siehe Kral, F., Mayer, H. & Zukrigl, K. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 167-171.

## Südeuropa

- AMSEL, H. G. (1955): Eine neue *Dysmasia*-Art aus Portugal (Lepidoptera: Tineidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **14**: 130-131.
- AMSEL, H. G. (1957): Neue Microtineiden aus Portugal (Lepidoptera: Tineidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **16**: 30-33.
- BALDIZZONE, G. & KALTENBACH, T. (1983): Eine neue Coleophoridae aus Sardinien (Lepidoptera, Coleophoridae). - *Andrias*, **3**: 33-36.
- BAUER, W. & MÜLLER, G. (1969): Zur *Avifauna* des Ewros-Delta. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **28**: 33-52.
- GLAVAC, V. (1975): Das Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 53 in Nordwestkroatien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.*, **34**: 95-101.

- JURZITZA, G. (1965): Ein Beitrag zur Kenntnis der Odonaten-fauna von Nordost-Spanien, mit Bemerkungen zur Rassenfrage der *Agrion haemorrhoidalis* (Van der Linden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 183-187
- JURZITZA, G. (1967): Ein Beitrag zur Kenntnis der *Boyeria irene* (Fonscolombe). (Odonata, Aeschnidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 149-154.
- KIAUTA, B. (1963): *Lindenia tetraphylla* v.d.Lind. und *Somatochlora metallica meridionalis* Nielsen aus Nordweststrien (Jugoslawien) (Odonata: Gomphidae, Corduliidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 65-66.
- KOUTSAFTIKIS, A. (1973): Nachträge, Ergänzungen und Ökologisch-Zoogeographische Berichtigungen der Nymphalidae-Fauna Griechenlands (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 169-177.
- MELBER, A. (1988): *Tropidothorax sternalis* (Dallas) 1852, eine neue Wanzenart für Italien. - *Carolinea*, **46**: 147-148.
- ÖBERDORFER, E. (1972): Die systematische Gliederung xerothermer Saum-, Busch- und Waldgesellschaften. Bemerkungen zu P. Jakucs: Dynamische Verbindungen der Wälder und Rasen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 87-90.
- ÖBERDORFER, E. & HOFMANN, A. (1967): Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nordapennin (Wälder, Heiden, Wiesen und Unkrautfluren). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 83-139.
- PETERSEN, G. (1962): Beitrag zur Kenntnis der südeuropäischen Tineiden (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 205-220.
- RIEGER, C. (1986): Wanzen aus Malta (Insecta, Heteroptera). - *Carolinea*, **44**: 87-90.
- RIETSCHTEL, S. (1983): Massenvorkommen der Platanen-Gitterwanze *Corythucha ciliata* in Südfrankreich. - *Carolinea*, **41**: 132.
- RIETSCHTEL, S. (1985): Naucoriden im Mittelmeer als Modellfall für das Vorkommen von Wasserwanzen in den Solnhofener Plattenkalken. - *Carolinea*, **42**: 143-144.
- WILMANN, O. (1995): Ein Vergleich der Texturen von Weinbergsgesellschaften im Elsaß und in Südfrankreich. - *Carolinea*, **53**: 55-66.
- WITTIG, R. & THIEL, A. (1995): Buchenwälder in Nordwest-Spanien. - *Carolinea*, **53**: 185-198.
- KORNECK, D. (1975): Das Narduretum lachenalii, eine neue Thero-Airion-Assoziation. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 161-166.
- LATTIN, G. DE (1959): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Cynaeda* Hb. (Lepid., Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 106-111.
- LATTIN, G. DE (1963): Über die Arten der *Ethmia pusiella* L.-Gruppe (Lep.-Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **22**: 45-64.
- MALSCH, W. (1954): Eine Schwedenreise zur Totalen Sonnenfinsternis am 30. Juni 1954. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 71-79.

## Paläarktis, Holarktis

- ARENBERGER, E. (1977): Die paläarktischen Agdistis-Arten (Lepidoptera, Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 185-226.
- EBERT, G. (1978): Neue Taxa paläarktischer Noctuidae aus dem wissenschaftlichen Nachlass von Charles Boursin (Lep./Noct. Trifin.) 1. Die Arten der Gattung *Oncocnemis* Lederer, 1853. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 193-207.
- KIEFER, F. (1976): Revision der robustus-vernalis-Gruppe der Gattung *Acanthocyclops* Kiefer (Crustacea, Copepoda) (Mit eingehender Beurteilung des „*Cyclops americanus* Marsh 1892“). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 95-110.
- PASSERIN D'ENTREVES, P. (1983): Anmerkungen zu einigen paläarktischen Scythriden (Lepidoptera, Scythrididae) und Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Scythris*. - *Andrias*, **3**: 25-32.
- ROESLER, R. U. (1966): Beschreibung von neuen Taxa des *Homoeosoma-Ephestia*-Komplexes (Lepidoptera, Phycitidae) aus der Paläarktis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 43-69.
- SCHMIDT, E. (1957): Was ist *Somatochlora sibirica* Trybom? Ein Indizienbeweis, zugleich Versuch einer Gruppierung der paläarktischen Arten der Gattung (Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 92-100.

## Asien

- AMSEL, H. G. (1969): Eine neue chinesische *Ethmia*-Art (Lepidoptera: Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 75-76.
- ÖBERDORFER, E. (1983): Einige Bemerkungen zu Vegetationsstrukturen im östlichen Nordamerika, in Oahu (Hawaii) und Mitteljapan. - *Andrias*, **2**: 53-63.
- ROESLER, R. U. (1978): Eine neue Pyralide an *Loranthus* aus Pakistan. Phycitinen-Studien XVI (Lepidoptera: Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 209-214.

## Vorderasien

- AMSEL, H. G. (1955): Irakische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 119-129.
- AMSEL, H. G. (1956): Kleinschmetterlinge vom mittleren Jordanal. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **15**: 56-62.
- AMSEL, H. G. (1958): Kleinschmetterlinge aus Nordost-Arabien der Ausbeute A. S. Talhouk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 61-82.
- AMSEL, H. G. (1961): Zwei neue *Evippe*-Arten aus Afghanistan, Iran und Nord-Syrien (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 99-103.
- BEIER, M. (1969): Ein neuer Allochernes (Pseudoscorp) vom Elbursgebirge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 121-122.
- CAPUSE, I. (1974): Beiträge zum Studium der Familie Coleophoridae, IX (Lepidoptera). Über die von A. Caradja beschriebenen Taxa der Gattung *Coleophora*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 179-195.
- DIERSSEN, K. (1975): Zur Litoralvegetation oligotropher und mesotropher Gewässer in Island und Norwegen - ein Beitrag zur Soziologie und Verbreitung der Littorelletea in Nord-Europa. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 57-77
- GÉHU, J.-M. & GÉHU, J. (1975): Les fourrés des sables littoraux du Sud-Ouest de la France. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **34**: 79-94.
- JURZITZA, G. (1964): Ein Beitrag zur subspezifischen Gliederung der *Aeschna subarctica* Walker in Europa (Odonata, Aeschnidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 123-135.
- KIEFER, F. (1974): Beitrag zur Kenntnis der castor-Gruppe der Gattung *Diaptomus* (sens. restr.) (Crustacea, Copepoda). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 209-218.

## Übriges Europa

- AMSEL, H. G. (1961): Microlepidopteren aus SW-Arabien der Ausbeuten H. Scott und E.B. Britton 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **20**: 49-61.
- ARENBERGER, E. (1972): Eine neue Agdistis-Art aus Kleinasien (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **31**: 151-152.
- ASPOCK, H. & ASPOCK, U. (1965): Die Neuropteren Vorderasiens 1. Coniopterygidae. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **24**: 159-181.
- BEAUMONT, J. DE (1962): Spheciden aus Zentral-Arabien der Ausbeute Diehl (Hym.). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **21**: 221-224.
- BLESZYNSKI, S. (1959): Materialien zur Kenntnis der Crambinae. 21. Teil. Studien über einzelne Crambinae aus dem Nahen Osten (Lepidoptera, Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **18**: 112-116, Taf. III.
- EINSLER, U. (1992): Neu- und Wiederbeschreibungen einiger Arten der Gattung Cyclops s. str. (Copepoda, Cyclopoida) aus der Türkei und Asien. - Andrias, **9**: 179-194.
- HÖLZEL, H. (1967): Die Neuropteren Vorderasiens. II. Chrysopidae. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **26**: 19-45.
- HÖLZEL, H. (1968): Die Neuropteren Vorderasiens. III. Nemopteridae. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **27**: 37-47.
- HÖLZEL, H. (1972): Die Neuropteren Vorderasiens. IV. Myrmeleonidae. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., Beih., **1**: 3-103.
- KIEFER, F. (1981): Ein neuer brunnenbewohnender Cyclope (Copepoda, Cyclopoida) aus Syrien. - Andrias, **1**: 101-102.
- LATTIN, G. DE (1959): Beiträge zur Kenntnis der Gattung Cynaeda Hb. (Lepid., Pyralidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **18**: 106-111.
- LATTIN, G. DE (1963): Über die Arten der Ethmia pusiella L.-Gruppe (Lep.-Ethmiidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **22**: 45-64.
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus SW-Arabien der Ausbeuten H. Scott und E. B. Britton 1937/38. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **20**: 63-65.
- PETERSEN, G. (1961): Tineiden aus Riad (Zentral-Arabien) der Ausbeute von Dr. E. Diehl (Lepidoptera: Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **20**: 107-110.
- RAZOWSKI, J. (1957): Neue Wickler-Arten aus der Sammlung Amsel (Lepidoptera: Tortricidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **16**: 101-104.
- SÄTTLER, K. (1962): Über Parapodia sinaica (Frauenfeld, 1860) (Lep., Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **21**: 51-53.
- WALTHER, K. (1975): Beiträge zur Flora Nordostanatoliens. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **34**: 411-427.
- Iran**
- AMSEL, H. G. (1964): Ein neuer Kleinschmetterling als Pistazien-Schädling aus Iran (Lepidoptera: Oionophilidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **23**: 107-109.
- AMSEL, H. G. (1974): Neue iranische Kleinschmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **33**: 197-203.
- AMSEL, H. G. (1977): Vier neue Kleinschmetterlinge aus Iran (Lepidoptera). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **36**: 227-236.
- AMSEL, H. G. (1978): Eine neue Carposinide aus West-Iran (Lepidoptera: Carposinidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **37**: 215-216.
- EBERT, G. (1971): Drei neue Macrolepidoptera-Arten aus Iran. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **30**: 65-71.
- EBERT, G. (1974): Zur Taxonomie und Verbreitung der Ocnogyna nordstroemi-Artengruppe (Lep./Arct.). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **33**: 169-176.
- EBERT, G. (1974): Zwei neue Taxa der Gattung Zygaena (Mesembrynus) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **33**: 163-168.
- PETERSEN, G. (1964): Tineiden von Karatschi (Pakistan), Fars (SW-Iran) und den Bahrein-Inseln (Lepidoptera, Tineidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **23**: 111-122.
- WURST, C. (1997): Arrhaphipterus zoroastres n.sp., eine neue Rhipiceride aus dem südlichen Iran (Coleoptera, Dascilloidea, Rhipiceridae). - Carlinea, **55**: 105-107.
- Afghanistan**
- AMSEL, H. G. (1957): Die Deutsche Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **16**: 5-29.
- AMSEL, H. G. (1961): Zwei neue Evippe-Arten aus Afghanistan, Iran und Nord-Syrien (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **20**: 99-103.
- AMSEL, H. G. (1967): Die zweite Deutsche Afghanistan-Expedition 1966 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Ein Reisebericht. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **26**: 3-14.
- AMSEL, H. G. (1967): Eine neue afghanische Stenoptilia-Art (Lepidoptera: Pterophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **26**: 15-16.
- AMSEL, H. G. (1967): Die afghanischen Arten des Anarsia-Komplexes. Zugleich eine vorläufige Revision der sonstigen paläarktischen Arten (Lepidoptera: Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **26** (3): 17-31.
- AMSEL, H. G. (1968): Über Homonymien bei afghanischen Coleophoriden (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **27**: 49-50.
- AMSEL, H. G. (1969): Die afghanischen Ethmia-Arten (Lepidoptera: Ethmiidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Deutschen Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **28**: 115-119.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische Pyraustinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **29**: 25-66.
- AMSEL, H. G. (1970): Afghanische quadrifine Phycitinae (Lepidoptera: Pyralidae) Ergebnisse der 1. u. 2. Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **29**: 67-89.
- AMSEL, H. G. (1972): Depressarien aus Afghanistan, Iran, Irak und Arabien (Lepidoptera: Oecophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **31**: 133-144.
- BEAUMONT, J. DE (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Sphecidae (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **19**: 271-276.
- BECHYNE, J. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Chrysomelidae, Galerucidae und Altriciidae (Coleoptera, Phytophaga). - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **19**: 255-257.
- BEIER, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Mantidae. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **19**: 267.
- BEIER, M. (1967): Ein phoretischer Allochernes (Pseudoscopus) aus Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. Südwdtll., **26**: 17-18.

- BIELAWSKI, R. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Coccinellidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 227-230.
- BLÜTHGEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Diptoptera und Apoidea (partim) (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 277-287
- BOURSIAN, C. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Noctuidae-Trifinae (Lep.) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae - Trifinae", 111). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 373-398, Taf. V-X + 2 S.
- COLLINGWOOD, C.A. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Formicidae (Hymenoptera Aculeata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 289-298.
- DANIEL, F. (1958): Zwei neue Rethera-Arten aus Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **17**: 83-84.
- DIRSH, V. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Acridoidea (Orthoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 263-266.
- EBERT, G. (1967): Bemerkungen zur Verbreitung, Ökologie und Phaenologie afghanischer Schmetterlinge. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 109-135.
- FUCHS, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cerambycidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 259.
- GUIGNOT, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dytiscidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 233.
- HEDWIG, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ichneumonidae, Braconidae (Hymenoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 291-298.
- HERING, E. M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trypetidae (Diptera) (56. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 319-331.
- HINCKS, W. D. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermaptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 261.
- HOBERLANDT, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Heteroptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 197-222.
- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tenebrionidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 235-238.
- KASZAB, Z. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Meloidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 239-240.
- MANDL, K. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Cicindelidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 231-232.
- MANNHEIMS, B. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tipulidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 309-311.
- MOUCHA, J. & CHVALA, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Tabanidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 313-315.
- MOUCHA, J. & HRADSKY, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Asilidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 317-317
- MROCKZOWSKI, M. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Dermestidae (Coleoptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 223-226.
- NIELSEN, P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Limoniidae (Diptera, Nematocera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 305-307
- OLDROYD, H. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Bombyliidae, Therevidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 301-303.
- PRINCIS, L. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Blattariae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 269-270.
- RAZOWSKI, J. (1967): Afghanische Wickler-Arten (Lepidoptera: Tortricidae und Cochyliidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 91-108.
- REBMANN, O. (1970): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Megachile Latreille (Hymenopt., Apidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **29**: 155-159.
- SATTLER, K. (1967): Die Gattungen Ornativa Gozmany und Horridovalva gen.n. (Lepidoptera, Gelechiidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 33-90.
- SCHERPELTZ, O. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Staphylinidae (Coleoptera) 87 Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 249-253.
- SCHMID, F. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Trichoptera. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 333-336.
- SCHMIDT, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe, sowie der Expeditionen J. Klapperich, Bonn 1952-53 und Dr. K. Lindberg, Lund (Schweden) 1957-60. Libellen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 399-435, Taf. XI.
- SMITH, K.G.V. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Conopidae (Diptera). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 299-300.
- THOMAS, W. & RESHÖFT, K. (1983): Zur Biologie von Onogyna afghanicola Ebert 1974 (Lepidoptera, Arctiidae). - Andrias, **3**: 71-72.
- TOLL, S. v. & AMSEL, H. G. (1967): Coleophoriden aus Afghanistan (Lepidoptera: Coleophoridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 5-16.
- VOSS, E. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Curculionidae (Coleoptera) (131. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 241-248.
- WILTSHIRE, E. P. (1961): Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Middle East Lepidoptera, XV. A second

- contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 337-371.
- WILTSHIRE, E. P. (1967): Middle East Lepidoptera. XX. A third contribution to the Fauna of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **26** (3): 137-169.
- WILTSHIRE, E. P. (1971): Middle East Lepidoptera. XXIX: Noc-tuidae Quadriifinae. Taken by G. Ebert and colleagues in Af-ghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **30**: 57-63.

## Südostasien

- FIALA, B., LINSENMAIR, K. E. & MASCHWITZ, U. (1994): Diversität von Interaktionen zwischen Ameisen und Pflanzen im süd-ostasiatischen Regenwald. - Andrias, **13**: 169-178.
- FLOREN, A. & LINSENMAIR, K. E. (1994): Zur Diversität und Wieder-besiedlungsdynamik von Arthropoden auf drei Baumarten in einem Regenwald in Sabah, Malaysia. - Andrias, **13**: 23-28.
- KIEFER, F. (1974): Zwei neue Ruderfußkrebse (Crustacea, Cope-poda) aus Malaysia. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **33**: 219-222.
- KÜPPERS, P. V. (1978): Neue und wenig bekannte Delias (Lepidoptera, Pieridae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **37**: 181-191.
- MALICKY, H. (1978): Beiträge z. Kenntnis der Insektenfauna Sumatras. Teil 7: Köcherfliegen (Trichoptera) aus Sumatra und West-Neuguinea. I. Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Stenopsychidae, Goeridae. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **37**: 159-173.
- ROESLER, R. U. (1977): A) Die verschiedenen Erscheinungsfor-men der Mimikry. Siehe Roesler, R. U. & Küppers, P. V. (1977) - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **36**: 113-133.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras (Ergebnisse einer entomologischen Forschungsreise) Teil 1: Reisebericht und Landschaftsbe-schreibung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 97-121.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1974): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras (Ergebnisse einer entomologi-schen Forschungsreise) Teil 2: Geographie, Entstehungsge-schichte und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **33**: 129-156.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1977): Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sumatras Teil 6: Betrachtungen zum Problem-kreis „Mimikry“ am Beispiel südostasiatischer Insekten. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **36**: 113-151.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1979): Die Phycitinae (Lepido-ptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., Beih., **3**: 1-249.
- ROESLER, R. U. & KÜPPERS, P. V. (1981): Die Phycitinae (Lepido-ptera: Pyralidae) von Sumatra; Taxonomie Teil B, Ökologie und Geobiologie. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., Beih., **4**: 1-282.
- ROSCISZEWSKI, K. & MASCHWITZ, U. (1994): Prey specialisation of army ants of the genus *Enicetus* in Malaysia. - Andrias, **13**: 179-187.

## Afrika

- ANGST, R. (1985): Beitrag zur Kenntnis des Elefantenschädels (Mammalia: Proboscidea) - Stoßzahnlose afrikanische Ele-fanten in den Landessammlungen für Naturkunde, Karls-ruhe. - Caroleina, **42**: 129-137.
- KLÖTZLI, F. (1975): Zur Waldfähigkeit der Gebirgssteppen Hoch-Semiens (Nordäthiopien). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **34**: 131-147.

- KNIPPER, H. (1963): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafri-ka der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **22**: 73-87
- KNIPPER, H. (1964): Zoologische Reise 1961/63 nach Ostafri-ka der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Ein Reisebericht II. Teil. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **23**: 7-30.

## Kanaren und Kapverden

- ARENBERGER, E. (1973): Eine neue Agdistis-Art von den Kana-rischen Inseln (Lep., Pterophoridae) *Agdistis pseudocanari-ensis* spec. nov. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 179-180.
- FRENZEL, P. (1976): Beitrag zur Kenntnis der Fimbriatus-Grup-pe des Genus *Paracyclops*. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **35**: 119-124.
- MENDES, L. F. (1983): New data on the Lepismatidae (Ap-terygota, Zygentoma) from the Cape Verde Islands. - Andrias, **3**: 5-8.
- OVERDORFER, E. (1965): Pflanzensoziologische Studien auf Te-neriffa und Gomera (Kanarische Inseln). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **24**: 47-104.
- TRAUB, B. & BAUER, E. (1983): Die Eulenfalter der Kapverdi-schen Inseln (Lepidoptera, Noctuidae). - Andrias, **3**: 59-70.

## Nordamerika

- BORNKAMM, R. (1975): Some observations on weed communi-ties in the city of Durham, North Carolina, U. S. A. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **34**: 15-24.
- EINSLE, U. (1992): Nordamerikanische Arten der Gattungen *Eucyclops* und *Acanthocyclops* (Crustacea, Copepoda) aus alten Proben der Sammlung F. Kiefer. - Andrias, **9**: 195-210.
- OVERDORFER, E. (1983): Einige Bemerkungen zu Vegetations-strukturen im östlichen Nordamerika, in Oahu (Hawaii) und Mitteljapan. - Andrias, **2**: 53-63.

## Südamerika

- BLANKE, R. (1976): Über das bisher unbekannte Männchen von *Cyrtophora stellata* Simon (Araneae, Araneidae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **35**: 125-127
- BONALDO, A. B. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Revision of the neotropical spider genus *Stethorhagus* (Araneae, Corin-nidae). - Andrias, **13**: 33-64.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Amazoronus*, a new genus of the spider family *Gnaphosidae* (Araneae) from central Amazonia, Brazil. - Andrias, **13**: 65-70.
- BRESCOVIT, A. D. & HÖFER, H. (1994): *Heidrunea*, a new genus of the spider subfamily *Rhoicininae* (Araneae, Trechalei-dae) from central Amazonia, Brazil. - Andrias, **13**: 71-80.
- BRETFELD, G. & GAUER, U. (1994): Diagnostic description of the males of new *Sphaeridia* species (Insecta, Collembola) from South America. - Andrias, **13**: 113-136.
- BIGNOLI, P. M. (1978): Spinnen aus Brasilien IV. Zwei neue blinde Bodenspinnen aus Amazonien (Arachnida, Ara-neae). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **37**: 143-147.

- EBERMANN, E. (1986): Zur Kenntnis der Scutacariden Südamerikas (Acari, Tarsonemina). - *Andrias*, **5**: 15-14.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some basic oppiid-like taxa (Acari, Oribatei) from Amazonia. - *Andrias*, **9**: 57-74.
- FRANKLIN, E. & WOAS, S. (1992): Some Oribatid Mites of the family Oppiidae (Acari, Oribatei) from Amazonia. - *Andrias*, **9**: 5-56.
- HAUER, J. (1956): Ein neuer Brachionus (Rotatoria) aus Venezuela. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **15**: 63-64.
- HAUER, J. (1958): Beitrag zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **17**: 174-178.
- HAUER, J. (1961): Zur Kenntnis südamerikanischer Rotatorien. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **20**: 67-69.
- HAUER, J. (1965): Über einige im Stromgebiet des Amazonas neu entdeckte Rädertiere. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **24**: 41-46.
- HAUER, J. (1966): *Brachionus gillardi* n.sp. (Rotatoria). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **25**: 73-74.
- HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. (1994): Ergebnisse der Bolivien-Expedition des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe: Spinnen (Araneae). - *Andrias*, **13**: 99-112.
- HÖFER, H., BRESCOVIT, A. D. & GASNIER, T. (1994): The wandering spiders of the genus *Ctenus* (Ctenidae, Araneae) of Reserva Ducke, a rainforest reserve in central Amazonia. - *Andrias*, **13**: 81-98.
- KIEFER, F. (1959): Über einige Ruderfußkrebse aus Südchile. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **18**: 53-58.
- KÜPPERS, P. V. (1974): Eine Rasse von *Graphium agesilaus* Guerin & Percheron, 1835 (Lep. Papilionidae) aus Nord-Peru. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **33**: 157-161.
- MARTIUS, C. (1994): Termite nests as structural elements of the Amazon floodplain forest. - *Andrias*, **13**: 137-150.
- MARTIUS, C., HÖFER, H., VERHAAGH, M., ADIS, J. & MAHNERT, V. (1994): Terrestrial arthropods colonizing an abandoned termite nest in a floodplain forest of the Amazon River during the flood. - *Andrias*, **13**: 17-22.
- PINTO-DA-ROCHA, R. (1994): A new species of *Santinezia* from central Amazonia, with systematic comments on the genus (Arachnida, Opiliones, Cranidae). - *Andrias*, **13**: 29-32.
- RIEDE, K. & DUFFNER, K. (1994): Systematik und Biogeographie nordwestamazonischer Orthopteren. - *Andrias*, **13**: 151-160.
- RÖMBKE, J. & HANAGARTH, W. (1994): The present faunistic knowledge on terrestrial Oligochaeta from Bolivia. - *Andrias*, **13**: 7-16.
- SILVA VIEIRA, R. & HÖFER, H. (1994): Prey spectrum of two army ant species in central Amazonia, with special attention on their effect on spider populations. - *Andrias*, **13**: 189-198.
- VANICEK, M., ADIS, J. & PAARMANN, W. (1994): Untersuchungen zur Biologie dreier Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) aus amazonischen Regenwäldern. - *Andrias*, **13**: 161-168.
- VERHAAGH, M. (1988): „Parasitierung“ einer Ameisen-Pflanzen-Symbiose im neotropischen Regenwald? - *Carolinea*, **46**: 150.
- VERHAAGH, M. (1994): *Pachycondyla luteola* (Hymenoptera, Formicidae), an inhabitant of *Cecropia* trees in Peru. - *Andrias*, **13**: 214-224.
- VERHAAGH, M. & ROSCISZEWSKI, K. (1994): Ants (Hymenoptera, Formicidae) of forest and savanna in the Biosphere Reserve Beni, Bolivia. - *Andrias*, **13**: 199-214.
- WALTER, G. (1990): Zeckenfunde (Ixodoidea, Ixodidae) aus Paraguay und Peru. - *Andrias*, **7**: 169-170.
- WOAS, S. (1992): *Hermannia* (Phyllhermannia) neotropica, eine neue Hermanniiidae aus Südbrasilien (Acari, Oribatei). - *Andrias*, **9**: 163-178.

## Tropen allgemein

- BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. (1994): Tropische Diversität, ihre Aufrechterhaltung und deren Mechanismen. - *Andrias*, **13**: 5-6.
- BLANKE, R. (1974): Der Zusammenhang zwischen Beuteangebot und Reproduktionsrate bei *Cyrtophora citricola* Forskal (Araneae, Araneidae). - *Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl.*, **33**: 223-228.



## 5. Biographisches, Nachrufe

- FRENTZEN, K. (1951): **Max Auerbach**. Ein Lebensbild. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 75-87
- N.N. (1959): **Max Auerbach** zum achtzigsten Geburtstag. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **18**: 3-4.
- OBERDORFER, E. (1969): **Max Auerbach** zum Gedächtnis, 26.1.1879 - 21.11.1968. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 3-4.
- TRUNKÓ, L. (1980): **Paul Bartocha** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 187-188.
- EBERT, G. (1996): Dr. **Rupprecht Bender** (1905-1993) und seine Sammlung. - Caroleinea, **54**: 196.
- EBERT, G. (1974): In memoriam **Charles Boursin**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 5-6.
- GEIGER, H. (1991): **Günther Buchloh**, 1923-1889. - Caroleinea, **49**: 169-179.
- BROSSMER, K. (1952): **Robert Burger** (1868-1950), ein führender badischer Schulmann. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 69-71.
- EBERT, G. (1996): Die Sammlung Dr. med **Otto Engelhardt**. - Caroleinea, **54**: 195.
- SCHWARZMANN, M. (1949): Zum Gedenken an **Kurt Frentzen**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 5-9.
- TRUNKÓ, L. (1989): Prof. Dr. **Günter Fuchs** † 31. Juli 1935 - 17 August 1989. - Caroleinea, **47**: 191-192.
- STRITT, W. (1960): Nachruf für **Alois Gremminger**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **19**: 115-117
- RITZI, M. (1958): Dr.rer.nat.h.c. **Josef Hauer**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **17**: 87
- KIEFER, F. (1971): Konservator Dr. **Joseph Hauer** zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 5-8.
- PEINTINGER, M. & PHILIPPI, G. (1993): **Karl Henn** † 1901-1992. - Caroleinea, **51**: 159-160.
- HOENES, D. (1952): **Ludwig Hirsch** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 65-68.
- OBERDORFER, E. (1964): Herrn Professor Dr. **Johann Hruby** zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **23**: 3-5.
- ROESLER, R. U., TOBIEN, H. & MAYER, G. (1977): **Erwin Jörg** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 25-31.
- MUCKLE, R. (1951): Dr.rer.nat.h.c. **Friedrich Kiefer**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 88-89.
- EINSLE, U. (1986): **Friedrich Kiefer** † 1897-1985. - Caroleinea, **44**: 182-183.
- BÜRCELIN, H. (1937): **Andreas Kneucker**. Ein Lebensbild zu seinem 75. Geburtstag. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **2**: 3-15.
- BÜRCELIN, H. (1949): Prof. **Andreas Kneucker** zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 13-15.
- JÖRG, E. (1976): **Helmut Knipper** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 5-6.
- KLUTH, C. (1972): **Adolph Knop** (1828-1893). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 171-177
- EBERT, G. & TRUNKÓ, L. (1977): **Hans W. Kesenheimer** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 33-34.
- EBERT, G. (1977): **Rudolph Künnert** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 43-44.
- STRITT, W. (1954): **Hermann Leininger** zum Gedächtnis. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **13**: 67-70.
- MONTFORT, F. (1971): **Hermann Lienig** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 169-170.
- MÄLZER, H. (1965): Professor Dr.-Ing. **Heinrich Merkel** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 125-126.
- BECK, L. & RIETSCHEL, S. (1994): **Eduard Mayer** † 1928-1993. - Caroleinea, **52**: 151-152.
- VOIGT, K. (1971): **Hans Nowotny** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 165-167
- EBERT, G. (1992): **Paul Pekarsky** † 1895-1989. - Caroleinea, **50**: 208.
- ANGST, R. (1985): **Hermann Pohle** †. - Caroleinea, **42**: 138.
- MACHULE, M. (1967): Dem Gedächtnis des Lichenologen **Erich Putzler**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **26**: 75.
- EBERT, G. (1969): **Gustav Reich** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 79.
- ROESLER, R. U. (1977): Kommerzrat **Hans Reisser** und sein entomologisches Lebenswerk. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 36-42.
- MÜLLER, G. (1980): **Max Ritzi** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 181-182.
- EBERT, G. (1992): **Walter Rössler** † 1908-1991. - Caroleinea, **50**: 207
- RIETSCHEL, S. (1982): In memoriam **Wilhelm Schäfer**. - Caroleinea, **40**: 125-126.
- MÄGDEFRAU, K. (1968): **Karl Friedrich Schimper**. Ein Gedenken zu seinem 100. Todestag. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 3-20.
- SANDERS, A. P. M. (1973): **Karl Friedrich Schimpers** letzte Monate (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae 37). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **32**: 205-218.
- GÖTZ, H. (1980): **Wilhelm Philipp Schimper** und **Karl Friedrich Schimper** - zwei Naturforscher am Oberrhein. Zum 100. Todestag **Wilhelm Philipp Schimpers**. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 19-35.
- PHILIPPI, G. (1986): **Josef Schmithüsen** †. - Caroleinea, **44**: 183-184.
- OBERDORFER, E. (1953): **Hermann Schurhammer** † 1881-1952. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **12**: 1-3.
- AUERBACH, M. (1949): Prof. Dr. **Max Schwarzmann** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **8** (1943/49): 10-13.
- ANGST, R. (1980): **Kurt Silber** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **39**: 183-185.
- KÜHLWEIN, H. & OBEDORFER, E. (1957): **Paul Stricker** zum Gedächtnis 22.9.1878-24.12.1956. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **16**: 3-4.
- EBERT, G. (1976): **Walter Stritt** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 7-8.
- EBERT, G. (1974): **Karl Strobel** †. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 7-8.
- ROTHAUSEN, K. (1991): **Heinz Tobien** 80 Jahre - Höwenegg Forschung 53 Jahre. - Andrias, **8**: 5-12.

## 6. Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

### Geschichte

- HAUER, J. (1951): Die Bad. Landessammlungen für Naturkunde im Wiederaufbau. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **10**: 90-95.
- MAYER, G. (1972): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe IV. Die Evakuierung d. Naturalienkabinetts, Aufenthalt C.C.Gmelins in Erlangen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **31**: 161-169.
- MAYER, G. (1973): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe V. Akquisition der Naturalienkabinette zu Meersburg (1803) u. Sankt Blasien (1807). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 195-203.
- MAYER, G. (1974): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe VI. Carl Christian Gmelins Spanienreise im Jahre 1789. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **33**: 233-252.
- MAYER, G. (1977): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe VII. Eine Paris-Reise Carl Christian Gmelins im Jahre 1810 und dessen Beziehungen zu gelehrten Gärtnern, Naturalienhändlern und Besuchern dieser Stadt. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **36**: 45-50.
- MAYER, G. (1977): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe VIII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1838. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **36**: 51-60.
- MAYER, G. (1978): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe X. Das Naturalienkabinett des Erbprinzen Friedrich (1708 bis 1732). - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **37**: 31-36.
- MAYER, G. (1979): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe XI. Pfarrer L. G. Scriba, Korrespondent und Naturalienlieferant der Markgräfin Caroline Luise von Baden 1768-1782. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **38**: 5-10.
- MAYER, G. (1980): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe XII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1858. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **39**: 11-18.
- MAYER, G. (1982): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen f. Naturkunde in Karlsruhe XIII. Von Dienern und Präparatoren des Naturalienkabinetts. - Carolinea, **40**: 113-124.
- MAYER, G. (1983): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen f. Naturkunde in Karlsruhe XIV. Custos Dr. C. Hilger u. das Naturalienkabinett unter seiner Leitung 1894-1899. - Carolinea, **41**: 142-150.
- OBERDORFER, E. (1951): Zweihundert Jahre Landessammlungen für Naturkunde. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **10**: 69-74.
- OBERDORFER, E. (1966): Zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde und des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **25**: 105-117.
- RIETSCHEL, S. (1980): Museum am Friedrichsplatz. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **39**: 5-9.
- RIETSCHEL, S. (1986): 1785-1985: Das Museum am Friedrichsplatz begeht sein 200jähriges Bestehen. - Carolinea, **44**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1989): „Staatliches Museum“ statt „Landessammlungen“ - Carolinea, **47**: 5-6.

- RIETSCHEL, S. (1992): Vor fünfzig Jahren. - Carolinea, **50**: 5-8.
- RITZI, M. (1949): Die Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe während und nach dem Kriege. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **8** (1943/49): 16-18.
- SCHILLINGER, F. (1973): Das Gebäude der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 21-29.

### Tätigkeitsberichte

- (1956): Die Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe in den Jahren 1954/56. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **15**: 67-74.
- (1960): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1957-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **19**: 118-129.
- (1965): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1961-1964. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **24**: 3-16.
- (1970): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1965-1969. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **29**: 3-15.
- (1973): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1970-1972. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **32**: 5-19.
- (1977): Die Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe in den Jahren 1973-1976. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **36**: 5-24.
- AUERBACH, M. (1937): Die badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **2**: 16-21.
- HAUER, J., JÖRG, E. & OBERDORFER, E. (1953): Die Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe in den Jahren 1952/53. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **12**: 128-133.

### Bibliothek

- RIETSCHEL, S. (1981): andrias - eine neue wissenschaftliche Zeitschrift. - Andrias, **1**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1982): carolinea - zum Geleit. - Carolinea, **40**: 5-8.
- RITZI, M. (1952): Verzeichnis der Tauschzeitschriften nach dem Stand vom 1. Oktober 1952. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **11**: 122-129.
- VERHAAGH, M. & FRANKE, U. (1993): Die Bibliothek des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe I. - Carolinea, **51**: 125-128.

### Sammlungen

- EBERT, G. (1964): Die Macrolepidopteren-Sammlungen der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe und ihre Neugestaltung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdWdtl., **23**: 87-106.
- EBERT, G. (1977): Die Macrolepidopteren-Sammlung der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe und ihre Neuge-

- staltung (2. Teil). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 247-260.
- EBERT, G. (1996): Die Sammlung Dr. med Otto Engelhardt. - *Carolinea*, **54**: 195.
- EBERT, G. (1996): Dr. Rupprecht Bender (1905-1993) und seine Sammlung. - *Carolinea*, **54**: 196.
- FRANKE, U. (1989): Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. Friedrich Kiefer. - *Carolinea*, Beih., **5**: 3-433.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1989): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe - Teil I. - *Carolinea*, **47**: 117-132.
- HÄUSSLER, U. & BRAUN, M. (1991): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe - Teil II: Plecotus. - *Carolinea*, **49**: 101-114.
- KORMANN, K. (1965): Libellensammlung nach modernen Gesichtspunkten (Odonata). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 189-191.
- RIETSCHEL, S. (1993): Gibt es eine Renaissance der naturkundlichen Sammlungen?. - *Carolinea*, **51**: 5-8.
- TRUNKÓ, L. (1983): Aufbau einer Aufschlußkartei in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. - *Carolinea*, **41**: 139-141.

## Ausstellungen und Vivarium

- AMSEL, H. G. (1965): Neue Prinzipien bei der Gestaltung entomologischer Schausammlungen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 105-110.
- ANGST, R. (1986): Das Gemälde „Elefanten flüchten vor eine Steppenbrand“ von Wilhelm Kuhnert im Museum am Friedrichsplatz in Karlsruhe. - *Carolinea*, **44**: 173-176.
- BRAUN, M. (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **43**: 129-132.
- MAYER, E. & BECK, L. (1983): Schlangennachzuchten im Vivarium 1982. - *Carolinea*, **41**: 137-139.
- OBERDORFER, E. (1962): Zur Eröffnung des neu eingerichteten Vivariums u. der neuen Schausäle mit den Tertiärfunden von Höwenegg sowie Tiergruppen der Heimat in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe am 23. März 1962. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **21**: 83-86.
- RIETSCHEL, S. (1983): Besucherstatistik im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **41**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1986): Eine große Seirocrinus-Platte im Museum am Friedrichsplatz. - *Carolinea*, **44**: 176-178.
- RIETSCHEL, S. (1993): Gibt es eine Renaissance der naturkundlichen Sammlungen?. - *Carolinea*, **51**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1996): Die Darstellung gegenwärtiger und historischer Landschaften im Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **54**: 5-8.
- RITZI, M. (1951): Ein Beitrag zur Ausstellungstechnik im naturwissenschaftlichen Museum. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 95-101.

## MUSEALES

- BECK, L. (1990): Bodenzoologie und Taxonomie in Karlsruhe. - *Andrias*, **7**: 5-8.
- BECK, L. (1991): Zoologische Systematik - Forschung an einem Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **49**: 5-8.
- BECK, L., HÖFER, H. & VERHAAGH, M. (1994): Tropische Diversität, ihre Aufrechterhaltung und deren Mechanismen. - *Andrias*, **13**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1985): Arten-, Natur- und Umweltschutz als Problemkreis für das Naturkundemuseum. - *Carolinea*, **42**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1990): Forschung an den Naturkundemuseen. - *Carolinea*, **48**: 5-6.
- RIETSCHEL, S. (1993): Gibt es eine Renaissance der naturkundlichen Sammlungen?. - *Carolinea*, **51**: 5-8.
- RIETSCHEL, S. (1997): Der Beitrag der Naturkundemuseen zum Artenschutz. - *Carolinea*, **55**: 121-123.

## 7. Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe

### Geschichte

- (1951): Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe nach dem Stand vom 1. 5. 1951. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 64-68.
- (1972): Mitgliederverzeichnis des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. (Stand 1. 7. 1972). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 187-199.
- HAUER, J. (1939): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins in den Jahren 1935-1939. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **4**: I-VI.
- HENNINGER, G. (1951): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1946-1950. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **10**: 62-64.
- OBERDORFER, E. (1952): Über hundert Jahre Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **11**: 59-62.
- OBERDORFER, E. (1966): Zur Geschichte der Badischen Landdessammlungen für Naturkunde und des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **25**: 105-117
- RITZI, M. (1955): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. in den Jahren 1951-1955. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **14**: 132-134.
- RITZI, M. (1961): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1955-1960. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **20**: 3-5.
- RITZI, M. (1965): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. in den Jahren 1961-1965. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **24**: 119-121.
- RITZI, M. (1968): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1965-1968. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 119-121.
- RITZI, M. (1972): Bericht über die Tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe in den Jahren 1968 bis 1971. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 179-181.
- EBERT, G. (1978): Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **37**: 217-218.
- EBERT, G. & LUSSI, H. G. (1970): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 91-94.
- EBERT, G. & MÜLLER, G. (1968): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen und der Ornithologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **27**: 51-53.
- EBERT, G. & MÜLLER, G. (1972): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen und der Ornithologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 183-185.
- MÜLLER, G. (1972): Aus der Ornithologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 184-185.
- WALLNER, M. & BAISCH, G. (1969): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 133-134.

### Berichte der Arbeitsgruppen

- BAISCH, G. (1970): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **29**: 161-162.
- EBERT, G. (1969): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **28**: 77-78.
- EBERT, G. (1971): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **30**: 85-86.
- EBERT, G. (1972): Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **31**: 183-184.
- EBERT, G. (1974): Kleine Mitteilungen. Aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **33**: 253-254.
- EBERT, G. (1976): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **35**: 189-191.
- EBERT, G. (1977): Kleine Mitteilungen aus der Entomologischen Arbeitsgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., **36**: 261-262.

## 8. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe

LOEHNERT-BALDERMANN, E., SEVERIN, I. & WOLF, R. (1993):

1992: 14 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **51**: 129-158.

SEVERIN, I. & WOLF, R. (1989): 1987 und 1988: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **47**: 162-190.

SEVERIN, I. & WOLF, R. (1990): 1989: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **48**: 155-176.

SEVERIN, I. & WOLF, R. (1991): 1990: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **49**: 139-168.

WOLF, R. (1988): Organisation und Arbeit der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL). - *Carolinea*, **46**: 153-160.

WOLF, R. (1997): 70 Jahre Naturschutz in Baden. Aus der Geschichte der BNL Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 147-152.

WOLF, R. & LOEHNERT-BALDERMANN, E. (1992): 1991: 12 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **50**: 177-206.

WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1994): 1993: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **52**: 123-150.

WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1995): 1994: 11 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **53**: 263-288.

WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1996): 1995: 9 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **54**: 197-216.

WOLF, R., LÖSING, J. & SEVERIN, I. (1997): 1996: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - *Carolinea*, **55**: 125-146.

## 9. Museumsführer und sonstige Schriften des Museums

### Führer zu Ausstellungen – Museum am Friedrichsplatz

1. Beck, Ludwig: Das Vivarium 3. Aufl. (1983): 1-48, 17 Abb. ISBN 3-925631-00-3
2. Beck, Ludwig: Lurche und Kriechtiere S.1-48, 40 Abb.
3. Angst, Ralf: Ursprung des Menschen 4. Aufl. (1988): 1-55, 113 Abb. ISBN 3-925631-06-2
4. Drachen (1980): 1-143, 120 Abb.
5. Trunkó, László & Gall, Bernd: Waldsterben (1984): 1-48, 45 Abb. ISBN 3-925631-02-X
6. Rietschel, Siegfried; Trunkó, László; Weissbrodt, Werner: Südbadische Fossilfunde (1985): 1-46, 76 Abb. ISBN 3-925631-04-6
7. Bischoff, Wolf-Dietrich; Dettmer, Rainer; Wächtler, Klaus: Die Flußperlmuschel (1986): 1-64, 41 Abb. ISBN 3-925538-01-1
8. Verhaagh, Manfred: Panguana (1986): 1-48, 46 Abb. ISBN 3-925631-05-4
9. 50 Jahre Vivarium (1988): 1-48, 43 Abb. ISBN 3-925631-07-0
10. Bohn, Barbara; Braun, Monika; Weick, Friedhelm: Was draußen flattert, springt und schwimmt (1991): 1-47, ISBN 3-925631-08-9
11. Mahler, Ulrich; Weick, Friedhelm: Der Weißstorch (1994): 1-48, 45 Abb.
12. Braun, Monika; Weick, Friedhelm: Fledermäuse brauchen Freunde (1994): 1-48, 61 Abb., ISBN 3-925631-09-7
13. Vivarium (1995): 1-48, 6 Taf., 57 Abb., ISBN 3-925631-10-

### Geschichte

Vom Naturalienkabinett zum Naturkundemuseum 1785-1985 – Geschichte der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe (Rietschel S., Trunko L., Angst R., Ebert G., Philipp G., 1985): 1-84, 54 Abb. - ISBN 3-925631-03-8

## Publikationen des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

### carolinea, Beihefte

Monografische Arbeiten, Kataloge, Themenbände etc., in unregelmäßiger Folge

- |  |         |
|--|---------|
| 5. U. FRANKE: Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. F. KIEFER. – 433 S., 2 Abb.; 1989  | DM 36,- |
| 6. R. WOLF & F.-G. LINK: Der Füllmenbacher Hofberg – ein Rest historischer Weinberglandschaft im westlichen Stromberg – 84 S., 35 Abb., teilw. farb.; 1990                   | DM 20,- |
| 7. Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen in Zeitschriften des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe 1936 - 1997. – 119 S.; 1999                                    | DM 7,-  |
| 8. E. FREY & B. HERKNER (Eds.): Artbegriff versus Evolutionstheorie? – 86 S., 3 Abb.; 1993   | DM 15,- |
| 9. P. HAVELKA: Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten – eine Aufgabe des Naturschutzes. – 64 S., 75 Farbabb.; 1995                        | DM 20,- |
| 10. R. HECKMANN: Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). – 146 S., 25 Karten; 1996 | DM 25,- |
| 11. D. HAAS, P. HAVELKA & H.-W. MITTMANN: Neusiedler in menschlichen Siedlungen: Wasservogel auf städtischen Gewässern. – 84 S., 137 Farbabb.; 1998                          | DM 10,- |
| 12. M. R. SCHEURIG, P. HAVELKA & H.-W. MITTMANN: Brutvogel-Monitoring Baden-Württemberg 1992-1998. – 203 S., 12 Abb.; 1998   | DM 10,- |
| 13. B. HERKNER: Über die evolutionäre Entstehung des tetrapoden Lokomotionsapparates der Landwirbeltiere. – 353 S., 105 Abb.; 1999   | DM 30,- |

### carolinea

setzt mit Band 40 die von 1936 bis 1980 mit 39 Bänden erschienenen „Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland“ fort. Jahressbände mit naturkundlichen Arbeiten und Mitteilungen aus dem südwestdeutschen Raum und aus dem Museum am Friedrichsplatz in allgemeinverständlicher Form.

- |   |         |
|---|---------|
| Band 50: 208 S., 97 Abb., 5 Farbtaf.; 1992  | DM 60,- |
| Band 51: 160 S., 76 Abb.; 1993              | DM 50,- |
| Band 52: 152 S., 68 Abb., 2 Farbtaf.; 1994  | DM 50,- |
| Band 53: 288 S., 127 Abb., 8 Farbtaf.; 1995 | DM 80,- |
| Band 54: 216 S., 129 Abb., 8 Farbtaf.; 1996 | DM 65,- |
| Band 55: 152 S., 90 Abb., 8 Farbtaf.; 1997  | DM 60,- |
| Band 56: 144 S., 34 Abb., 8 Farbtaf.; 1998  | DM 50,- |

### andrias

unregelmäßig erscheinende Einzelbände zu Themen aus naturkundlichen Forschungsgebieten

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 102 S., 37 Abb.; 1981                      | DM 34,- |
| 2. Vegetationskunde und Lichenologie. – 64 S., 17 Abb.; 1983                              | DM 28,- |
| 3. Morphologie und Taxonomie von Insekten. – 104 S., 172 Abb.; 1983                       | DM 40,- |
| 4. Fossilfundstätte Messel. – 171 S., 49 Abb., 17 Taf.; 1985                              | DM 60,- |
| 5. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 224 S., 114 Abb.; 1986                     | DM 65,- |
| 6. Fossilfundstätte Höwenegg. – 128 S., 96 Abb., 6 Taf., 1 Falttaf.; 1989                 | DM 56,- |
| 7. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 172 S., 79 Abb.; 1990                      | DM 52,- |
| 8. Fossilfundstätte Höwenegg. – 64 S., 30 Abb.; 1991                                      | DM 28,- |
| 9. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 210 S., 127 Abb.; 1992                     | DM 60,- |
| 10. Fossilfundstätte Höwenegg. – 230 S., 192 Abb.; 1997                                   | DM 80,- |
| 11. Taxonomie und Phylogenie von Nematoden. – 90 S., 24 Abb., 81 Taf.; 1993               | DM 52,- |
| 12. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 94 S., 48 Abb.; 1994                      | DM 30,- |
| 13. Taxonomie und Ökologie tropischer Invertebraten. – 224 S., 82 Abb., 16 Farbtaf.; 1994 | DM 70,- |

Bestellungen an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe – Bibliothek-, Erbprinzenstr. 13, D-76133 Karlsruhe.

Zu den angegebenen Preisen wird bei Versand ein Betrag von DM 3,50 für Porto und Verpackung in Rechnung gestellt. Bestellungen unter DM 20,- nur gegen Vorkasse.

Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. erhalten auf die Zeitschriften andrias und carolinea, auf die Beihefte und auf ältere Bände der „Beiträge“ einen Rabatt von 30%.