

B10 I 90,128/Beih. 10

Beiheft 10

RALF HECKMANN:

**Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg
in der Sammlung des Staatlichen Museums für
Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera)**

carolinea

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 31. 10. 1996

Beiheft 10

RALF HECKMANN:

**Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg
in der Sammlung des Staatlichen Museums für
Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera)**

carolinea

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 31. 10. 1996

carolinea, Beiheft 10	146 S.	25 Karten	Karlsruhe, 31. 10. 1996
-----------------------	--------	-----------	-------------------------

Adresse für Anfragen:
Staatliches Museum für Naturkunde
Postfach 62 09
D-76042 Karlsruhe
Fax: 07 21/175-21 10, Tel.: 07 21/175-21 61

BIO I 90,128/Beiheft,10

Inv. 1997/1735

ISSN 0176-4004

Herausgeber: Prof. Dr. S. RIETSCHEL,
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe
Dipl.-Geogr. R. WOLF, Bezirksstelle für
Naturschutz und Landschaftspflege
Prof. Dr. G. PHILIPPI, Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe
Gesamtherstellung: TextBild GmbH, Karlsruhe
© Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe
Postfach 6209, D-76042 Karlsruhe

Inhalt

	Kurzfassung	5
	Abstract	5
1.	Einleitung	6
2.	Die Wanzensammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (SMNK)	8
3.	Faunistik und Biogeographie	15
3.1	Geographische Verteilung der Funde auf die Landkreise	15
3.2	Wanzenfamilien und Ökologie	16
3.3	In der Sammlung des SMNK fehlende Arten	17
3.4	Zur Verbreitung besonderer Arten	18
4.	Taxonomische Bemerkungen zu einigen Arten	21
5.	Artenlisten herausragender Fundorte	23
5.1	Flugsanddünen bei Sandhausen	23
5.2	„NSG Michaelsberg“ bei Untergrombach	23
5.3	Turmberg in Karlsruhe-Durlach	24
5.4	„NSG Scheibenberg“ nördlich Hörden bei Gaggenau	26
5.5	Bienenbuckel bei Oberachern	26
5.6	Kaiserstuhl	27
5.7	„NSG Isteiner Klotz“	33
5.8	„NSG Wildseemoor“ bei Wildbad	37
5.9	Wutachschlucht im Südschwarzwald	38
5.10	Spitzberg bei Tübingen	38
6.	Gesamtartenliste	39
	Dipsocoridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae, Notonectidae, Corixidae	40
	Hebridae, Hydrometridae	41
	Veliidae, Gerridae	42
	Saldidae	44
	Tingidae	45
	Microphysidae, Miridae	48
	Nabidae	78
	Anthocoridae	81
	Lyctocoridae, Cimicidae	84
	Reduviidae	84
	Aradidae	85
	Piesmatidae	86
	Berytidae	86
	Lygaeidae	87
	Pyrrhocoridae	106
	Stenocephalidae	107
	Coreidae	108
	Alydidae	113
	Rhopalidae	114
	Plataspidae	117

	Cydnidae	117
	Thyreocoridae	121
	Scutelleridae	122
	Pentatomidae	124
	Acanthosomatidae	139
	Unklare Arten	140
7	Literatur	141

RALF HECKMANN

Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera)

Kurzfassung

1. Die Ergebnisse der Neubearbeitung der Wanzensammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe werden dargestellt.
2. Für 484 Heteropterenarten werden Verbreitungsangaben für Baden-Württemberg gegeben, bei selteneren Arten werden ihre Biogeographie und Ökologie diskutiert und für 20 Arten Verbreitungskarten erstellt.
3. Sechs Arten sind neu für Baden-Württemberg: *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schäffer, 1835), *Atomoscelis onustus* (Fieber, 1861), *Conostethus roseus* (Fallén, 1829) *Piesma quadratum* (Fieber, 1844), *Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1853) und *Trapezonotus ullrichi* (Fieber, 1836).
4. Artenlisten werden gegeben für das „NSG Michaelsberg“ bei Untergrombach, den Turmberg in Karlsruhe, das „NSG Scheibenberg“ bei Gernsbach im Murgtal, den „Bienenbuckel“ bei Oberachern, den Kaiserstuhl, den Isteiner Klotz und das „NSG Wildseemoor“ bei Wildbad im Schwarzwald. Die Artenlisten der Flugsanddünen bei Sandhausen, des Tübinger Spitzberges und der Wutachschlucht werden ergänzt.

Abstract

1. The results of the revision of the collection of Heteroptera in the State Museum of Natural History Karlsruhe (Baden-Württemberg) are presented.
2. Facts about the distribution of 484 species of Heteroptera in Baden-Württemberg are given. Biogeography and ecology are discussed referring to the rarer species, 20 of them are mapped.
3. Six species are recorded for the first time in Baden-Württemberg: *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schäffer, 1835), *Atomoscelis onustus* (Fieber, 1861), *Conostethus roseus* (Fallén, 1829), *Piesma quadratum* (Fieber, 1844), *Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1853) and *Trapezonotus ullrichi* (Fieber, 1836).
4. Lists of species are given for the „NSG Michaelsberg“ near Untergrombach the „Turmberg“ in Karlsruhe, for the „NSG Scheibenberg“ near Gaggenau (valley of the Murg) the „Bienenbuckel“ near Oberachern the Kaiserstuhl (near Freiburg) the Isteiner Klotz (near Lörrach) and for the „NSG Wildseemoor“ near Wildbad in the black forest. New records are added to the lists of species of the wind-borne sanddunes near Sandhausen, „NSG Spitzberg“ near Tübingen and the „Wutachschlucht“

Autor

Dipl.-Biol. Ralf Heckmann, Brandenburger Straße 30, D-78467 Konstanz

1. Einleitung

Obwohl inzwischen weit über 100 Arbeiten veröffentlicht sind, die Beiträge zur Verbreitung von Wanzen in Baden-Württemberg liefern, gibt es dennoch deutliche Lücken in den Lokalfaunen sowie in den Verbreitungsangaben häufiger Arten. Weite Gebiete des mittleren Schwarzwaldes und der daran angrenzenden Oberrheinebene sowie der gesamte Hochrhein mit dem angrenzenden Südschwarzwald sind noch fast immer eine terra incognita. Nicht viel besser ist es um den nordöstlichen Teil unseres Landes bestellt – kaum etwas ist über die Wanzenfauna der Landkreise Aalen, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim bekannt. Kaum erforscht ist das Gebiet zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee, das Grenzgebiet zu Bayern sowie Teile des Kraichgaus und des Odenwaldes.

Um einen vermuteten Artenrückgang belegen zu können, sind ältere Angaben zur Verbreitung bestimmter Arten eine grundlegende Voraussetzung. Die ältere Literatur liefert dazu leider allzuoft nur eine ungenügende Grundlage. Oft sind die Angaben den Fundort betreffend zu ungenau – um einige Beispiele zu nennen: „Oberamt Ulm“ (Lampert, 1897), „Württemberg“ (Hüeber, 1891), usw.

Zusätzlich haben sich in der Systematik dieser Insektengruppe viele Änderungen ergeben, so daß ältere Meldungen oft nicht mehr einfach übernommen werden können, da frühere Arten inzwischen in mehrere aufgespalten wurden und Artabgrenzungen durch die inzwischen erfolgte Beschreibung der Genitalien völlig anders vorgenommen werden.

Allzuoft ist durch zwei Kriegswirren auch das Belegmaterial verschwunden oder zumindest stark lückenhaft, so daß keine Nachprüfung mehr erfolgen kann. Bei vorhandenem Belegmaterial ist dann oft die Etikettierung ebenso unpräzise wie die betreffende Veröffentlichung.

Selbst wenn alle günstigen Umstände zusammentreffen, also eine genau etikettierte gut erhaltene Sammlung vorhanden ist, bleibt es dennoch die Ausnahme, daß eine solche Sammlung tatsächlich bearbeitet wird. So wurden Teile der Sammlung Hüeber in Ulm (Rieger, 1972 & 1974), kleinere Teile der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart (Rieger, 1985 & 1987) sowie kleinere Teile der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Voigt, 1970 & 1977c; Rieger, 1987) überprüft. Eine komplette Neubearbeitung einer Museumssammlung ist bisher noch nicht durchgeführt worden, obwohl gerade diese Belege die Grundlage für faunistisch-ökologische sowie biogeografische Forschungen sind.

Diese Arbeit liefert nun einen Beitrag zur Vermehrung unserer Kenntnis der Verbreitung der Wanzen in Baden-Württemberg. Die Fundorte liegen vor allem in Mittel- und Nordostbaden. An einigen Beispielen wird gezeigt, daß tatsächlich Arten verschwunden sind oder früher häufiger waren. Auf der anderen Seite kann auch eine Neueinwanderung von Arten belegt werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich vor allem Herrn Prof. Dr. S. Rietschel danken, der die Überarbeitung der Wanzensammlung des SMNK aus Werkvertragsmitteln ermöglicht hat, sowie für die Bereitstellung des Gästezimmers im Museum. In einer Zeit zunehmender Sparmaßnahmen die besonders den kulturellen Bereich und die „Nicht-Modedisziplinen“ der Wissenschaft betreffen, verdient es besondere Beachtung für die Auswertung dieser wenig beachteten Insektengruppe Mittel bereitzustellen.

Für die Nachprüfung und Determination von kritischen Arten, für viele wertvolle Literaturhinweise und viele persönliche Mitteilungen und vor allem für die kritische Durchsicht dieser Arbeit bin ich Herrn Dr. C. Rieger (Nürtingen) zu besonders herzlichem Dank verpflichtet, ebenso verdanke ich zu einem Großteil ihm meine Begeisterung für die Wanzen.

Herrn K. Voigt (Ettlingen) danke ich herzlichst für die genaue und kritische Durchsicht dieser Arbeit, für seine Hilfe bei der Interpretation damals gängiger Abkürzungen und für die Lokalisation zahlreicher Fundorte.

Herrn G. Strauß (Biberach) bin ich besonders dankbar für seine Bereitschaft Sonderwünsche sein Sammlungsprogramm „SOFTCOL“ bereffend zu erfüllen, sowie für seine besondere Geduld darin meine allgemeinen Fragen bezüglich der elektronischen Datenverarbeitung zu beantworten.

Herrn Dr. G. Ebert (SMNK) danke ich besonders für die nervtötende Entzifferung der oft kaum leserlichen Etiketten in Sütterlinschrift, oft auch in einem Gemisch mit lateinischen Buchstaben.

Herrn Dr. E. Frey und Herrn Dr. F. Brechtel (beide SMNK) danke ich herzlich für die Unterstützung bei der Neuaufrstellung der Sammlung.

2. Die Wanzensammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (SMNK)

Für die vorliegende Arbeit wurden insgesamt 8617 Wanzen aus einem Zeitraum von 110 Jahren von mir bestimmt, zum Teil die Genitalien zur Determination herangezogen und immer noch unklare und kritische Arten von Herrn Dr. C. Rieger überprüft. 346 Exemplare waren unetikettiert, darunter leider sehr interessante Arten, von denen nur sehr wenige Fundorte in Baden-Württemberg bekannt sind: *Sigara longipalis* Sahlb., *Macrosaldula scotica* Curt., *Leptopus marmoratus* Gz., *Acalypta gracilis* Fieb., *Acetropis gimmerthalii* Flor. *Orthocephalus vittipennis* H.-S. sowie *Orius horvathi* Reut., nur um einige dieser Arten zu nennen. Daher waren die Angaben von nur 8271 Individuen verwertbar.

In der Sammlung befinden sich 486 Arten aus Baden-Württemberg die sich auf 33 Familien und 244 Gattungen verteilen. Die Fundnachweise zweier dieser Arten (je ein Individuum) beruhen wahrscheinlich auf Fundortverwechslungen.


7019 Individuen (85 %) wurden im ehemaligen Land Baden gesammelt, 1245 Individuen (15 %) stammen aus Württemberg; 464 Arten wurden in Baden gefunden, 231 in Württemberg. Die Angaben beziehen sich auf die Grenzen nach der Verwaltungsreform 1972-74.

Eine Übersicht über die Zusammensetzung der Wanzensammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (SMNK) gibt Tab. 1, die geographische Verteilung der Funde ist in Karte 1 (Artenzahl pro 10 x 10 km UTM-Gitterquadrant in Größenklassen) dar-

Tabelle 1. Zusammensetzung der Sammlung. In der Tabelle berücksichtigt sind nur die für die Wanzensammlung (SMNK) wichtigsten Sammler, die Summen ergeben daher nicht den „SMNK-Wert“

Die ersten Daten in der Zeitraum-Spalte bezeichnen den jeweils ersten und letzten Fund des Sammlers, die Daten in Klammern den Hauptsammelzeitraum. Datensatz bedeutet: verschiedener Fundort oder/und Datum. Die Anzahl der Männchen (MM), Weibchen (WW) und der Larven ergibt nicht die Gesamtanzahl, da bei manchen Tieren nicht das Geschlecht bestimmt werden konnte (z. B. fehlendes Abdomen). Auch die beiden umstrittenen Arten sind in die Tabellen aufgenommen.

Amsel (10)	Hassler (62)	Nowotny = NOW.	Speidel (1)				
Balles = BAL.	Hauer (1)	G. Outin (6)	M. Wallner (17)				
F. Brechtel (1)	Hederich (2)	Rabe (2)	Walther (1)				
G. Ebert (9)	Hohndorf (34)	Reiff (1)	P. Westrich (6)				
K. Eidel (1)	Kesenheimer (3) = KES.	E. Rettich (1)	Wlk. (4)				
Falkner (5)	Kneucker (6)	C. Rieger (2)	Wilke (1)				
E. Frey (20)	Kormann (31)	Ritzi (1)	Zimber (3)				
Friedmann (1)	H. Lienig (1)	Roesler (1)	Zöller (1)				
Gremminger (6)	Müller (22)	Roewer (2)	M. Zwecker (1)				
Handlirsch (1)	O. Müller (1)	Rosenbohm (1)					
Sammlung	Zeitraum	Datensätze	Arten	Anzahl	MM	WW	Larven
SMNK	1883-1993	4733	486	8271	3597	4602	40
H. Nowotny	1936-1969 (1946-1965)	1648	358	3469	1563	1884	16
Balles	1921-1957 (1931-1950)	1428	288	2033	874	1153	0
L. Fischer	1889-1910 (1898-1900)	554	213	938	371	558	1
Leininger	1919-1953 (1921-1938)	435	112	714	312	393	5
Becker	1920-1948 (1926-1941)	186	75	322	128	188	1
Kußmaul	1986-1988	170	75	260	108	147	4
Frentzen	1919-1938 (1922-1929)	92	45	129	65	62	0
W. Stritt	1934-1963 (1934-1938)	71	34	94	43	50	0




9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Karte 1. Herkunft der in Baden-Württemberg gefundenen Heteropteren-Arten in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe. Summe der Arten pro UTM-Gitter.


gestellt. In den Karten 2 bis 5 ist die Verteilung der Funde in den 4 größten Teilsammlungen dargestellt.

Eine erste Bearbeitung der Sammlung wurde in den 80-iger Jahren im Rahmen eines Volontariats versucht, beschränkte sich jedoch ausschließlich auf die Pentatomoidea,



Karte 2. Herkunft der in Baden-Württemberg gefundenen Heteropteren-Arten in der Coll. L. FISCHER im SMNK. Summe der Arten pro UTM-Gitter.


wobei kritische Arten ausgeklammert wurden und einige Fehldeterminationen aufgetreten sind. Die Ergebnisse dieser Bearbeitung wurden nicht veröffentlicht. Den Grundstock des Bestandes bildet die Sammlung L. Fischer, die zum Teil aus den Funden von Meess (1900 & 1907) besteht. Die Meess'sche Originalbezeichnung an den Präpa-



9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1


Karte 3. Herkunft der in Baden-Württemberg gefundenen Heteropteren-Arten in der Coll. F. LEININGER im SMNK. Summe der Arten pro UTM-Gitter.

raten ist entfernt, und es ist nur noch Fundort, Funddatum und coll. Fischer angegeben. In der Artenliste dieser Arbeit wird anhand von Fundort und -datum rekonstruiert, welche Funde von Meess (1900 & 1907) bereits veröffentlicht wurden. Aus der Arbeit von Meess (1900) die 671 badische Fundortangaben (Datensätze) liefert, konnten die Belege von 267



Karte 4. Herkunft der in Baden-Württemberg gefundenen Heteropteren-Arten in der Coll. BALLEs im SMNK. Summe der Arten pro UTM-Gitter.

Angaben (40 %) in der SMNK gefunden werden, viel schlechter dagegen war die Bilanz für die Veröffentlichung von Meess (1907), hier konnten die Belege von nur 59 (11 %) von 533 badischen Fundortangaben gefunden werden. Andererseits sind in der SMNK 233 Belege von Fundortmeldungen vorhanden, die Meess nicht veröffentlicht hat. Ein weiterer Hinweis



Karte 5. Herkunft der in Baden-Württemberg gefundenen Heteropteren-Arten in der Coll. NOWOTNY im SMNK. Summe der Arten pro UTM-Gitter.

für die Durchmischung der Sammlungen Meess und Fischer liegt darin, daß viele Belege der Angaben in den Meess'schen Arbeiten „Fischer leg.“ betreffend verschwunden sind und andererseits viele Belege der von Meess selber gesammelten Tiere vorhanden sind. Ein weiterer Anteil der Meess'schen Belege ist wohl auch in dem unbezetteltem Material

zu suchen, da viele der in diesen Veröffentlichungen genannten Arten (s.o.) in der SMNK vorhanden sind. Der Rest der Sammlungen Meess und Fischer scheint verschollen zu sein. Die Tiere in dieser Teilsammlung sind relativ schlecht präpariert aber noch in sehr gutem Erhaltungszustand, die Belege stammen von wenigen Fundorten, die relativ gut untersucht wurden (Karte 2).

Eine erste Erweiterung erfuhr die Sammlung in den 20-iger Jahren durch die Sammeltätigkeit der Herren Leininger, Becker und Frentzen. Auch diese Exemplare sind schlecht präpariert aber in gutem Erhaltungszustand. Die Sammelstrategie war hier entgegengesetzt: an vielen Orten wurden ein paar Tiere mitgenommen (Karte 3). So finden sich in diesen Teilsammlungen vornehmlich „größere Allerweltsarten“ die rasch aufgesammelt werden konnten.

Eine Verdreifachung der Individuenzahl erfuhr der Sammlungsbestand durch den Ankauf der Sammlungen Balles und Nowotny. Es ist hier das Verdienst von Herrn K. Voigt, daß diese Sammlungen in Baden geblieben sind (Coll. Nowotny), oder wieder zurückgeholt werden konnten (Coll. Balles).

Die Sammlung Balles ist zum Großteil sehr gut präpariert, teilweise aber in schlechtem Erhaltungszustand. Besonders bei den Miriden sind oft Fühler und Beine abgebrochen, so daß eine Determination oft nicht mehr möglich war. In dieser Sammlung finden sich keine aquatischen Wanzen. Balles hat an sehr wenigen Orten intensiv gesammelt (Karte 4), erfreulicherweise in Gebieten, aus denen bisher keine Funddaten von Wanzen vorlagen. H. Fischer (1961) erwähnt diese Sammlung als aus 8000 Exemplaren bestehend in seiner Obhut. In der SMNK waren etwa 2800 Individuen auffindbar, davon 2033 aus Baden-Württemberg. Die Tiere mit badischem Fundort wurden damals auf Bestreben von Herrn K. Voigt durch Herrn Fischer im Museum Augsburg aussortiert und nach Karlsruhe gebracht. Die Sammlung Nowotny ist gut präpariert und die Tiere sind zum Großteil vollständig erhalten. Da er aus Geldmangel jedoch seine Sammlung in Zigarrenkisten aufbewahrte, hatte er seine Belege reichlich mit DDT bestreut, welches sich bei vielen Exemplaren mit dem inzwischen ausgeschwitzten Fett zu einer braunen Kruste um die Tiere legte. Zur Determination mußten teilweise die Bestimmungsmerkmale freigekratzt oder die Tiere in Lösungsmittel entfettet werden. Die Sammelstrategie war ebenfalls die, an wenigen Stellen intensiv zu suchen (Karte 5). Aus den beiden letztgenannten Sammlungen wurden bereits einige interessante Funde vorab veröffentlicht (Rieger, 1987; Günther, Rieger & Burghardt, 1982; Voigt, 1970, 1977 b & 1977 c). In der Artenliste wurden die bereits veröffentlichten Funde mit der Literaturstelle zitiert.

Die letzte Erweiterung erfuhr die Sammlung durch die als Volontärin angestellte Frau Kußmaul, die zusammen mit den Herren Hassler und Wallner vor allem in der Umgebung von Karlsruhe Aufsammlungen durchgeführt hat. Auch hier sind die Tiere schlecht präpariert, jedoch in gutem Erhaltungszustand.

Von vielen weiteren Sammlern befindet sich Belegmaterial aus Baden-Württemberg im SMNK. Es ist in Tab. 1 (s. Seite 8) aufgelistet (die Abk. Wik. war nicht mehr zuzuordnen) – Anzahl der Datensätze in Klammern, dahinter die in der Artenliste verwendete Abkürzung.

3. Faunistik und Biogeographie

3.1 Geographische Verteilung der Funde auf die Landkreise

Zur weiteren Dokumentation wurde aus den in der SMNK vorhandenen Daten eine Aufteilung der Funde auf die verschiedenen Landkreise und die beiden Landesteile (nach der Verwaltungsreform 1972-74) durchgeführt (Tab. 2). Am besten untersucht ist der LK Karlsruhe gefolgt vom Ortenau- und dem Hohenlohekreis. Aus den anderen Landkreisen ist sicher eine Artenzahl in ähnlicher Höhe wie für Karlsruhe zu erwarten, d. h. nur der LK Karlsruhe ist in bezug auf die Wanzenfauna einigermaßen gut untersucht. Auch aus Baden ist sicher noch eine viel höhere Artenzahl zu erwarten. Aus Baden-Württemberg sind mit den 6 Neunachweisen aus dieser Untersuchung bisher 690 Arten bekannt geworden, 16 weitere Meldungen beruhen sehr wahrscheinlich auf Fehldeterminationen und Fundortverwechslungen (Rieger, persönl. Mitteilung). Wie in anderen Wanzensammlungen ergibt sich ein deutlicher Trend auf das Überwiegen des weiblichen Geschlechtes; bei meiner eigenen Sammlung (5692 Exemplare aus Baden-Württemberg) beträgt die Ratio WW/MM 1,09.

Tabelle 2. Verteilung der im SMNK vorhandenen Funde auf Landkreise und Landesteile.

Auch die beiden umstrittenen Arten sind in die Tabellen aufgenommen, die Landkreise SHA und SIG sind nicht aufgelistet, da dort jeweils nur ein Tier gesammelt wurde (für „Württemberg gesamt“ wurden sie mitgezählt). Die Landkreise BC, FN, HN, KÜN, LB, TBB und UL gehören zu Württemberg („Wü“).

Landkreis	Arten	Familien	Tiere (N)	MM	WW	WW/MM
KA	332	33	3380	1474	1859	1,26
OG	199	22	812	369	441	1,20
KÜN (Wü)	174	21	895	388	504	1,30
FR	148	21	520	209	307	1,47
RA	118	19	432	189	242	1,28
HD	116	19	450	206	244	1,18
MOS	110	15	266	104	161	1,55
LB (Wü)	83	17	179	93	86	0,92
CW	61	12	206	78	125	1,60
FDS	46	9	141	56	83	1,48
WT	45	12	165	76	86	1,13
KN	42	10	163	65	98	1,51
PF	38	13	53	24	29	1,21
MA	34	9	70	25	44	1,76
LÖ	33	11	99	43	56	1,30
EM	33	9	95	45	49	1,09
BAD	30	8	97	43	53	1,23
UL (Wü)	29	8	54	24	30	1,25
TBB (Wü)	23	8	45	16	29	1,81
VS	20	10	48	23	25	1,09
FN (Wü)	16	7	29	16	13	0,81
BC (Wü)	14	10	19	8	9	1,13
TÜ (Wü)	14	8	15	5	8	1,60
TUT	10	5	22	9	14	1,56
HN (Wü)	6	3	7	6	1	0,17
Gesamt	486	33	8271	3597	4602	1,30
Baden	464	33	7019	3038	3916	1,29
Württemberg	231	26	1245	557	681	1,22

3.2 Wanzenfamilien und Ökologie

Aus biogeographischer Hinsicht ist ein Vergleich der Verteilung der Funde auf die verschiedenen Wanzenfamilien interessant (Tab. 3 und 4). Als Vergleich mit Literaturwerten dient die Wanzenfauna von Köln (Hoffmann, 1992) die des LK Konstanz (Heckmann, 1993), sowie das Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Günther & Schuster, 1990).

Die meisten Arten der Reduviidae, Lygaeidae, Coreidae und Pentatomidae zeichnen sich durch einen relativ hohen Wärmesummenbedarf aus und sind vor allem in xerothermen Biotopen zu finden. Meist haben diese Arten ein mediterranes Hauptverbreitungsgebiet, welches im Westen oft nur bis zum Mittelrheingebiet reicht. Ein niedrigerer Prozentsatz an Arten in diesen Familien verglichen mit dem Mittelwert für Mitteleuropa ist in NW-Deutschland generell zu beobachten – hier am Beispiel von Köln (Hoffmann, 1992) ebenfalls zu beobachten obwohl diese Region klimatisch begünstigt im Übergang zum Mittelrheingebiet gelegen ist. In Tab. 4 zeigt sich für die baden-württembergischen Landkreise und vor allem für Gesamtbaden bei den Lygaeidae, Coreidae und Pentatomidae der umgekehrte Trend: höhere Werte als im Mittel für Mitteleuropa. Der Ortenaukreis fällt hier aus dem Rahmen, bei vollständigerer Durchforschung sollten dort gerade bei diesen Familien Werte wie für Karlsruhe zu erreichen sein.

Je kleiner die Zahl der Arten in einem untersuchten Gebiet desto stärker spielen zufällige Fluktuationen eine Rolle, auch sind Familien deren Vertreter mehr oder weniger schnell vollständig gefangen werden überrepräsentiert. Dies gilt besonders für die Nabidae, Anthocoridae und Acanthosomatidae, aber auch für Gerridae, Rhopalidae und Pentatomidae.

Auch ist der Einfluß des Sammlers nicht zu unterschätzen. So war H. Nowotny Käferspezialist und hat daher sehr viel auf dem Boden, unter Rinde, Laub und Steinen gesammelt. In seinem Sammelgebiet um Karlsruhe (Karte 5) sind nicht zuletzt daher Lygaeiden und Cydniden überrepräsentiert – Miriden, die vor allem gekeschert werden dagegen unterrepräsentiert. L. Balles, seines Zeichens Wildbienenpezialist wird dagegen vor allem gekeschert und abgeklopft haben, Miriden sind daher in seinen Sammelgebieten bei Achern und Adelsheim (Karte 6) überrepräsentiert. Aquatische und semiaquatische Wanzen fehlen in seiner Sammlung vollständig.

Tabelle 3. Verteilung der Arten auf die verschiedenen Familien (Absolutzahlen). Auch die beiden umstrittenen Arten sind in die Tabellen aufgenommen.

Familie	M-Eu	Baden	KA	OG	KÜN	K	KN
Corixidae	38	10	9	1	–	17	11
Saldidae	28	10	9	1	1	8	5
Tingidae	74	25	16	9	5	10	16
Miridae	401	170	101	107	79	122	128
Anthocoridae	52	20	17	7	9	17	17
Reduviidae	18	8	4	2	1	3	6
Lygaeidae	155	78	62	21	28	37	42
Coreidae	27	13	11	6	3	3	6
Rhopalidae	17	11	7	4	6	8	7
Pentatomidae	70	37	30	17	15	22	26
andere Familien	181	82	66	24	27	60	56
Summe Arten	1061	464	332	199	174	307	320

Tabelle 4. Verteilung der Arten auf die verschiedenen Familien (Prozentwerte).

Familie	M-Eu	Baden	KA	OG	KÜN	K	KN
Corixidae	3,6	2,2	2,7	0,5		5,5	3,4
Saldidae	2,6	2,2	2,7	0,5	1,0	2,6	1,6
Tingidae	7,0	5,4	4,8	4,5	2,9	3,3	5,0
Miridae	37,8	36,6	30,4	53,8	45,0	39,7	40,0
Anthocoridae	4,9	4,3	5,1	3,5	5,2	5,5	5,3
Reduviidae	1,7	1,7	1,2	1,0	0,6	1,0	1,8
Lygaeidae	14,6	16,8	18,7	10,6	16,1	12,1	13,1
Coreidae	2,5	2,8	3,3	3,0	1,7	1,0	1,9
Rhopalidae	1,6	2,4	2,1	2,0	2,2	2,6	2,2
Pentatomidae	6,6	8,0	9,0	8,5	8,6	7,2	8,1
andere Familien	17,1	17,7	19,9	12,1	15,5	19,5	17,5

3.3 In der Sammlung des SMNK fehlende Arten

Ebenso interessant wie das Vorkommen in einem bestimmten Gebiet oder Zeitraum ist das völlige Fehlen bestimmter Arten. Hier sind für den Zeitraum bis in die 80er Jahre herausgegriffen:

- Corytuca ciliata* (Say, 1832)
- Deraeocoris flavilinae* (A. Costa, 1860)
- Reuteria marqueti* Puton, 1875
- Brachynotocoris puncticornis* Reuter, 1880
- Conostethus venustus* (Fieber, 1858)
- Nysius cymoides* (Spinola, 1837)
- Orsillus depressus* Dallas, 1832
- Emblethis denticollis* Horvath, 1878
- Eurydema ventralis* (Kolenati, 1846)
- Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

Das völlige Fehlen der oben aufgeführten Arten im bis 1988 gesammelten Material des SMNK spricht deutlich für eine erst in den letzten Jahren erfolgten Ausbreitung. Die „Einwanderungsproblematik“ vor allem der mediterranen Arten wird auch in Fischer (1970), Rieger (1989a & 1994) und Hoffmann (1992) diskutiert.

Die Ausbreitung der nearktischen Platanennetzwanze *Corytuca ciliata* Say über das Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa ist sehr gut belegt (Hopp, 1984; Billen, 1985 und Hoffmann, 1990); ebenso die Ausbreitung des mediterranen *Orsillus depressus* Dall. (Rieger & Strauß, 1992) sowie die Einwanderung von *Conostethus venustus* Fieb. über das Nieder- und Mittelrheingebiet (Aukema, 1988; Bernhardt, 1992; Günther, Munk & Schumacher 1987 und Reichling, 1994).

Bei *Deraeocoris flavilinae* A.C. ließ sich die Ausbreitung von Sizilien über Calabrien und Ligurien (Mancini, 1963) bis nach Korsika (Péricart, 1965) und schließlich ins Elsaß (Ehano, 1987), nach Holland (Aukema, 1987 & 1989), Luxemburg (Reichling, 1994) und vom Mittelrheingebiet (Bonn, ? leg. 1987) weiter bis Berlin (Göllner-Scheidung, 1991) belegen. Inzwischen gibt es 5 Fundorte dieser Art in Baden-Württemberg.

Reuteria marqueti Put. kam früher in Deutschland nur im Mittelrheingebiet vor, *Brachynotocoris puncticornis* Reut. ebenfalls dort und an einigen wenigen Stellen in Bayern (Seidenstücker, 1954). Inzwischen treten beide Arten gehäuft in verschiedenen Landesteilen auf (Rieger & Strauß, 1992). Eine ähnliche Arealvergrößerung könnte auch für *Emblethis denticolis* Horv. zutreffen, der in den letzten 2 Jahren bei Waghäusel (Voigt & Rietschel, 1993) und im Hegau (eigene Beobachtung) gefunden wurde.

Unklar ist die Situation auch bei *Nysius cymoides* Spin., von dem ein alter Fundort bei Frankfurt (Wagner, 1966) bekannt ist, bis Nordfrankreich und Belgien vorkommt und inzwischen an 4 Stellen in Baden-Württemberg gefunden wurde (Rieger, 1987). Eine ähnliche Situation liegt bei *Eurydema ventralis* Klti. vor: eine alte Meldung bei Wagner (1961) für den Kaiserstuhl, die später (Wagner, 1966) nicht mehr erwähnt wird, Meldungen aus Belgien und den Niederlanden und neuerdings tatsächlich am Kaiserstuhl gefunden (Rieger & Bernhardt, 1994).

Die Möglichkeit der Neueinwanderung von *Nezara viridula* L. wird bei Rieger (1994) diskutiert.

3.4 Zur Verbreitung besonderer Arten

Da sich für zahlreiche Arten aus den Funden in der SMNK ein deutlicher Informationszuwachs ergeben hat, wird im Folgenden eine biogeographische Interpretation der Funde dieser meist stark xerothermophilen Arten gegeben.

Bemerkenswert ist, daß in Baden-Württemberg bisher keine xerothermophilen Arten gefunden wurden, die ausschließlich über das Donautal eingewandert sind. Die meisten Arten sind offensichtlich aus dem westlichen Mittelmeergebiet via Mittelrhein über die Oberrheinebene eingewandert, wobei einige dieser Arten anscheinend zusätzlich über das Donautal Zugang gefunden haben. Dies zeigt auch, daß die Bedeutung der vielgerühmten Burgundischen Pforte bisher weit überschätzt worden ist. Weitere Informationen zu den entsprechenden Arten sind in der Gesamtartenliste zu finden. Bei nur wenigen Nachweisen einer Art ist die Interpretation noch etwas spekulativ. Arten, die seit über 25 Jahren nicht gefunden wurden, werden als verschollen betrachtet (hinter dem Artnamen mit „+“ und Jahreszahl des letzten Nachweises).

- a) Arten, die wahrscheinlich über die Burgundische Pforte von Süden in die Oberrheinebene eingewandert sind und isoliert zwischen Isteiner Klotz und Baden-Baden vorkommen. Das Hauptargument ist das Fehlen von Nachweisen im Mittelrheingebiet. Eine Alternativhypothese ist die Interpretation als Reliktvorkommen.

Miridius quadrivirgatus A.C. + 1978 *Tropidothorax leucopterus* Gz.

- b) Arten, die mit großer Wahrscheinlichkeit vom Mittelrheingebiet über Rheinhessen in die Oberrheinebene eingewandert sind. Das Argument ist hier die Verbreitung im Mittelrheingebiet und fehlende Nachweise am Kaiserstuhl und Isteiner Klotz. Es sind ausnahmslos Arten, die in Württemberg nicht nachgewiesen wurden und bisher nur im nördlichen und mittleren Teil der Oberrheinebene gehäuft gefunden wurden. Hier zeigt sich das traurige Bild, daß bereits 6 dieser 19 Arten seit mehr als 30 Jahren verschollen sind.

<i>Dictyonota strichnocera</i> Fieb.		<i>Metopoplax ditomoides</i> A.C.	
<i>Catoplatys carthusianus</i> Gz.		<i>Scolopostethus grandis</i> Horv.	
<i>Deraeocoris cordiger</i> Hhn.		<i>Emblethis griseus</i> Wff.	(Karte 16)
<i>Phytocoris minor</i> Kb.	+ 1933	<i>Haploprocta sulcicornis</i> F.	+ 1974
<i>Actinonotus pulcher</i> H.-S.	+ 1950	<i>Spathocera dahlmannii</i> Schill.	(Karte 19)
<i>Polymerus cognatus</i> Fieb.		<i>Arenocoris falleni</i> Schill.	(Karte 20)
<i>Atomoscelis onustus</i> Fieb.	+ 1959	<i>Coriomeris scabricornis</i> Pz.	
<i>Amblytylus albidus</i> Hhn.	+ 1899	<i>Rhopalus distinctus</i> Sign.	
<i>Conostethus roseus</i> Fall.	+ 1936	<i>Aethus flavicornis</i> F.	
<i>Berytinus geniculatus</i> Horv.			

- c) Arten, die am Mittelrhein vorkommen, jedoch ihren Verbreitungsschwerpunkt mehr im südlichen Teil der Oberrheinebene haben. Es sind hier mehrere Interpretationen möglich: Zuwanderung von Norden und Isolierung, Einwanderung durch die Burgundische Pforte, beides und als Reliktvorkommen. Alle Arten wurden in Württemberg nicht nachgewiesen.

<i>Alloeorhynchus flavipes</i> Fieb.		<i>Aethus nigratus</i> F.	(Karte 21)
<i>Rhynocoris erythropus</i> L.	+ 1952	<i>Staria lunata</i> Hhn.	
<i>Xanthochilus quadratus</i> F.	(Karte 12)		

- d) Arten, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland ebenfalls am Mittelrhein haben, in der Oberrheinebene verbreitet sind, dort in Seitentäler vorgedrungen sind, sowie im Hochrheingebiet und im westlichen Bodenseegebiet vorkommen. Hier kann eine (zusätzliche) Einwanderung über den „Reschenweg“ (also via Tirol und Voralberg) nicht ausgeschlossen werden. Bei diesen Arten fehlen Nachweise in Württemberg.

<i>Tingis crispata</i> H.-S.		<i>Eremocoris fenestratus</i> H.-S.	
<i>Lepydargyrus ancorifer</i> Fieb.	(Karte 9)	<i>Brachycarenum tigrinus</i> Schill.	
<i>Orius horvathi</i> Reut.			

- e) Arten mit Verbreitungsschwerpunkt am Mittelrhein, das Hauptvorkommen in Baden-Württemberg liegt in der Oberrheinebene und deren Seitentälern. Sie sind wahrscheinlich von Nordosten weiter ins Landesinnere über das Neckar- oder Maintal vorgedrungen und fehlen bisher im Hochrhein- und Bodenseegebiet sowie im Einzugsgebiet der Donau.

<i>Velia saulii</i> Tam.	(Karte 6)	<i>Sehirus morio</i> L.	+ 1953
<i>Heterocordylus tibialis</i> Hahn	(Karte 8)	<i>Tritomegas sexmaculatus</i> Ramb.	
<i>Dimorphopterus spinolae</i> Sign.	(Karte 10)	<i>Neottiglossa leporina</i> H.-S.	(Karte 24)
<i>Ceraleptus gracilicornis</i> H.-S.		<i>Anthemina lunulata</i> Gz.	

- f) Arten mit Verbreitungsschwerpunkt am Mittelrhein, das Hauptvorkommen liegt in der Oberrheinebene. Wenige zusätzliche Funde im Neckar- und/oder Donautal. Die Nachweise im Einzugsgebiet der Donau stammen fast alle aus der Zeit um die Jahrhundertwende, Funde neueren Datums (nach 1960) sind dort die Ausnahme (mit „!“ markiert). Alle diese Arten fehlen bisher im Hochrhein- und Bodenseegebiet.

<i>Deraeocoris morio</i> Boh.	!!	<i>Sphragisticus nebulosus</i> Fall.	(Karte 17)
<i>Deraeocoris punctulatus</i> Fall.	+ 1949	<i>Syromastus rhombeus</i> L.	(Karte 18)
<i>Adelphocoris reicheli</i> Fieb.	+ 1970 (Karte 7)	<i>Cydnus aterrimus</i> Forst.	(Karte 22)
<i>Geocoris ater</i> F.		<i>Carpocoris pudicus</i> Pd.	
<i>Aellopus atratus</i> Gz.	!!	<i>Eurydema ornatum</i> L.	(Karte 25)

- g) Arten mit Verbreitungsschwerpunkt am Mittelrhein, das Hauptvorkommen liegt in der Oberrheinebene. Zusätzliche Funde im Hochrheingebiet und im Hegau, Neckar- und/oder Donautal. Die Nachweise im Donautal stammen bis auf *E. austriaca* (Schr.) aus der Zeit um die Jahrhundertwende. *M. sabulicola* (Thoms.) wurde im Einzugsgebiet der Donau noch nicht gefunden, wohl aber am Hohentwiel (Aukema und Rieger, persönl. Mitteilung). *M. albomaculatus* (Gz.) kommt nur noch am Kaiserstuhl vor, seine anderen Vorkommen sind seit mehr als 100 Jahren erloschen.

<i>Polymerus asperulae</i> Fieb.		<i>Peritrechus gracilicornis</i> Put.	(Karte 13)
<i>Nabis punctatus</i> A.C.		<i>Megalonotus sabulicola</i> Thoms.	(Karte 15)
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> Gz.		<i>Eurygaster austriaca</i> Schr.	(Karte 23)

4. Taxonomische Bemerkungen zu einigen Arten

Aufgrund von Änderungen in der Artabgrenzung bzw. durch die Neubeschreibung von Arten sind ältere Literaturangaben von bestimmten Arten fraglich. In der folgenden Liste habe ich diese fraglichen Arten mit den betreffenden Literaturzitate und den Möglichkeiten was nun darunter zusätzlich verstanden werden kann aufgeführt.

- Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)** – (Carvalho & Wagner, 1957; Rieger, 1978): Hier dürfte sich die Mehrzahl der früheren Meldungen auf die häufigere *N. elongata* (Geoffroy, 1785) beziehen.
- Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785)** – (Rieger, 1978): Hier muß davon ausgegangen werden, daß sich fast alle älteren Angaben auf *T. caelestialium* Kirk. beziehen.
- Phytocoris varipes* (Boheman, 1852)** – (Wagner, 1954): *P. austriacus* E. Wagner, 1954 scheint in Baden-Württemberg deutlich seltener als *P. varipes* Boh. zu sein (Rieger & Strauß, 1992).
- Lygus gemellatus* (Herrich-Schäffer, 1835)** – (Kerzhner, 1984; Rieger, 1987): Nachdem die Konfundierung dieser Art mit *L. adspersus* (Schilling, 1837) wieder rückgängig gemacht wurde, ist es unklar worauf sich frühere Meldungen beziehen. *L. adspersus* Schill. scheint seltener zu sein.
- Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)** – (Remane, 1955): *L. wagneri* Rem., 1955 ist deutlich seltener.
- Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758)** – (Tamanini, 1951; Rieger, 1985): *O. basalis* (A. Costa, 1852) ist hier die wesentlich häufigere Art. Durch die Verwechslung beider Arten durch Wagner (1967, 1970/71, & Weber 1964) sind alle Nachweise des *O. kalmii* zwischen 1964 und 1985 wohl *O. basalis*, vor 1964 vorwiegend *O. basalis*.
- Psallus perrisii* (Mulsant, 1852)** – (Ossiannilsson, 1953; Aukema, 1981): *P. wagneri* (Ossiannilsson, 1953) lebt ebenso wie der viel häufigere *P. perrisii* Muls. an *Quercus*. Hier lassen sich nur die Männchen sicher durch Präparation der Genitalien unterscheiden.
- Psallus variabilis* (Fallen 1829)** – (Stichel, 1955-62; Aukema, 1981; Reichling, 1984): *P. assimilis* Stichel, 1956 lebt an *Acer campestre* und *P. pseudoplatani* Reichling, 1984 an *Acer pseudoplatanus*. Hier gibt es für ältere Angaben 3 Möglichkeiten, wobei *P. pseudoplatani* Reichl. deutlich seltener zu sein scheint. Bei allen 3 Arten sind nur die Männchen sicher durch Präparation der Genitalien zu unterscheiden.
- Nabis ferus* (Linnaeus, 1758)** – (Remane, 1964): *N. pseudoferus* Remane 1949 und *N. punctatus* A. Costa, 1847 sind voneinander und von *N. ferus* L. in beiden Geschlechtern nur durch die Betrachtung der Genitalien sicher zu unterscheiden. *N. pseudoferus* Rem. 1949 ist mit Abstand die häufigere Art in Baden-Württemberg.
- Anthocoris minki* Dohrn, 1860** – (Péricart, 1972): Von *A. minki* Dohrn wurde die var. *A. simulans* Reuter, 1884 als eigene Art abgespalten. Fehlt bei einer Angabe vor 1972 die Nennung der Varität, so ist nicht klar um welche Art es sich handelt.
- Orius sp.*** – (Wagner, 1952b, c & 1967; Péricart, 1972): Vor 1952 sind die Meldungen der Arten der Untergattung *Heterorius* unklar – also *O. horvathi* (Reuter, 1884), *O. laticollis* (Reuter, 1884), *O. majusculus* (Reuter, 1879), *O. minutus* (Linnaeus, 1758) und *O. vicinus* (Ribaut, 1923). Die Männchen sind mit den Wagner'schen Arbeiten recht gut zu unterscheiden, bei den Weibchen ist eine Determination erst mit Péricart (1972) mög-

- lich – bei manchen Individuen oft aber dennoch nicht möglich. Meldungen von *O. (s.str.) niger* (Wff., 1811) können dagegen übernommen werden.
- Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)** – (Deckert, 1985): Erst 1985 wurde erkannt, daß sich unter *L. equestris* L. 2 Arten verbergen. Die Schwesterart *L. simulans* (Deckert, 1985) ist in Baden-Württemberg jedoch weitaus seltener (Rieger & Strauß, 1992).
- Taphropeltus contractus* (Herrich-Schäffer, 1839)** – (Wagner, 1966): *T. hamulatus* (Thomson, 1870) wurde früher als Form des *T. contractus* (H.-S.) bezeichnet, es ist nicht klar welche Art häufiger ist.
- Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)** – (Roubal, 1965): *M. sabulicola* (Thomson, 1870) und *M. emarginatus* (Rey, 1888) waren früher als Varietäten von *M. chiragra* F. eingeordnet. *M. chiragra* F. ist die weitaus häufigere Art.
- Rhopalus conspersus* (Fieber, 1837) und *Rhopalus distinctus* (Signoret, 1859)** – (Kerzhner, 1972; Göllner-Scheidung, 1978): Die Trennung wurde früher an untauglichen morphologischen Merkmalen vollzogen, was schließlich dann zur Synonymisierung von *R. distinctus* Sign. mit *R. conspersus* Fieb. durch Stichel (1925-38) führte. Heute lassen sich beide Arten im männlichen Genital sauber voneinander trennen.
- Rhopalus rufus* Schilling, 1829** – (Göllner-Scheidung, 1978): Heute ist *R. rufus* Schill. enger definiert, so daß sich die meisten älteren Meldungen auf *R. parumpunctatus* Schilling, 1829 beziehen. Andere Autoren zweifeln die Artberechtigung von *R. rufus* Schill. inzwischen an.
- Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)** – Bis in die 20-iger Jahre wurde in der Regel nicht zwischen den 3 Arten der Gattung *S. abutilon* (Rossi, 1790), *S. crassicornis* (Linnaeus, 1758) und *S. punctatonevrosus* (Goeze, 1778) unterschieden. Bestenfalls wurden sie als Varietäten in den Listen vermerkt. Artenlisten aus dieser Zeit, in denen nur *S. crassicornis* (L.) auftaucht sind daher verdächtig.
- Carpocoris pudicus* (Poda, 1761)** – (Tamanini, 1958): In früheren Listen taucht fast nur *C. pudicus* (Pd.) auf. Fast immer ist darunter *C. purpureipennis* (De G., 1773) zu verstehen.
- Elasmotethus interstinctus* (Linnaeus, 1758)** – Angaben bis etwa 1910 sind fraglich, da bis dahin *Elasmotethus minor* Horvath, 1899 noch nicht abgetrennt war.

5. Artenlisten herausragender Fundorte

5.1 Flugsanddünen bei Sandhausen

Die vollständigste Liste der dort vorkommenden Wanzenarten findet sich in der umfassenden Arbeit von Voigt (1994). Es werden dort 229 Wanzenarten gemeldet. Die Arbeiten von Meess (1900 & 1907), die für das Gebiet um Sandhausen 36 Arten verzeichnen, wurden in der Voigt'schen Artenliste nicht berücksichtigt. Im SMNK befinden sich insgesamt die Belege von 62 Arten aus Sandhausen. *Amblytylus albidus* Hahn wurde nach Drucklegung der Voigt'schen Arbeit in der Sammlung des SMNK gefunden und war schon von Meess (1907) publiziert. Der bei Voigt (1994) als Neunachweis für Baden-Württemberg gemeldete *Gonianotus marginepunctatus* Wff. war schon von Meess (1900) für Sandhausen gemeldet. In der SMNK existieren Belege dieser Art von Becker und Nowotny aus den späten 40-iger Jahren. In den Meess'schen Arbeiten finden sich 4 weitere Arten die bei Voigt (1994) fehlen:

Stenodema holsatum F.
Adelphocoris seticornis F.

Rhynocoris iracundus Pd.
Nithecus jacobaeae Schill.

Von *Rhopalus rufus* Schill. finden sich keine Belege im SMNK, wohl aber zahlreiche *R. parumpunctatus* Schill. von gleichem Fundort und -datum wie in der Arbeit von Meess (1900) erwähnt. Diese fragliche Art (s.o.) muß von der Gesamtzahl abgezogen werden. Insgesamt sind damit nun 233 Arten aus den Dünengebieten um Sandhausen bekannt.

5.2 „NSG Michaelsberg“ bei Untergrombach (UTM: MV63NO)

Dieser Berg hatte schon bei den Entomologen des letzten Jahrhunderts einen „guten Ruf“ In der Literatur findet sich keine Artenliste der Wanzen dieses Gebietes, dafür einzelne Angaben zu obigem Fundort in verschiedenen Arbeiten. Im SMNK finden sich 33 Arten, die dort gefunden worden sind. Nur in der Arbeit von Meess (1900) wird als Fundort „Michaelsberg b. Untergrombach“ namentlich erwähnt, in Meess (1907) findet sich nur die Angabe „Untergrombach“ Ich nehme an, daß diese Meldungen (Meess, 1907) den Michaelsberg betreffen und habe diese miteinbezogen.

Meldungen aus der Literatur sind in Klammern angegeben, die anderen Angaben betreffen Belege im SMNK (jeweils nur erster und letzter Fund). Insgesamt sind für das NSG nun 43 Arten bekannt; es ist sicher das Vierfache zu erwarten, da sich früher dort anscheinend niemand bequemt hatte, die Weichwanzen zu sammeln.

<i>Deraeocoris ruber</i> L.	Juli 1988 Kußmaul
<i>Stenodema laevigatum</i> L.	Mai 1988 Kußmaul
<i>Phytocoris ulmi</i> L.	(Meess, 1907)
<i>Liocoris tripustulatus</i> F.	(Meess, 1907)
<i>Halticus luteicollis</i> Pz.	(Meess, 1907)
<i>Macrotylus paykulli</i> Fall.	(Meess, 1907)
<i>Nabis brevis</i> Sz.	Mai 1988 Kußmaul
<i>Nabis rugosus</i> L.	Mai 1988 Kußmaul

<i>Rhynocoris iracundus</i> Pd.	(Meess, 1907)
<i>Pygolampis bidentata</i> Gz.	(Voigt, 1977b)
<i>Stygnocoris sabulosus</i> Schill.	(Meess, 1907)
<i>Coriomeris denticulatus</i> Scop.	(Meess, 1907)
<i>Corizus hyoscyami</i> L.	(Meess, 1900)
<i>Rhopalus distinctus</i> Sign.	(Günther, Rieger & Burghardt, 1982)
<i>Coptosoma scutellatum</i> Geoffr.	(Meess, 1907) Juni 1919 Leininger, Juli 1956 Now.
<i>Legnotus limbosus</i> Geoffr.	Mai 1950, Aug. 1951 Now.
<i>Legnotus picipes</i> Fall.	Juni 1950, Mai 1960 Now.
<i>Aethus nigrilus</i> F.	Mai 1949 Now.
<i>Cydnus aterrimus</i> Forst.	Mai 1949, Mai 1950 Now.
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> L.	März, Mai 1950 Now.
<i>Odontoscelis fuliginosa</i> L.	Juli 1951 Now.
<i>Eurygaster austriaca</i> Schr.	Aug. 1935 Becker, Sep. 1953 Now.
<i>Eurygaster maura</i> L.	Sep. 1927 Leininger, Sep. 1951 Now.
<i>Graphosoma lineatum</i> L.	(Meess, 1907) Aug. 1951, Juni 1957 Now.
<i>Sciocoris cursitans</i> F.	Sep. 1949, Sep. 1955 Now.
<i>Aelia acuminata</i> L.	Okt. 1927 Leininger, April 1958 Now., Mai 1988 Kußmaul
<i>Neottiglossa leporina</i> H.-S.	Sep. 1953 Now.
<i>Neottiglossa pusilla</i> Gm.	Juni 1962 Now.
<i>Eysarcoris fabricii</i> Kirk.	Mai 1950, Juni 1957 Now.
<i>Palomena prasina</i> L.	Sep. 1927 Leininger.
<i>Palomena viridissima</i> Pd.	April 1958 Now.
<i>Holcostethus sphacelatus</i> F.	Mai 1950, Juli 1956 Now.
<i>Holcostethus vernalis</i> Wff.	Mai 1950, Juni 1960 Now.
<i>Carpocoris purpureipennis</i> De G.	Okt. 1927 Leininger, Aug. 1951 Now., Mai 1988 Kußmaul
<i>Carpocoris fuscispinus</i> Boh.	Aug. 1922 Leininger, Sep. 1953 Now.
<i>Dolycoris baccarum</i> L.	Okt. 1921, Okt. 1927 Leininger.
<i>Eurydema oleraceum</i> L.	Aug. 1935 Becker, April 1953 Now.
<i>Eurydema ornatum</i> L.	Aug. 1949, Sep. 1953 Now.
<i>Piezodorus lituratus</i> F.	Juni 1950, Juni 1960 Now.
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> Pd.	Aug. 1951 Now.
<i>Picromerus bidens</i> L.	April 1956 Now.
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> L.	Juni 1934 Leininger, Mai 1955 Now.
<i>Elasmucha grisea</i> L.	Aug. 1951, März 1952 Now.

5.3 Turmberg bei Karlsruhe-Durlach (UTM: MV62NW)

Auch dieses Gebiet ist ebenfalls schon seit mehr als hundert Jahren ein beliebtes Ziel entomologischer Exkursionen. In der Literatur finden sich weit verstreut Angaben zu diesem Gebiet, jedoch keine Wanzenlisten. In der Sammlung des SMNK waren 23 Arten mit dieser Fundortangabe vorhanden, darunter 3 Belege der Arbeit von Meess (1900). Insgesamt sind damit 38 Arten von diesem Berg bekannt. In der folgenden Liste ist Datum und leg. der Belege vermerkt und/oder das entsprechende Zitat der Literaturmeldungen.

Eventuell bezieht sich die Meldung von *D. sylvaticus* F. (Meess, 1900) auf den im SMNK vorhandenen *D. ryei* Doug. & Sc.

<i>Stenodema laevigatum</i> L.	Mai 1899 Fischer, Juni 1947 Now.
<i>Megaloceraea recticornis</i> Geoffr.	(Meess, 1907)
<i>Phytocoris longipennis</i> Flor	(Meess, 1900)
<i>Phytocoris pini</i> Kb.	(Meess, 1900)
<i>Lygocoris lucorum</i> Mey.-D.	(Meess, 1900)
? <i>Orthops kalmii</i> L.	(Meess, 1900)
<i>Liocoris tripustulatus</i> F.	Juni 1947 Now.
<i>Charagochilus gyllenhalii</i> Fall.	Mai 1900 Fischer
<i>Prostemma guttula</i> F.	(Meess, 1907)
<i>Aptus mirmicoides</i> O.C.	Mai 1899 Fischer
<i>Nabis brevis</i> Sz.	März 1900 Fischer
<i>Nabis rugosus</i> L.	Mai 1899 Fischer
<i>Anthocoris gallarumulmi</i> De G.	Nov. 1900 Fischer
<i>Lygaeus equestris</i> L.	(Meess, 1907)
<i>Spilostethus saxatilis</i> Scop.	Sep. 1900 Fischer
<i>Drymus ryei</i> Doug.& Sc.	März 1899 Fischer
<i>Drymus sylvaticus</i> F.	(Meess, 1900)
<i>Scolopostethus affinis</i> Schill.	März 1899 Fischer
<i>Stygnocoris sabulosus</i> Schill.	(Meess, 1900)
<i>Beosus maritimus</i> Scop.	(Meess, 1900)
<i>Rhyparochromus pini</i> L.	Sep. 1900 Fischer
<i>Peritrechus nubilus</i> Fall.	(Meess, 1900)
<i>Dicranocephalus agilis</i> Scop.	Mai 1899 Fischer
<i>Dicranocephalus albipes</i> F.	Sep. 1900 Fischer
<i>Syromastes rhombeus</i> L.	(Meess, 1900)
<i>Enoplops scapha</i> F.	März 1899 Fischer (Meess, 1900)
<i>Alydus calcaratus</i> L.	Aug. 1946 Now.
<i>Coptosoma scutellatum</i> Geoffr.	(Meess, 1900)
<i>Legnotus picipes</i> Fall.	(Meess, 1900)
<i>Podops inuncta</i> F.	März 1899 Fischer (Meess, 1900)
<i>Aelia acuminata</i> L.	Sep. 1900 Fischer (Meess, 1900)
<i>Neottiglossa pusilla</i> Gm.	Mai 1900 Fischer
<i>Palomena viridissima</i> Pd.	März 1886 ? leg.
<i>Holcostethus vernalis</i> Wff.	Aug. 1944 Now.
<i>Carpocoris purpureipennis</i> De G.	Sep. 1910 Fischer
<i>Carpocoris fuscispinus</i> Boh.	Sep. 1909 Fischer
<i>Dolycoris baccarum</i> L.	Aug. 1927 Hohndorf
<i>Troilus luridus</i> F.	(Meess, 1900)

5.4 „NSG Scheibenberg“ nördlich Hörden bei Gaggenau (UTM: MV50SW)

Bei diesem Fundort handelt es sich um eine geschützte, südexponierte Kessellage am Ortsrand an einem Schrebergartengelände (K. Voigt, persönl. Mitteilung). Bis auf 7 Meldungen stammen die untenstehenden Funde von H. Nowotny der diesen Fundort in den 50-iger und 60-iger Jahren immer wieder besammelt hat, 4 Nachweise wurden später von Kußmaul bestätigt („*“). Herausragend ist hier vor allem der Fund von *Haploprocta sulcicornis* F. (Voigt, 1970) die in Baden-Württemberg an keinem anderen Ort wieder gefunden wurde. Bemerkenswert auch die Funde von *Tropidothorax leucopterus* Gz. und *Ischnocoris angustulus* Boh. von denen jeweils ein weiterer Fundort aus Baden-Württemberg bekannt ist.

Insgesamt sind von diesem Fundort 54 Arten bekannt, die Belege befinden sich alle im SMNK.

<i>Acalypta parvula</i> Fall.		<i>Tropistethus holosericeus</i> Sz.
<i>Kalama tricornis</i> Schr.		<i>Eremocoris podagricus</i> F.
<i>Deraeocoris lutescens</i> Schill.	Kußmaul leg.	<i>Ischnocoris angustulus</i> Boh.
<i>Dicyphus globulifer</i> Fall.		<i>Scolopostethus decoratus</i> Hhn.
<i>Stenodema laevigatum</i> L.	Kußmaul leg.	<i>Taphropeltus hamulatus</i> Thoms.
<i>Phytocoris austriacus</i> E. Wgn.	Kußmaul leg.	<i>Stygnocoris fuliginus</i> Geoffr.
<i>Adelphocoris seticornis</i> F.		<i>Beosus maritimus</i> Scop.
<i>Stenotus binotatus</i> F.		<i>Peritrechus lundii</i> Gm.
<i>Lygus pratensis</i> L.		<i>Megalonotus dilatatus</i> H.-S.
<i>Charagochilus gyllenhalii</i> Fall.		<i>Macrodema micropterum</i> Curt.
<i>Capsodes gothicus</i> L.		<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> Schill.
<i>Capsodes cingulatus</i> F.		<i>Haploprocta sulcicornis</i> F.
<i>Orthotylus virescens</i> Doug. & Sc.		<i>Coreus marginatus</i> L.
<i>Globiceps cruciatus</i> Reut.		<i>Spathocera dalmannii</i> Schill.
<i>Chlamydatus evanescens</i> Boh.		<i>Alydus calcaratus</i> L.
<i>Lepydargyrus ancorifer</i> Fieb.		<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schill.
<i>Megalocoleus molliculus</i> Fall.		<i>Rhopalus subrufus</i> Gm.
<i>Prostemma guttula</i> F.		<i>Stictopleurus abutilon</i> Rossi
* <i>Aptus mirmicoides</i> O.C.		<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> Gz.
<i>Anaptus major</i> A.C.		<i>Aethus nigrinus</i> F.
<i>Nabis brevis</i> Sz.		* <i>Graphosoma lineatum</i> L.
<i>Nabis rugosus</i> L.	Kußmaul leg.	<i>Aelia acuminata</i> L.
<i>Dufouriellus ater</i> Duf.		<i>Neottiglossa leporina</i> H.-S.
<i>Neides tipularius</i> L.		<i>Eysarcoris aeneus</i> Scop. Kußmaul leg.
<i>Tropidothorax leucopterus</i> Gz.	Kußmaul leg.	* <i>Carpocoris purpureipennis</i> De G.
<i>Nysius senecionis</i> Schill.		* <i>Carpocoris fuscispinus</i> Boh.
<i>Ortholomus punctipennis</i> H.-S.		<i>Piezodorus lituratus</i> F. Kußmaul leg.

5.5 Bienenbuckel bei Oberachern (UTM: MU38NW)

Für diesen wegen seiner Wildbienenfauna bekannten Hügel mit lückigen Halbtrockenrasen und Kiefernbeständen wurden von Balles in den Jahren 1931-34 insgesamt 39 Arten nachgewiesen:

Saldula saltatoria L.
Deraeocoris lutescens Schill.
Monalocoris filicis L.
Dicyphus errans Wff.
Phytocoris minor Kb.
Phytocoris varipes Boh.
Lygus pratensis L.
Lygus rugulipennis Popp.
Pinalitus rubricatus Fall.
Camptozygum aequale Vill.
Heterocordylus tibialis Hahn
Pilophorus cinnamopterus Kb.
Atractotomus parvulus Reut.
Himacerus apterus F.
Nabis rugosus L.
Orius minutus L.
Orius vicinus Rib.
Aradus cinnamomeus Pz.
Piesma maculatum Lap.
Metatropis rufescens H.-S.

Eremocoris plebejus Fall.
Scolopostethus decoratus Hahn
Taphropeltus hamulatus Thom.
Stygnocoris rusticus Fall.
Stygnocoris sabulosus Schill.
Rhyparochromus pini L.
Coreus marginatus L.
Coriomeris denticulatus Scop.
Rhopalus parumpunctatus Schill.
Rhopalus subrufus Gm.
Stictopleurus punctatonervosus Gz.
Tritomegas bicolor L.
Eysarcoris aeneus Scop.
Palomena prasina L.
Dryocoris vernalis Wff.
Dolycoris baccarum L.
Eurydema oleraceum L.
Eurydema dominulum Scop.
Elasmucha grisea L.

Herausragend ist hier der Fund von *Phytocoris minor* Kb. der bisher in Baden-Württemberg an keinem anderen Ort nachgewiesen wurde (Günther, Rieger & Burghardt, 1982).

5.6 Kaiserstuhl

Auch für dieses, aus entomologischer Sicht wohl bekannteste Gebiet in Baden-Württemberg und eines der interessantesten in Deutschland, existiert in der Literatur keine zusammenfassende Arbeit über die Heteropterenfauna. Eine genaue Lokalisierung früherer Funde wird dadurch erschwert, daß in den älteren Arbeiten oft nur als Fundort „Kaiserstuhl“ erwähnt ist. Meess (1900 & 1907) nennt 42 Arten, Strohm (1933) gibt eine Liste von 102 Arten für den „Kaiserstuhl“, erwähnt aber nur bei 5 Arten den genauen Fundort. Bei seiner großzügigen Interpretation beziehen sich die anderen Angaben auf eine Fläche von 250 km² und sind daher praktisch wertlos. Andererseits hat Strohm seine Funde präzise etikettiert (wovon ich mich selber überzeugen konnte) und die Belege befinden sich in der Sammlung des Naturkundemuseums in Freiburg (Stuke, 1993). Da Strohm noch über 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung im Gebiet weiter gesammelt hat wäre eine Überarbeitung seiner Sammlung außerordentlich interessant und lohnend. Engel & Weidner (1952) erwähnen, daß bei einer Exkursion 64 Arten im Kaiserstuhl festgestellt wurden, sie geben jedoch explizit nur 16 Arten für den Badberg an.

Literaturangaben stehen in Klammern, bei nicht eingeklammerten Angaben befindet sich der Beleg in der SMNK. Aus dem Kaiserstuhlgebiet finden sich damit im SMNK die Belege von 84 Arten, davon sind immerhin 39 Arten aus der Literatur bisher für das Gebiet nicht bekannt. Insgesamt sind nun im Kaiserstuhlgebiet 186 Wanzenarten gefunden worden, von den Literaturangaben sind aus oben genannten Gründen 12 Arten fraglich. Bei genauerer Bearbeitung dürfte gut das Doppelte an Arten zu erwarten sein.

Soweit detailliertere Angaben vorhanden waren, sind diese in der Liste mit Abkürzung angefügt:

Achkarren (LU92NO) = **A** Badberg (MU02NW) = **B** Eichstetten (MU02NO) = **E**

Haselschacher Buck (MU02NW) = **HB** Ihringen (LU92SO) = **I**

Ihringen, Himmelberg (LU92SW) = **IH** Niederrotweil (LU92NO) = **NR**

Niederrotweil, „Faule Waag“ (LU92NO) = **FW** Totenkopf, Neunlinden = **N**

Oberrotweil (LU92NO) = **O** Schelingen (MU02NW) = **S** Vogtsburg (MU02NW) = **V**

Wasenweiler (MU02SW) = **W**

Balles = Bal. Engel & Weidner = E. & W. Frentzen = Frz. Gremminger = Grm. Heckmann = Hck. Kesenheimer = Kes. Leininger = Lng. Nowotny = Now. Str. = Stroh

<i>Nepa cinerea</i> L.	(B Lauterborn, 1926)
<i>Notonecta maculata</i> F.	(B Lauterborn, 1926, gemäß Rieger, 1974)
<i>Callicorixa praeusta</i> Fieb.	FW Juni 1953 Now.
<i>Sigara striata</i> L.	FW Juni 1953 Now.
<i>Sigara distincta</i> Fieb.	FW Juni 1953 Now.
<i>Sigara falleni</i> Fieb.	FW Juni 1953 Now.
<i>Sigara lateralis</i> Lch.	FW Juni 1953 Now.
<i>Gerris asper</i> Fieb.	(Wagner, 1961)
<i>Saldula saltatoria</i> L.	FW Juni 1923 Lng.
<i>Acalypta parvula</i> Fall.	B Juni 1953 Now.
<i>Tingis crispata</i> H.-S.	(Wagner, 1961), W Aug. 1933 Bal.
<i>Tingis maculata</i> H.-S.	(S Rieger, 1981a)
<i>Copium clavicornis</i> L.	(Meess, 1907), (Str., 1933), B Juni 1953 Now., (B E. & W., 1952), (S Rieger, 1981a)
<i>Copium teucroii</i> Host	(Rudy, 1924), (Str., 1933), B Juni 1953 Now., (S Rieger, 1981a)
<i>Dictyla echii</i> Schr.	(A Rieger, 1981a), B Juni 1958 Now., (Hck., leg. 1995), (N Meess, 1900)
<i>Myrmedobia coleoptrata</i> Fall.	(Str., 1933)
<i>Deraeocoris morio</i> Boh.	(B E. & W., 1952)
<i>Deraeocoris trifasciatus</i> L.	B Juni 1953 Now.
<i>Dicyphus epilobii</i> Reut.	W Aug. 1933 Bal.
<i>Dicyphus errans</i> Wff.	W Aug. 1933 Bal.
<i>Myrmecoris gracilis</i> J.Shlbg.	(Str., 1933)
<i>Leptopterna dolabrata</i> L.	(Str., 1933), B Juni 1925 Lng.
<i>Leptopterna ferrugata</i> Fall.	(Str., 1933), FW Juni 1925 Lng.
<i>Stenodema holsatum</i> F.	FW Juni 1953 Now.
<i>Stenodema laevigatum</i> L.	(Meess, 1900), (Str., 1933)
<i>Stenodema virens</i> L.	(Str., 1933)
<i>Notostira elongata</i> Geoffr.	B Juli 1933 Lng.
? <i>Notostira erratica</i> L.	(Str., 1933)
<i>Megaloceraea recticornis</i> Geoffr.	(B E. & W., 1952)
? <i>Trigonotylus ruficornis</i> Geoffr.	(Str., 1933)
<i>Phytocoris meridionalis</i> H.-S.	(Wagner, 1952a)

- Phytocoris austriacus* E.Wgn. (B R. & S., 1992)
Phytocoris insignis Reut. (B Rieger, 1987)
 ? *Phytocoris varipes* Boh. (Str., 1933)
Pantilius tunicatus F. (Str., 1933)
Adelphocoris lineolatus Gz. (Str., 1933), (B E. & W., 1952), (I Meess, 1900)
Adelphocoris seticornis F. B Juni 1953 Now.
Calocoris fulvomaculatus De G. (B E. & W., 1952)
Calocoris norvegicus Gm. B Juni 1953 Now.
Calocoris roseomaculatus De G. (Str., 1933)
Hadrodemus m-flavum Gz. (Str., 1933), B Juni 1925 & Juli 1933 Lng.,
 Juni 1953 & 1956 Now., (B E. & W., 1952),
 FW Juni 1925 Lng., I Juni 1923 Frz.,
 (I Meess, 1900 & 1907)
- Stenotus binotatus* F. A Juni 1953 Now., B Juni 1953 Now.
Lygus adspersus Schill. (A Rieger, 1987), (V Rieger, 1987)
Lygocoris pabulinus L. (Str., 1933)
 ? *Lygus pratensis* L. (Str., 1933)
Lygus wagneri Rem. FW Juni 1953 Now.
Orthops basalis A.C. (B Rieger, 1985)
 ? *Orthops kalmii* L. (Str., 1933), (B E. & W., 1952)
Pinalitus cervinus H.-S. (Str., 1933)
Liocoris tripustulatus F. (Str., 1933)
Charagochilus gyllenhalii Fall. (Str., 1933)
Polymerus unifasciatus F. (Str., 1933), (B E. & W., 1952)
Capsus ater L. (Meess, 1907), (Str., 1933)
Capsodes gothicus L. (Meess, 1907), (Str., 1933), A Juni 1925 Lng.,
 B Juni 1953 Now., (B E. & W., 1952),
 I Juni 1923 Frz., Juni 1925 Lng., (I Meess, 1900),
 (N Meess, 1900)
- Capsodes cingulatus* F. (Str., 1933), A Juni 1925 Lng., Juni 1953 Now.,
 B Juni 1953 Now., (B E. & W., 1952),
 IH Mai 1899 Fischer (Meess, 1900)
- Orthocephalus saltator* Hhn. B Juni 1953 Now.
Heterocordylus genistae Scop. (Meess, 1907)
Heterocordylus tibialis Hhn. (A Meess, 1907)
Malacocoris chlorizans Pz. HB Aug. 1933 Bal.
Melanotrichus flavosparsus C.Slbg. W Aug. 1933 Bal.
Globiceps cruciatus Reut. A Juni 1953 Now., B Juni 1953 Now.
Macrotylus herrichi Reut. (Meess, 1907), B Juni 1953 Now., (B E. & W., 1952)
Harpocera thoracica Fall. (N Meess, 1900)
Monosynamma bohemani Fall. (A Meess, 1907)
Chlamydatus evanescens Boh. A Juni 1953 Now. (Voigt, 1977b),
 B Juni 1953 Now.
- Psallus confusus* Rieger (S Rieger, 1981b)
Psallus varians H.-S. B Juni 1953 Now.

- Oncotylus punctipes* Reut. (Meess, 1907)
Phylus coryli L. **B** Juni 1953 Now.
Amblytylus nasutus Kb. (Meess, 1907)
Tinicephalus hortulanus Mey.-D. (**B** E. & W., 1952)
Hoplomachus thunbergi Fall. (**A** Meess, 1907)
Alloeorhynchus flavipes Fieb. (Voigt, 1977b)
Himacerus apterus F. (Str., 1933)
Aptus mirmicoides O.C. (Str., 1933), **B** Juli 1933 Lng., (Hck. leg., 1995)
Nabis brevis Sz. (Str., 1933)
? *Nabis ferus* L. (Str., 1933)
Nabis rugosus L. (Str., 1933)
? *Anthocoris minki* Dohrn (**B** E. & W., 1952)
Anthocoris nemoralis F. (Str., 1933), **B** Juni 1953 Now.
Anthocoris nemorum L. (Str., 1933)
Orius niger Wff. (Str., 1933)
? *Orius minutus* L. (Str., 1933)
Peirates hybridus Scop. (**A** Str., 1933), (**I** Str., 1933)
Rhynocoris annulatus L. (Str., 1933), (**O** Meess, 1900)
Rhynocoris erythropus L. (**A** Str., 1933), **B** 1899 Fischer, (**B** E. & W., 1952)
Rhynocoris iracundus Pd. (Str., 1933), **A** Juni 1953 Now., (**B** E. & W., 1952),
I Juni 1923 Frz., (**B** Voigt, 1977b), (**NR** Voigt, 1977b)
Reduvius personatus L. (Str., 1933), **A** Juni 1953 & 1959 Now.
Phymata crassipes F. **B** Juni 1942 Kes., (**B** E. & W., 1952), (**I** Str., 1933)
Aradus cinnamomeus Pz. (**B** Hck., leg. 1995)
Aradus versicolor H.-S. (Wagner, 1966)
Aneurus avenius Duf. (Str., 1933)
Berytinus clavipes F. **B** Juni 1953 Now.
Berytinus minor H.-S. **B** Juni 1953 Now.
Berytinus signoreti Fieb. **B** Juni 1958 Now.
Metatropis rufescens H.-S. **W** Aug. 1933 Bal.
? *Lygaeus equestris* L. (Str., 1933), (**A** Meess, 1900),
Lygaeus equestris L. **B** Juli 1933 Lng., Juni 1953 Now.
Melanocoryphus albomaculatus Gz. (**A** Str., 1933), **I** Juni 1923 Frz. (**I** Str., 1933)
(**O** Schmid, 1967)
Spilostethus saxatilis Scop. (Str., 1933), **B** Juni 1953 Now.
Tropidothorax leucopterus Gz. (Wagner, 1966), **B** Juni 1953 Now., (**B** Voigt, 1970)
Nysius senecionis Schill. (Str., 1933)
Nysius thymi Wff. (Str., 1933)
Ortholomus punctipennis H.-S. (Str., 1933)
Kleidocerys resedae Pz. (Str., 1933)
Heterogaster urticae F. **A** Juni 1953 Now., **B** Juni 1953 Now.
Platyplax salviae Schill. (Str., 1933)
Plinthisus brevipennis Latr. (Str., 1933)
Tropistethus holosericeus Sz. (Str., 1933)
Eremocoris abietis L. (Str., 1933)

- Ischnocoris hemipterus* Schill. (Str., 1933), (**A** Voigt, 1977b)
Ischnocoris punctulatus Fieb. (Voigt, 1983)
Scolopostethus affinis Schill. (Str., 1933)
Scolopostethus pictus Schill. (Str., 1933)
 ? *Taphropeltus contractus* H.-S. (Str., 1933)
Stygnocoris fuliginus Geoffr. (Str., 1933)
Stygnocoris rusticus Fall. (Str., 1933)
Acompus rufipes Wff. (Str., 1933), (**B** Juni 1953 Now., (**I** Meess, 1907)
Aellopus atratus Gz. **A** Juni 1953 Now., **B** April 1931 Grm.,
 Juni 1953 Now.
Beosus maritimus Scop. (**W** Voigt, 1970)
Rhyparochromus pini L. (Str., 1933)
Xanthochilus quadratus F. **A** Juni 1953 Now., **B** Juni 1953 Now.,
I Juni 1923 Frz.
Peritrechus geniculatus Hhn. **B** Juni 1953 Now.
Peritrechus gracilicornis Put. **A** Juni 1953 Now.
 ? *Megalonotus chiragra* F. (Str., 1933)
Pyrrhocoris apterus L. (Str., 1933), **B** Juni 1933 Becker,
 (**A**, **W** Hck. leg., 1994)
Dicranocephalus agilis Scop. (Str., 1933), **B** Juni 1933 Becker,
FW Juni 1953 Now., **I** Juni 1923 Frz., (**I** Meess, 1900)
Dicranocephalus albipes F. (**A** Voigt, 1970), (**B** Voigt, 1970), **I** Juni 1923 Frz.
Gonocerus acuteangulatus Gz. (**A** Voigt, 1970), **B** Juni 1953 Now.,
W Aug. 1933 Bal.
Syromastes rhombeus L. (Str., 1933), (**A** Meess, 1907)
Enoplops scapha F. (Str., 1933), **A** Mai 1899 Fischer (Meess, 1900),
B Juni 1953 Now.
Coreus marginatus L. (Str., 1933), (**A** Schmid, 1967) **B** Sep. 1922 Lng.,
 (**N** Meess, 1900)
Ceraleptus gracilicornis H.-S. **B** Mai 1925 Lng., (**I** Str., 1933), (**N** Meess, 1900)
Coriomeris denticulatus Scop. **A** Juni 1953 Now., **B** Juni 1953 & Mai 1958 Now.,
I Juni 1923 Frz.
Coriomeris scabricornis Pz. (Str., 1933)
Alydus calcaratus L. (Str., 1933)
Liorhyssus hyalinus F. (Wagner, 1966)
Corizus hyoscyami L. (Str., 1933), **B** Juni 1897 Fischer (Meess, 1900)
 Juni 1953 Now.
Rhopalus parumpunctatus Schill. (Meess, 1907), (Str., 1933)
Rhopalus subrufus Gm. (Str., 1933), **B** Sep. 1923 Lng., **I** Juni 1923 Frz.
Myrmus miriformis Fall. (Meess, 1907)
Stictopleurus abutilon Rossi **B** Mai 1925 Lng.
Stictopleurus crassicornis L. (Str., 1933)
Stictopleurus punctatonervosus Gz. (Str., 1933)
Coptosoma scutellatum Geoffr. (Str., 1933), **B** Juni 1897 Fischer (Meess, 1900),
 Juni 1953 Now.

- Tritomegas bicolor* L. (Str., 1933)
Tritomegas sexmaculatus Ramb. (Str., 1933)
Adomerus biguttatus L. (Str., 1933), **B** Juni 1957 Now.
Legnotus limbosus Geoffr. **B** Juni 1953 Now.
Legnotus picipes Fall. **B** Juni 1953 & Mai 1958 Now.
Aethus nigratus F. (Str., 1933)
Cydnus aterrimus Forst. (Str., 1933)
Odontoscelis fuliginosa L. **B** Juni 1953 & Mai 1958 Now.
Odontotarsus purpureolineatus Rossi (A Rieger, 1987)
Eurygaster maura L. (Meess, 1907), (Str., 1933), **B** Sep. 1922 Lng.,
 April 1931 Grm., Juni 1953 Now.
Eurygaster testudinaria Geoffr. **B** Sep. 1922 Lng.
Graphosoma lineatum L. (Str., 1933), **B** Juli 1933 Lng., (I Meess, 1900)
Podops inuncta F. (Str., 1933)
Sciocoris micropthalmus Flor **B** Juni 1953 Now., (V Voigt, 1977b)
Aelia acuminata L. (Str., 1933)
Aelia rostrata Boh. (Str., 1933)
Neottiglossa pusilla Gm. (Str., 1933)
Neottiglossa leporina H.-S. **B** Juni 1953 Now.
Eysarcoris aeneus Scop. (Str., 1933)
Eysarcoris fabricii Kirk. (Str., 1933), **B** Juni 1933 Becker
Staria lunata Hhn. (Str., 1933), (A Meess, 1907), **B** Juni 1953 Now.
Rubiconia intermedium Wff. (A Meess, 1907)
Palomena prasina L. (Str., 1933), (A Schmid, 1967) (N Meess, 1900)
Palomena viridissima Pd. (Str., 1933), (N Meess, 1900)
Holcostethus sphacelatus F. (A Meess, 1907), **B** Juni 1953 Now., (I Meess, 1900)
Holcostethus vernalis Wff. (A Voigt, 1970), (B Voigt, 1970), (E Voigt, 1970),
 (W Voigt, 1970)
Carpocoris fuscispinus Boh. (Str., 1933) **B** Sep. 1922 Lng. & Frz., (N Meess, 1900)
 ? *Carpocoris pudicus* Pd. (Str., 1933) (N Meess, 1900)
Dolycoris baccarum L. (Str., 1933), **I** Juni 1923 Frz., (N Meess, 1900)
Eurydema dominulum Scop. (Str., 1933)
Eurydema oleraceum L. (Str., 1933), (NR Schmid, 1967)
Eurydema ornatum L. (Meess, 1907), (A Schmid, 1967), **B** Juni 1925
 Lng., Juni 1953 Now., (NR Schmid, 1967)
Eurydema ventralis Klti. (Wagner, 1961),
 (B und W Rieger & Bernhardt, 1994)
Piezodorus lituratus F. (Str., 1933), **B** Juni 1897 Fischer, (N Meess, 1900)
Rhaphigaster nebulosa Pd. (Str., 1933), **B** Juni 1933 Becker, (NR Schmid, 1967)
Pentatoma rufipes L. (Str., 1933)
Picromeris bidens L. (Str., 1933)
Arma custos F. (Str., 1933) (I Meess, 1907), **W** Aug. 1933 Bal.
 (W Meess, 1907)
Jalla dumosa L. **B** April 1931 Grm.
Acanthosoma haemorrhoidale L. (Str., 1933)

- ? *Elasmostethus interstinctus* L. (N Meess, 1900)
Elasmostethus minor Horv. (B Voigt, 1970)
 Die Meldung von *D. medius* Muls. & Rey (Voigt., 1970) beruht auf einer Fehldetermination.

5.7 „NSG Isteiner Klotz“

Die Artenliste schließt auch die Wiese bis an die Landstraße im SW des Isteiner Klotzes ein, d.h. alle Funde betreffen das UTM-Gitter LT87NO.

Bei nicht eingeklammerten Angaben befindet sich der Beleg im SMNK. Meldungen aus der Literatur stehen in Klammern. Ein Teil der Fischer'schen Funde wurde bereits von Meess (1900) publiziert.

Bei den Angaben von Meess (1907) beziehen sich nur zwei – *Platyplax salviae* (Schill.) und *Rhynocoris erythropus* (L.) – explizit auf den Isteiner Klotz, bei den anderen Arten ist nur Istein vermerkt. Bezüglich des Artenspektrums dürften diese jedoch auch dort gefunden worden sein: *Hebrus pusillus* Fall. habe ich nicht aufgenommen.

161 Arten sind nun für den Isteiner Klotz bekannt, 16 Arten aus den Literaturangaben sind fraglich. Drei Arten (mit „*“ gekennzeichnet) waren für das Gebiet aus der Literatur bisher nicht bekannt. Die Angabe „c.f.“ oder „spec.“ bei fraglichen Arten stammt von Duderstadt (1974) selber.

Duderstadt = Dst. Frentzen = Frz. Leininger = Lng. Rieger & Strauß = R. & S.

- | | |
|--|--|
| <i>Saldula saltatoria</i> L. | (Dst., 1974) |
| <i>Derephysia foliacea</i> Fall. | (Dst., 1974) |
| <i>Lasiacantha capucina</i> Germ. | (Rieger, 1981a) |
| <i>Tingis cardui</i> L. | (Schäfer, 1966) |
| <i>Tingis crispata</i> H.-S. | (Dst., 1974), (Rieger, 1981a) |
| <i>Copium clavicornis</i> L. | (Meess, 1907), (Dst., 1974), (Rieger, 1981a) |
| <i>Oncochila simplex</i> H.-S. | (Rieger, 1981a) |
| <i>Dictyla echii</i> Schr. | (Dst., 1974), (Rieger, 1981a) |
| <i>Deraeocoris ruber</i> L. | Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), Juni 1921 Lng.,
(Dst., 1974) |
| <i>Deraeocoris lutescens</i> Schill. | (Dst., 1974) |
| <i>Dicyphus errans</i> Wff. | (Dst., 1974) |
| <i>Dicyphus pallidus</i> H.-S. | (Dst., 1974) |
| <i>Campyloneura virgula</i> H.-S. | (Dst., 1974) |
| <i>Leptopterna dolobrata</i> L. | (Dst., 1974) |
| <i>Stenodema calcaratum</i> Fall. | Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), Juli 1933 Lng.,
(Dst., 1974) |
| <i>Stenodema laevigatum</i> L. | (Dst., 1974) |
| <i>Notostira elongata</i> Geoffr. | (Dst., 1974) |
| <i>Megaloceraea recticornis</i> Geoffr. | Juni 1931 Lng., (Dst., 1974) |
| ? <i>Trigonotylus ruficornis</i> Geoffr. | (Meess, 1900), (Dst., 1974) |
| <i>Phytocoris meridionalis</i> H.-S. | (R. & S., 1992) |
| <i>Phytocoris longipennis</i> Flor | (Dst., 1974) |
| <i>Phytocoris tiliae</i> F. | (Dst., 1974) |
| <i>Phytocoris singeri</i> E. Wgn. | (Dst., 1974) |

<i>Phytocoris ulmi</i> L.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Dst., 1974)
? <i>Phytocoris varipes</i> Boh.	(Dst., 1974)
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Adelphocoris lineolatus</i> Gz.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
<i>Adelphocoris seticornis</i> F.	Aug. 1899 Fischer, Juni 1931 Lng., (Dst., 1974)
* <i>Calocoris norvegicus</i> Gm.	Juni 1931 Lng.
* <i>Hadrodemus m-flavum</i> Gz.	Juni 1931 Lng.
<i>Stenotus binotatus</i> F.	(Dst., 1974)
? <i>Lygus gemellatus</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Lygus pratensis</i> L.	Aug. 1899 Fischer
? <i>Lygus pratensis</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Lygus rugulipennis</i> Popp.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
<i>Orthops campestris</i> L.	(Dst., 1974)
? <i>Orthops kalmii</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Pinalitus cervinus</i> H.-S.	(Dst., 1974)
? <i>Agnocoris spec.</i>	(Dst., 1974)
<i>Liocoris tripustulatus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Charagochilus gyllenhalii</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Polymerus holosericeus</i> Hhn.	(Dst., 1974)
<i>Polymerus micropthalmus</i> E. Wgn.	(Dst., 1974)
<i>Polymerus unifasciatus</i> F.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
<i>Capsus ater</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Capsodes gothicus</i> L.	Juni 1931 Lng., (Dst., 1974)
<i>Halticus apterus</i> L.	(Meess, 1900), (Dst., 1974)
<i>Halticus luteicollis</i> Pz.	(Dst., 1974)
<i>Reuteria marqueti</i> Puton	(Rieger, 1987)
<i>Pseudoloxops coccineus</i> Mey.-D.	(Dst., 1974)
<i>Orthotylus marginalis</i> Reut.	(Dst., 1974)
<i>Orthotylus interpositus</i> K. Schm.	(Dst., 1974)
<i>Orthotylus tenellus</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Orthotylus prasinus</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Blepharidopterus diaphanus</i> Kb.	(Dst., 1974)
<i>Dryophilocoris flavoquadrifasciatus</i> De G.	(Dst., 1974)
<i>Cyllecoris histrionicus</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Pilophorus confusus</i> Kb.	(Dst., 1974)
<i>Pilophorus perplexus</i> Doug. & Sc.	(Dst., 1974)
<i>Macrotylus herrichi</i> Reut.	(Meess, 1900), Juni 1931 Lng., (Dst., 1974)
<i>Macrotylus solitarius</i> Mey.-D.	(Dst., 1974)
<i>Harpocera thoracica</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Plagiognathus arbustorum</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> Wff.	(Dst., 1974)
<i>Plagiognathus albipennis</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Campylomma verbasici</i> Mey.-D.	Aug. 1899 Fischer, (Schäfer, 1966)
<i>Chlamydatus evanescens</i> Boh.	(Dst., 1974)
<i>Criocoris crassicornis</i> Hhn.	(Dst., 1974)

<i>Lepidargyrus ancorifer</i> Fieb.	(Günther, Rieger & Burghardt, 1982)
? <i>Psallus perrisii</i> Muls.	(Dst., 1974)
? <i>Psallus variabilis</i> Fall.	(Meess, 1907)
<i>Psallus cruentatus</i> Muls.	(Rieger, 1981b)
<i>Psallus lepidus</i> Fieb.	(Dst., 1974)
? <i>Psallus c. f. varians</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Eurycolpus flaveolus</i> Stål	(Meess, 1907)
<i>Phylus coryli</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Phylus melanocephalus</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Icodema infuscatum</i> Fieb.	(Dst., 1974)
<i>Megalocoleus molliculus</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Hoplomachus thunbergi</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Himacerus apterus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Aptus mirmicoides</i> O.C.	(Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Nabis ferus</i> L.	(Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Nabis pseudoferus</i> Rem.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
* <i>Nabis punctatus</i> A.C.	(Rieger, persönl. Mitteilung)
<i>Nabis rugosus</i> L.	(Dst., 1974)
? <i>Anthocoris minki</i> Dohrn	(Dst., 1974)
<i>Anthocoris nemoralis</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Anthocoris nemorum</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Orius niger</i> Wff.	(Dst., 1974)
? <i>Orius c. f. horvathi</i> Reut.	(Dst., 1974)
? <i>Orius laticollis</i> Reut.	(Dst., 1974)
? <i>Orius minutus</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Rhynocoris erythropus</i> L.	(Meess, 1907)
<i>Phymata crassipes</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Aradus cinnamomeus</i> Pz.	(Meess, 1907)
<i>Aradus truncatus</i> Fieb.	(Meess, 1907)
<i>Piesma maculatum</i> Lap.	(Dst., 1974)
<i>Berytinus clavipes</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Berytinus minor</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Nysius senecionis</i> Schill.	(Dst., 1974)
<i>Kleidocerys resedae</i> Pz.	(Dst., 1974)
<i>Cymus glandicolor</i> Hhn.	(Dst., 1974)
<i>Cymus melanocephalus</i> Fieb.	(Dst., 1974)
<i>Macroplox preyssleri</i> Fieb.	(Dst., 1974)
<i>Heterogaster urticae</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Platyplax salviae</i> Schill.	(Meess, 1907), (Dst., 1974)
<i>Tropistethus holosericeus</i> Sz.	(Meess, 1907), (Dst., 1974)
<i>Eremocoris plebejus</i> Fall.	(Meess, 1907)
<i>Eremocoris podagricus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Ischnocoris hemipterus</i> Schill.	(Meess, 1907), (Dst., 1974)
<i>Scolopostethus affinis</i> Schill.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900)
<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reut.	(Dst., 1974)

<i>Lasiosomus enervis</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Stygnocoris sabulosus</i> Schill.	(Dst., 1974)
<i>Acompus rufipes</i> Wff.	(Dst., 1974)
<i>Beosus maritimus</i> Scop.	(Dst., 1974)
<i>Raglius alboacuminatus</i> Gz.	(Dst., 1974)
<i>Peritrechus gracilicornis</i> Put.	(Dst., 1974)
<i>Megalonotus antennatus</i> Schill.	(Meess, 1907)
? <i>Megalonotus chiragra</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Aphanus rolandri</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Pterotmetus staphiliniformis</i> Schill.	(Dst., 1974)
<i>Pyrrhocoris apterus</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Dicranocephalus agilis</i> Scop.	(Meess, 1900), Juni 1897 Fischer
<i>Gonocerus acuteangulatus</i> Gz.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
<i>Syromastus rhombeus</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Coreus marginatus</i> L.	(Meess, 1900), (Dst., 1974)
<i>Ceraleptus gracilicornis</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Ceraleptus lividus</i> Stein	(Dst., 1974)
<i>Coriomeris denticulatus</i> Scop.	Aug. 1899 Fischer, (Dst., 1974)
<i>Alydus calcaratus</i> L.	Aug. 1930 Lng., (Dst., 1974)
<i>Corizus hyoscyami</i> L.	(Dst., 1974)
? <i>Rhopalus conspersus</i> Fieb.	(Meess, 1900), (Dst., 1974)
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schill.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Dst., 1974)
<i>Rhopalus subrufus</i> Gm.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Dst., 1974)
<i>Myrmus miriformis</i> Fall.	(Dst., 1974)
<i>Stictopleurus abutilon</i> Rossi	(Dst., 1974)
? <i>Stictopleurus crassicornis</i> L.	(Meess, 1907)
<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> Gz.	(Dst., 1974)
<i>Coptosoma scutellatum</i> Geoffr.	Juni 1931 Lng., (Dst., 1974)
<i>Legnotus limbosus</i> Geoffr.	(Meess, 1907), (Dst., 1974)
<i>Eurygaster maura</i> L.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Graphosoma lineatum</i> L.	(Meess, 1900), Aug. 1919 Frz., Aug. 1930, Juni 1931 & Juli 1933 Lng., (Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Aelia acuminata</i> L.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Neottiglossa leporina</i> H.-S.	(Dst., 1974)
<i>Eysarcoris fabricii</i> Kirk.	(Dst., 1974)
<i>Staria lunata</i> Hhn.	(Dst., 1974)
<i>Palomena prasina</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Palomena viridissima</i> Pd.	(Dst., 1974)
<i>Holcostethus sphaclatus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Holcostethus vernalis</i> Wff.	(Dst., 1974)
? <i>Carpocoris pudicus</i> Pd.	(Meess, 1900)
<i>Carpocoris purpureipennis</i> De G.	Juni 1931 Lng., (Dst., 1974)
<i>Carpocoris fuscispinus</i> Boh.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900)

<i>Dolycoris baccarum</i> L.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), (Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Eurydema oleraceum</i> L.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900), Aug. 1919 Frz., (Dst., 1974)
<i>Eurydema ornatum</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Piezodorus lituratus</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> Pd.	(Meess, 1907), (Schäfer, 1966), (Dst., 1974)
<i>Pentatoma rufipes</i> L.	(Dst., 1974)
<i>Arma custos</i> F.	(Dst., 1974)
<i>Elasmostethus minor</i> Horv.	(Dst., 1974)

5.8 „NSG Wildseemoor“ bei Wildbad

Für dieses 900 m ü. M. gelegene Hochmoorgebiet mit seinen 2 Seen sind nun insgesamt 45 Arten bekannt, von 35 Arten existieren Belege im SMNK. Drei Arten kommen in Baden-Württemberg nur hier vor (mit „*“ gekennzeichnet). Eine gründlichere Untersuchung des Gebietes kann leicht das Dreifache der bisherigen Artenzahl liefern.

<i>Notonecta obliqua</i> Gall.	Sep. 1949 Now. (Voigt, 1977c), (Kögel, 1983)
* <i>Notonecta reuteri</i> Hf.	(Voigt, 1977c)
<i>Cymatia bondsdorffii</i> C.Shlbg.	(Voigt, 1977c)
<i>Corixa punctata</i> Ill.	(Voigt, 1977c)
<i>Sigara nigrolineata</i> Fieb.	(Meess, 1907)
<i>Sigara distincta</i> Fieb.	Juli 1899 Fischer
<i>Sigara falleni</i> Fieb.	Aug. 1899 Fischer (Meess, 1900)
<i>Sigara fossarum</i> Lch.	(Meess, 1900)
<i>Sigara lateralis</i> Lch.	Juli 1899 Fischer, (Voigt, 1977c)
<i>Hebrus ruficeps</i> Thoms.	Sep. 1951 Now. (Voigt, 1977c)
<i>Microvelia reticulata</i> Burm.	(Voigt, 1977c)
<i>Velia caprai</i> Tam.	(Voigt, 1977c)
* <i>Gerris costae</i> H.-S.	(Voigt, 1971)
<i>Gerris gibbifer</i> Schumm.	Juli 1949 & Juni 1951 Now. (Voigt, 1977c)
<i>Gerris odontogaster</i> Zett.	Juli 1949 Now. (Voigt, 1977c)
<i>Gerris thoracicus</i> Schumm.	Juli 1949 Now.
* <i>Salda henschi</i> Reut.	Juli 1949 & 1952 Now., (Voigt, 1977c)
<i>Saldula opacula</i> Zett.	(Voigt, 1983)
<i>Saldula saltatoria</i> L.	Juli 1949 & 1952 Now.
<i>Acalypta nigrina</i> Fall.	Juni 1950 Now.
<i>Stenodema holsatum</i> F.	Juni 1950 Now.
<i>Phytocoris dimidiatus</i> Kb.	Juni 1950 Now.
<i>Calocoris striatellus</i> F.	Juni 1986 Wallner
<i>Calocoris alpestris</i> Mey.-D.	Juni 1950 Now.
<i>Dichroscytus rufipennis</i> Fall.	Juni 1950 Now.
<i>Orthops basalis</i> A.C.	Juli 1952 Now.
<i>Capsus ater</i> L.	Juni 1950 Now.
<i>Cremnocephalus alpestris</i> E.Wgn.	Juni 1950 Now.

<i>Nabis ericetorum</i> Sz.	Juni 1950 Now.
<i>Anthocoris confusus</i> Reut.	Juni 1961 Now.
<i>Anthocoris nemoralis</i> F.	Juni 1955 Now.
<i>Anthocoris nemorum</i> L.	Juni 1950 & 1961 Now.
<i>Acomporis alpinus</i> Reut.	Juni 1961 Now.
<i>Aradus betulinus</i> Fall.	Juli 1949 & Juni 1951 Now.
<i>Aradus cinnamomeus</i> Pz.	Juni 1951 Now.
<i>Kleidocerys resedae</i> Pz.	Juni 1951 Now.
<i>Cymus aurescens</i> Dist.	Sep. 1948 Now.
<i>Drymus brunneus</i> F. Shlbg.	Sep. 1949 & 1951 Now.
<i>Drymus ryeii</i> Doug. & Sc.	Juni & Sep. 1951 Now.
<i>Eremocoris plebejus</i> Fall.	Juli & Sep. 1949 & Sep. 1951 Now.
<i>Gastrodes abietum</i> Bgrt.	(Voigt, 1977c)
<i>Scolopostethus decoratus</i> Hhn.	Juni 1950 & Sep. 1951 Now.
<i>Macrodera micropterum</i> Curt.	Sep. 1948, Juli & Sep. 1949 & Sep. 1951 Now.
<i>Chlorochroa pinicola</i> Muls. & Rey	Juni 1951 Now.
<i>Dolycoris baccarum</i> L.	Juni 1986 M. Wallner

5.9 Wutachschlucht im Südschwarzwald

Kless (1961) gibt eine Liste von 176 Wanzenarten für die Wutachschlucht. 44 Arten waren im SMNK in den Jahren 1928 bis 1950 von Becker, Kneucker, Leininger und Stritt in diesem Gebiet gesammelt worden, 4 davon wurden später von Kless nicht gefunden:

- Calocoris roseomaculatus* (De Geer, 1773)
- Raglius vulgaris* (Schilling, 1829)
- Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)
- Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)

Da zu dieser Zeit *Carpocoris purpureipennis* DeG. und *Carpocoris pudicus* Pd. noch nicht sauber zu trennen zu waren, nehme ich an, daß bei der Meldung von *C. pudicus* Pd. bei Kless (1961) *C. purpureipennis* DeG. gemeint war, da damals der seltene *C. pudicus* Pd. als die häufige Art galt.

In der SMNK gibt es Belege beider Arten aus der Wutachschlucht, neu bezüglich der Liste ist jedoch *C. purpureipennis* DeG. Die Meldung von *R. distinctus* Sign. beruhte auf einer damals nicht anders möglichen Fehldetermination, so daß mit dem Fund von *Jalla dumosa* L. (Schmid, 1965a) nun insgesamt 180 Arten aus der Wutachschlucht bekannt sind.

5.10 „NSG Spitzberg“ bei Tübingen (UTM: NU07SW)

In der SMNK waren 8 Arten mit Fundort Spitzberg vorhanden, 2 dieser Arten sind nicht in der Liste von Schwoerbel (1966) vermerkt: *Canthophorus impressus* Horv. und *Carpocoris purpureipennis* DeG. *C. impressus* Horv. wird später von Rieger & Strauß (1992) gemeldet. Das Fehlen von *C. purpureipennis* in der Arbeit von Schwoerbel (1966), beruht darauf, daß damals die Arbeit von Tamanini (1958) noch nicht so große Verbreitung gefunden hatte und die Meldungen von *C. pudicus* Pd. sich wohl auf *C. purpureipennis* DeG. beziehen.

6. Gesamtartenliste

Bei fast allen Fundorten ist der 10 x 10 km Quadrant des UTM-Gitters angegeben, bei den meisten Fundorten ließ sich ebenso der 5 x 5 km Quadrant (SO, SW, NO, NW) ermitteln. Alle aufgelisteten Tiere befinden sich in der entomologischen Abteilung des SMNK. Den Fundorten ist das jeweilige KFZ-Zeichen des Landkreises vorangestellt. In der Artenliste bedeutet z.B. die Angabe „3/4“ nach dem Datum: 3 Männchen und 4 Weibchen. Alle Tiere sind von mir persönlich determiniert, „Fremddeterminationen“ sind vermerkt.

Die Reihenfolge in der folgenden Artenliste und auch die Aufstellung der Sammlung richtet sich nach Günther & Schuster (1990), wobei zwischenzeitlich einige Änderungen auftraten:

1. *Pachycoleus* gilt inzwischen als Untergattung von *Cryptostemma* (Aukema & Rieger, im Druck).

2. Die Subspecies von *Nepa cinera* L. wurden eingezogen (Polhemus, Nieser & Keffer, 1994).

3. Bereits Andersen (1982) führt *Limnopus* als eigene Gattung, in Günther & Schuster (1990) wurde dies übersehen und *Limnopus* wurde weiter als Untergattung von *Gerris* geführt.

4. *Aquarius* Schell. gilt inzwischen als eigene Gattung (Andersen, 1990).

5. Die Ausgliederung des bisherigen Subgenus *Melanotrichus* aus *Orthotylus* und dessen Erhebung zu einem eigenen Genus (Henry & Froeschner, 1988).

6. *Psallus ancorifer ancorifer* Fieb. wird aus der Gattung *Psallus* und der Untergattung *Apocremnus* ausgegliedert und der Gattung *Lepidargyrus* (Muminov, 1962) zugezogen, die Subspecies erhalten Artrang (Drapolyuk, 1993).

7 Die Arten der Gattungen *Lyctocoris* werden aus den *Anthocoridae* ausgegliedert

und bilden eine eigene Familie, die *Lyctocoridae*, die nun zwischen *Anthocoridae* und *Cimicidae* steht (Schuh & Stys, 1991).

8. Die Einteilung der Gattung *Nysius* in Subgenera durch Wagner (1958) ist wieder aufgehoben; die Einziehung erfolgte durch Schmitz & Péricart (1993).

9. Die Eingliederung von *Brachycarenum* als Subgenus von *Rhopalus* ist wieder rückgängig gemacht und *Brachycarenum* gilt als eigene Gattung (Moulet, 1991).

11. Die Aufspaltung der Gattung *Holcostethus* in die Untergattungen *Dryocoris* und *Holcostethus* ist aufgehoben. *H. sphaclatus* F. bleibt in der Gattung *Holcostethus*, während *H. vernalis* Wff. zur Gattung *Dryocoris* fällt (Ribes & Schmitz, 1992).

Die vorliegende Liste existiert sowohl als Text- und DBF-datei (für das Programm SoftCol 3,1) – die DBF-Datei auch mit den MTB-Einträgen.

Das Programm kann bei Herrn G. Strauß in Biberach/Riß, Mozartstr. 4, die Text- und DBF-Datei beim Autor bezogen werden und ist im SMNK hinterlegt.

Dipsocoridae

Cryptostemma (Pachycoleus) waltli Fieber, 1860

Versteckt in nassem Moos lebende Art die nur bei intensiver Suche im *Sphagnum* oder in Bodenfallen gefunden wird. In Baden-Württemberg bisher 5 Fundpunkte (Kless, 1961; Rieger, 1987 u. 1989a; Heckmann, 1991).

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 11.08.1954, 1/0 NOW. leg.

Nepidae

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 2 Ex. coll. FISCHER.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Sep.1932, 1 Ex. BECKER leg.

MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
25.09.1898, 1 Ex. coll. FISCHER (Meess, 1900).

23.04.1899, 1 Ex. coll. FISCHER.

KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,

19.03.1899, 1 Ex. coll. FISCHER.

12.04.1926, 3 Ex. LEININGER leg.

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald,
03.04.1899, 1 Ex. coll. FISCHER.

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, um 1897, 1 Ex. coll. FISCHER (Meess, 1900).

MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
13.03.1899, 1 Ex. coll. FISCHER (Meess, 1900).

Naucoridae

Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758)

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.04.1925, 1/0 LEININGER leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden
29.04.1923, 0/1 LEININGER leg.
Juli 1936, 1/0 EIDEL leg.

MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 01.04.1900,
1/0 coll. FISCHER.

KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
19.03.1899, 1/4 coll. FISCHER (Meess, 1900).

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 28.04.1897, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).

KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
28.07.1964, 2/2 1 Larve EBERT leg.

NU51NO BC, Biberach, Oberessendorf, Wildes
Ried, 07.08.1980, 2 Larven FREY leg.

Pleidae

Plea minutissima Leach, 1817

MV42SW RA, Karlsruhe, Au am Rhein, 09.05.1925,
1 Ex. LEININGER leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 31.03.1948,
1 Ex. NOW. leg.

MV64SW KA, Karlsruhe, Graben, 18.06.1899, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).

Notonectidae

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758

MV41SW RA, Rastatt, 21.04.1900, 1/0 coll.
FISCHER.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
Juni 1924, 1/0 LEININGER leg.
Dez.1926, 7/5 LEININGER leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden
14.05.1922, 1/0 LEININGER leg.
10.09.1932, 2/0 LEININGER leg.

MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 27.08.1899,
1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark
15.07.1897, 1/0 coll. FISCHER.
12.03.1898, 1/0 coll. FISCHER.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 08.04.1898, 1/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 05.07.1898, 1/0
coll. FISCHER.

KA, Karlsruhe, Durlacher Wald
03.04.1897, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).

30.07.1898, 0/2 coll. FISCHER.

MV62SW KA, Karlsruhe, Durlach, Hohenwetters-
bach, 24.04.1898, 1/1 coll. FISCHER.

NU51NO BC, Biberach, Oberessendorf, Wildes
Ried, 07.08.1980, 0/1 FREY leg.

Notonecta obliqua Gallen, 1787

MU11NW FR, Freiburg, Juni 1951, 0/1 RABE leg.

MU33SO VS, St. Georgen, Schonach, Blindensee,
01.08.1935, 0/1? leg.

MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899,
0/1 coll. FISCHER.

MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 28.09.1949,
3 Ex. NOW. leg. (Voigt, 1977c).

Corixidae

Cymatia coleoprata (Fabricius, 1794)

MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen
19.03.1899, 3/3 coll. FISCHER (Meess,
1900).

03.04.1899, 1/2 coll. FISCHER.

- Callicorixa praeusta praeusta* (Fieber, 1848)
- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 2/10 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 01.09.1966, 0/1 am Licht, NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 21.07.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg. 20.06.1965, 0/1 am Licht, NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 15.07.1965, 2/0 am Licht, NOW. leg.

Corixa dentipes (Thomson, 1869)

In Baden-Württemberg zuerst in den 70-iger Jahren nachgewiesen: Kirchheim (Rieger, 1972) und Niederhausen im LSG Taubergießen (Schmid, 1972). Dann erst wieder bei Sigmaringen (Löderbusch, 1984) und in Oberschwaben (Strauß, 1987 und Löderbusch, 1989) gefunden.

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, April 1946, 0/1 NOW. leg.

Corixa punctata (Illiger, 1807)

- MU11NW FR, Freiburg, Juni 1951, 1/0 RABE leg.
- MV62SW KA, Karlsruhe, Durlach, Hohenwettersbach, 24.04.1898, 1/8 coll. FISCHER.

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)

- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 27.08.1899, 0/2 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 19.03.1899, 0/4 coll. FISCHER.

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)

- MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 30.03.1932, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 01.04.1900, 0/2 coll. FISCHER.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark 15.07.1897; 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
12.03.1898, 1/0 coll. FISCHER.
- MV54NO KA, Karlsruhe, Rußheim, 17.07.1986, 1/0 WALLNER leg.

Sigara (Retrocorixa) semistriata (Fieber, 1848)

Diese Art wurde in Baden-Württemberg bisher nur in oberschwäbischen Riedgewässern gefunden (Strauß, 1987; Löderbusch, 1989 und Grimm, 1994), kommt dort aber in großer Individuenzahl vor.

- NU51NO BC, Oberessendorf, Wildes Ried, 07.08.1980, 2/2 FREY leg.

Sigara (Sigara) striata (Linnaeus, 1758)

- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 1/8 NOW. leg.

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 18.07.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg. 12.08.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg.

- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein 29.08.1899, 1/3 coll. FISCHER. 01.11.1899, 0/1 coll. FISCHER. KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 0/1 BECKER leg.

- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald, 03.04.1897, 1/0 coll. FISCHER.

Sigara (Subsigara) distincta (Fieber, 1848)

- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 4/1 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor 04.07.1899, 0/4 coll. FISCHER. 14.07.1899, 0/3 coll. FISCHER.

Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848)

- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 1/1 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 12.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 18.07.1963, 0/1 am Licht, NOW. leg. 20.06.1965, 1/0 am Licht, NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 06.09.1947, 0/1 NOW. leg.

Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817)

- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 8/10 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 10.07.1899, 1/1 coll. FISCHER.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 01.08.1965, 0/1 am Licht, NOW. leg. 27.07.1969, 2/0 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 17.04.1946, 0/1 NOW. leg.
- MV62SW KA, Karlsruhe, Hohenwettersbach, 24.04.1898, 2/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

Hebridae

Hebrus (Hebrusella) ruficeps Thomson, 1871

Diese wahrscheinlich weit verbreitete Art wurde von Voigt (1971) erstmalig in Baden gefunden. Auch die untenstehenden Funde wurden bereits durch Voigt (1977c) veröffentlicht.

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 2/1 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 29.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 13.10.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 16.07.1955, 2/1 NOW. leg.

Hydrometridae

- Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, Aug. 1934, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 22.01.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, Juli 1947, 0/2 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
09.10.1898, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
01.10.1921, 2/2 1 Larve LEININGER leg.
08.06.1933, 1/4 LEININGER leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
30.04.1952, 0/2 NOW. leg.

Veliidae


- Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., in Pfütze am Rhein,
19.04.1937, 0/1 BAL. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 31.03.1948,
1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1951, 0/2 NOW. leg.
- Velia (Plesiovelia) caprai* Tamanini, 1947
- Beide Funde in Meess (1900) als *Velia currens* F. gemeldet. Beide gefundene *Velia*-Arten lassen sich am besten mit Poisson (1957) voneinander unterscheiden.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899,
0/4 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.

Velia (Plesiovelia) saulii saulii Tamanini, 1947 (Karte 6)

- Tamanini (1955) meldete diese Art erstmalig für Baden aus dem Kaiserstuhl, ein weiterer Nachweis im LSG Taubergießen (Schmid, 1972) und 2 zusätzliche durch Voigt (1971). Kögel (1983) gibt einen weiteren Fundort bei Graben bei Karlsruhe. Die beiden folgenden Funde in Meess (1900) als *Velia currens* F. gemeldet
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
1899, 3/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899,
2/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV41NO RA, Rastatt, Bietigheim, Federbach,
24.02.1923, 0/1 LEININGER leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, Sommer 1950, 0/1 coll. MÜLLER.

Gerridae

- Limnopus rufoscutellatus* (Latreille, 1807)
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, April 1927, 1/0 LEININGER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 10.09.1932,
0/1 LEININGER leg.
- Aquarius najas* (De Geer, 1773)
- Alle untenstehenden Funde durch bereits durch Voigt (1977c) veröffentlicht.
- MU49SO RA, Gernsbach, Forbach, Herrenwieser See, 13.05.1921, 1/1 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Moosalbtal
20.06.1924, 0/5 BECKER leg.
30.06.1930, 1/0 LEININGER leg.
20.06.1934, 5/0 BECKER leg.
- Aquarius paludum* (Fabricius, 1794)
- MU49SO RA, Gernsbach, Forbach, Herrenwieser See
13.05.1921, 1/2 LEININGER leg.
(Voigt, 1977c)
April 1923, 0/2 LEININGER leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 22.04.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 25.09.1898,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut
01.05.1898, 0/1 coll. FISCHER.
12.11.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald,
04.05.1925, 0/1 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Eilmorgenbruch,
29.04.1900, 1/0 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert,
09.05.1921, 1/1 LEININGER leg.
- Gerris (Gerris) argentatus* Schummel, 1832
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 15.04.1900,
0/2 coll. FISCHER (Meess, 1907).
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 19.03.1899,
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- Gerris (Gerris) gibbifer* Schummel, 1832
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juli 1947,
2/2 BECKER leg.
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 2/1 NOW. leg.
FR, Todtnau, Feldberg, Baldenschwand,
Juni 1952, 0/1 NOW. leg. (Voigt, 1977c).
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899,
2/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.1899,
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).



Karte 6. *Velia saulii*
Tamanini, 1947. Baden-
württembergische Fundor-
te in der Sammlung des
SMNK.

- | | | | |
|---|--|--------|--|
| MU47NW | OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 2/5 coll. FISCHER (Meess, 1900). | MU11NW | FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). |
| MU69NW | CW, Wildbad, Wildseemoor 20.07.1949, 3/3 NOW. leg. (Voigt, 1977c). 14.06.1951, 1/2 NOW. leg. (Voigt, 1977c). | MU47NW | OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 2/3 coll. FISCHER (Meess, 1900). |
| MV50SO | RA, Gernsbach, Teufelsmühle, 03.06.1959, 0/1 NOW. leg. (Voigt, 1977c). | MU49SO | RA, Gernsbach, Forbach, Herrenwieser See, 13.05.1921, 1/1 LEININGER leg. |
| MV51SO | KA, Karlsruhe, Marxzell, 11.08.1954, 1/0 NOW. leg. | MU61 | VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“, Aug. 1928, 1/0 BECKER leg. |
| | | MV41SW | RA, Rastatt, 22.04.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). |
| | | | RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). |
| <i>Gerris (Gerris) lacustris</i> (Linnaeus, 1758) | | MV51SO | KA, Karlsruhe, Marxzell, 11.08.1954, 1/2 NOW. leg. |
| MT59NW | WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juli 1947, 0/2 BECKER leg. | MV52NW | KA, Karlsruhe, Daxlanden, 11.05.1922, 1/2 LEININGER leg. |
| MT69NW | VS, Blumberg, Achdorf, 12.08.1939, 0/2 LEININGER leg. | | |
| MU11NO | FR, Freiburg, Oberau, Kartaus, 05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). | | |

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 12.12.1956, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 16.04.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 27.08.1899, 0/1 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 12.04.1926, 2/0 LEININGER leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/1 coll. FISCHER.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Elfmorgenbruch, 29.06.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- NU51NO BC, Biberach, Oberessendorf, Wildes Ried, 07.08.1980, 1/1 FREY leg.
- Gerris (Gerris) odontogaster* (Zetterstedt, 1828)
- MU59SO RA, Gernsbach, Forbach, Hohlohsee, 29.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 20.07.1949, 2/3 NOW. leg. (Voigt, 1977c).
- MV41SW RA, Rastatt, 22.04.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 0/1 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 03.04.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- Gerris (Gerris) thoracicus* (Schummel, 1832)
- MU11NO FR, Freiburg, Oberau, Kartaus, 05.08.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU11NW FR, Freiburg, 05.07.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 20.07.1949, 1/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 22.03.1927, 0/3 LEININGER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert, 09.05.1923, 0/1 LEININGER leg.
- Saldidae**
- Salda henschii* (Reuter, 1891)
- Vom gleichen Fundort bereits von Voigt, (1977c und 1983) veröffentlicht, sonst keine weiteren Fundorte in Baden-Württemberg bekannt.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
20.07.1949, 5/7 NOW. leg.
10.07.1952, 8/9 NOW. leg.
- Chartoscirta cincta* (Herrich-Schaeffer, 1842)
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
18.02.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
April 1946, 0/2 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
05.06.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
03.09.1967, 0/1 angefliegen, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, an der Alb,
27.07.1947, 0/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
20.11.1947, 0/2 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
20.07.1952, 1/2 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.04.1900,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
Sep. 1947, 0/1 NOW. leg.
17.11.1948, 3/2 NOW. leg.
16.11.1949, 2/1 NOW. leg.
01.11.1950, 0/1 NOW. leg.
26.10.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 2/0 NOW. leg.
- Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835)
- MV50SO CW, Bad Herrenalb, Plotzsägmühle,
08.09.1954, 1/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 11.08.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, Albufer
Juli 1947, 1/0 NOW. leg.
Aug. 1947, 2/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
Sep. 1947, 0/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald,
03.06.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- Saldula arenicola* (Scholtz, 1846)
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 21.04.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, April
1946, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
04.07.1957, 0/1 NOW. leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
28.04.1948, 1/0 NOW. leg.
- Saldula c-album* (Fieber, 1859)
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/2 NOW. leg.
- MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliiffkopf, 15.07.1959, 0/1 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
22.01.1899, 2/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
28.01.1900, 1/4 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900,
1/0 coll. FISCHER.
- MV68SW MA, Mannheim, City, Rheinstrand,
15.06.1934, 0/1 in copula, BAL. leg.

Saldula melanoscela (Fieber, 1859)

- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
22.01.1899, 0/4 coll. FISCHER (Meess,
1907).
28.01.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1907).
April 1946, 5/4 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, Juni 1946, 1/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
April 1946, 4/1 NOW. leg.
Juni 1946, 0/1 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
Sep. 1947, 0/1 NOW. leg.

Saldula opacula (Zetterstedt, 1839)

- Voigt (1983) meldet diese Art zum ersten Mal für
Baden-Württemberg vom Wildsee im Schwarzwald
und vermutet eine Verbreitung in Süddeutschland als
Mittelgebirgsbewohner. Untenstehende Funde wider-
sprechen dieser Vermutung, ebenso ein Nachweis
dieser Art bei Straßburg (Péricart, 1990)
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
17.11.1948, 10/12 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 1/1 NOW. leg.

Saldula orthochila (Fieber, 1859)

Von dieser Art liegen einige Nachweise aus Baden-
Württemberg vor: Schopflocher Halbinsel (Rieger,
1979a), Belchen (Rieger, 1989 b), Ochsenwang
(Schuster, 1979), Umgebung von Nürtingen (Rieger,
1975), die Wutachschlucht (Kless, 1961) und um 1900
bei Ulm (Lampert, 1897 u. Rieger, 1972).

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 04.10.1927, 0/1
HOHNDORF leg.
- Saldula pallipes* (Fabricius, 1794)
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
17.11.1948, 2/2 NOW. leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
April 1948, 0/1 NOW. leg.

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

- LU92NO FR, Breisach, Obere faule Waag,
10.06.1923, 0/1 LEININGER leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, im Spha-
gnum, 08.10.1931, 1/0 BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
20.07.1949, 0/1 NOW. leg.
10.07.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 18.02.1900, 1/0
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Jan. 1946, 0/1
NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden,
10.08.1947, 0/1 NOW. leg.
17.07.1952, 2/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 12.12.1956, 0/1
NOW. leg.

- KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, April
1946, 2/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.07.1952, 2/0 NOW. leg.
01.12.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
17.11.1948, 4/3 NOW. leg.
16.11.1949, 1/1 NOW. leg.
26.10.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV81NW PF, Niefern, Enzrücken, 03.09.1986, 0/1
WALLNER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
"Waldrandmoos", 31.03.1932, 0/1 BAL. leg.
"Waldrandmoos", 21.03.1934, 1/0 BAL. leg.
"Wasserloch ausgetr.", 04.07.1934, 1/0
BAL. leg.

Tingidae

Acalypta carinata (Panzer, 1806)

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 25.05.1955, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen
27.07.1955, 0/1 NOW. leg.
08.08.1956, 0/1 NOW. leg.
- MV77SO HD, Heidelberg, City, 28.05.1956, 0/1
NOW. leg.

Acalypta musci (Schrank, 1781)

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Nordseite, Stein-
weg, 11.06.1952, 1/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
13.10.1954, 1 Larve NOW. leg.
03.11.1954, 1 Larve NOW. leg.
17.08.1955, 0/1 NOW. leg.
26.10.1955, 2/1 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb
16.07.1955, 0/1 NOW. leg.
06.03.1957, 3/2 NOW. leg.
- MV77SO HD, Heidelberg, City, 28.05.1956, 0/1
NOW. leg.

Acalypta nigrina (Fallén, 1807)

- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950,
2/1 NOW. leg.

Acalypta parvula (Fallén, 1807)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, Juni 1953, 3/0
NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 17.09.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 13.10.1954, 2/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
12.10.1949, 1/1 3 Larven NOW. leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg,
01.10.1988, 2/1 HASSLER leg.
KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern,
01.10.1988, 0/1 HASSLER leg.

- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 0/1 NOW. leg.
NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, "Schlehen-
bodenstreu", 23.08.1935, 0/1 BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, "Kiefern-
randmoos", 07.08.1935, 0/1 BAL. leg.

Acalypta platycheila (Fieber, 1844)

Von dieser Art gibt es bisher nur 2 sichere Fundorte in Baden-Württemberg: das Aachried bei Radolfzell (Rieger, 1981a) und das Wollmatinger Ried bei Konstanz (Heckmann, 1990). Die Nachweise von Schmid (1972) und Voigt (1978) beruhen auf Fehldeterminationen. Erst Péricart (1978) gibt sichere Determinationsmerkmale.

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1953, 0/1
NOW. leg.

Dictyonota fuliginosa Costa, 1853

- MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt
26.08.1933 und 12.9.1933, je 0/1 an
Sarothamnus, BAL. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
22.06.1966, 0/1 NOW. leg.

Dictyonota strichnocera Fieber, 1844

Erstnachweis dieser an Ginster lebenden Art durch Voigt (1977b) für zwei Fundorte in der Umgebung von Karlsruhe. Sonst keine weiteren Funde in Baden-Württemberg.

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Juni 1946, 0/1
NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
30.08.1950, 0/2 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
21.07.1954, 0/1 NOW. leg.

Kalama tricornis Schrank, 1801

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 17.09.1952, 0/1 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
30.08.1950, 2/3 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
19.08.1953, 0/3 NOW. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
Grashang, 19.07.1935, 0/1 am Boden,
BAL. leg.
Wiese, 21.07.1935 und 28.07.1935,
1/0 am Boden, BAL. leg.

Galeatus maculatus (Herrich-Schaeffer, 1838)

- MU11NW FR, Freiburg
18.06.1948, 1/1 OUTIN leg.
13.06.1950, 0/1 OUTIN leg.

Galeatus spinifrons (Fallén, 1807)

- NU37NO ES, Lenningen, Gutenberg, 06.07.1979,
0/1 RIEGER leg. & det.

Stephanitis rhododendri Horváth, 1905

Aus der Literatur ist von dieser an Rhododendron lebenden Art in Baden-Württemberg bisher nur der Fundort Heidelberg aus der Sammlung Eckerlein bekannt (Péricart, 1983), hierauf bezieht sich eventuell auch die Angabe "Baden" von Wagner (1967). Bei einem untenstehenden Tier stimmt Fundort und -datum überein. Ein neuerer Fund (1988) dieser zu Beginn dieses Jahrhunderts aus Nordamerika eingeschleppten Art in einem Park in Schramberg im Schwarzwald (E. Zohren leg., unveröffentlicht).

- MU18SW OG, Kehl a. R., 17.07.1937, 5/1 BAL. leg.
MU38NW OG, Achern
21.07.1931, 1/0 BAL. leg.
21.07.1937, 4/5 BAL. leg.
MV77SO HD, Heidelberg, City, 28.07.1936, 1/0? leg.

Tingis (Tingis) ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

- MU18SW OG, Kehl a. R.
07.06.1939, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg.
14.06.1939, 1/5 an *Cirsium*, BAL. leg.

Tingis (Tingis) cardui Linnaeus, 1758

- MU29SW OG, Achern, Rheinau
25.06.1934, 0/2 an *Cirsium eriophorum*,
BAL. leg.
26.06.1934, 1/1 an *Cirsium eriophorum*,
BAL. leg.
02.07.1934, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
14.06.1950, 1/0 NOW. leg.
27.11.1957, 1/0 NOW. leg.
MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
16.11.1949, 1/0 NOW. leg.
01.11.1950, 0/1 NOW. leg.
MV74SW KA, Bruchsal, Spiegelberg, Ruderalfläche,
13.05.1988, 0/2 KUSSMAUL leg.
NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach,
20.07.1935, 1/0 an *Cirsium*, BAL. leg.
NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel
21.07.1934, 3/0 an *Cirsium erioph.*,
BAL. leg.
03.08.1934, 1/0 an *Cirsium lanceol.*,
BAL. leg.
NV37NW MOS, Osterburken, 25.05.1934, 3/2 an
Cirsium, BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
05.08.1932, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
19.08.1932, 4/0 an *Pinus*, BAL. leg.
31.07.1945, 0/1 an *Carduus*, BAL. leg.
19.08.1949, 1/0 an *Cirsium*, BAL. leg.
22.08.1949, 1/0 an *Cirsium*, BAL. leg.

05.09.1949, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg.
 28.09.1949, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg.
 MOS, Adelsheim, Hergenstadt,
 01.08.1935, 1/2 an *Cirsium palustris*,
 BAL. leg.

Tingis (Tingis) crispata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Diese Art war bisher in Baden-Württemberg nur vom Isteiner Klotz bekannt (Duderstadt, 1974 & Rieger, 1981a). Weitere unveröffentlichte Funde aus dem Hegau und bei Pforzheim. Vermutlich ist diese an *Artemisia* lebende Art häufiger als die wenigen Funde vermuten lassen. In Württemberg allerdings noch nicht gefunden.

MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler
 29.08.1933, 3/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
 30.08.1933, 2/0 an *Artemisia*, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.04.1968, 1/0
 am Licht, NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 06.04.1949, 0/1 NOW. leg.

Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 1825

MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 RIEGER
 det., coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 29.07.1949, 2/0
 OUTIN leg.

Tingis (Tropidocheila) reticulata (Herrich-Schaeffer, 1835)

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 05.03.1953, 0/1 NOW. leg.
 MV63NO KA, Bruchsal, Habichtsbuckel u. Weiher-
 tal, 07.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.

Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)

Alle unten aufgeführten Funde dieser Art wurden bereits von Rieger (1987) als Erstnachweis für Baden-Württemberg veröffentlicht.

MU29SW OG, Achern, Rheinau
 29.05.1934, 0/5 an *Eryngium*, BAL. leg.
 06.06.1934, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
 MV68SO MA, Mannheim, Käfertal
 09.06.1934, 1/3 an *Eryngium*, BAL. leg.
 13.06.1934, 0/3 an *Eryngium*, BAL. leg.

Catoplatus fabricii (Stål, 1868)

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 06.04.1949, 0/1 NOW. leg.
 NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 25.07.1934,
 0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
 05.03.1934, 0/2 unter Kiefernmoos,
 BAL. leg.
 24.03.1934, 1/0 unter Kiefernmoos,
 BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 31.03.1932, 0/1 in "Waldrandmoos",
 BAL. leg.

26.02.1934, 0/1 in Kiefernrandmoos,
 BAL. leg.
 Wiese, 23.07.1935, 5/2 am Boden,
 BAL. leg.
 Wiese, 28.07.1935, 3/2 am Boden, BAL. leg.
 05.08.1935, 1/0 unter *Ononis*, BAL. leg.

Copium clavicornis (Linnaeus, 1758)

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, Juni 1953, 1/1
 NOW. leg.
 MV78NO HD, Weinheim/B., Juni 1953, 1/3 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
 15.06.1949, 3/0 NOW. leg.

Copium teucryi (Host, 1788)

Eindeutig seltener als ihre Schwesterart.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, Juni 1953, 2/0
 NOW. leg.

Physatocheila costata (Fabricius, 1794)

MU18SW OG, Kehl a. R., 03.05.1937, 0/1 an *Alnus*,
 BAL. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 26.10.1951, 1/0 NOW. leg.

Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, Okt. 1948, 1/0
 NOW. leg.
 NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt 06.09.1933, 0/1
 an *Prunus domestica*, BAL. leg.
 06.09.1935, 0/1 an *Prunus domestica*,
 BAL. leg.

Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)

MU29SW OG, Achern, Rheinau
 30.05.1934, 1/1 an *Eryngium*, BAL. leg.
 06.06.1934, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
 MV78NO HD, Weinheim/B.
 30.06.1946, 2/0 NOW. leg.
 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.
 NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 06.09.1933, 0/1
 an Zwetschge, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Waldrand,
 15.04.1934, 1/1 in Kiefernmoos, BAL. leg.

Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1835)

MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1949, 0/1 OUTIN leg.

Dictyla echi (Schrank, 1782)

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 06.05.1958, 1/1
 NOW. leg.
 MU11NW FR, Freiburg
 25.07.1900, 4/9 coll. FISCHER (Meess,
 1907).
 24.04.1948, 0/1 OUTIN leg.
 MU18SW OG, Kehl a. R., 13.01.1939, 2/1 an *Acer*
pseudoplatanus (Borke), BAL. leg.

- MU29SW OG, Achern, Rheinau
28.05.1934, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
29.05.1934, 1/1 an *Echium*, BAL. leg.
26.06.1934, 1/7 an *Echium*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 19.06.1950, 2/0
NOW. leg.

Dictyla humuli (Fabricius, 1794)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 30.06.1934, 1/0 an
Echium, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 08.08.1949, 1/0
OUTIN leg., in coll. NOW.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 0/1
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
10.11.1950, 0/3 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
01.11.1950, 4/6 NOW. leg.
16.11.1950, 0/1 NOW. leg.
26.10.1951, 1/0 NOW. leg.
17.04.1957, 1/0 NOW. leg.

Agramma ruficorne (Germar, 1835)

- NU02NO SIG, Gutenstein/Donau, 1930, 1/0
HANDLIRSCH leg., in coll. NOW.

Microphysidae

Loricula elegantula (Baerensprung, 1858)

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 15.05.1956, 1/0
NOW. leg.

Myrmedobia coleoprata (Fallén, 1807)

- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 11.06.1951,
1/0 NOW. leg.

Miridae

Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes
(Herrich-Schaeffer, 1842)

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 21.06.1954, 3/0
am Licht, NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
21.07.1933, 0/1 an *Larix*, BAL. leg.

Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger (Hahn, 1834)

Der Erstnachweis dieser Art für Baden-Württemberg gelang erst 1989 bei Hockenheim (Rieger & Strauß, 1992), die beiden folgenden Funde legen eine weitere Verbreitung in der Oberheinebene nahe; offenbar kommt diese Art dort schon lange vor. Ebenfalls aus dem Elsaß (Ehanno, 1987) und dem Mittelrheingebiet (Zebe, 1971) bekannt.

- MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt,
26.08.1933, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 23.06.1931, 0/1 LEININGER leg.

Deraeocoris (Deraeocoris) morio (Boheman, 1852)

Erstnachweis durch Wagner (Engel & Weidner, 1952) am Badberg im Kaiserstuhl. Weitere Nachweise bei Ochsenwang (Schuster, 1981 und 1986), Blaubeuren und Schelklingen (Hüeber, 1894-1913). Der Beleg der Meldung von *D. scutellaris* F. (Meess, 1907) erwies sich als *D. morio* (Boh.). Das Tier von der Hornsgrinde (Meess, 1907) war im SMNK nicht mehr auffindbar. Inzwischen auch im Hegau und in Konstanz gefunden (noch nicht veröffentlichte eigene Funde).

MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
16.07.1900, 0/1 RIEGER det., coll.
FISCHER (Meess, 1907)

Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus (Fabricius, 1776)

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.07.1932, 0/1
an *Malus*, BAL. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1
NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
01.07.1941, 0/1 an *Malus*, BAL. leg.
28.06.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
05.07.1949, 0/1 an *Malus*, BAL. leg.

Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein
03.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
19.06.1921, 1/1 LEININGER leg.
- MT38SW WT, Waldshut, Albtal, Aug. 1934, 1/0
STRITT leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
Aug. 1928, 0/1 BECKER leg.
Juni 1941, 0/1 BECKER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, Aug. 1924,
0/1 FRENTZEN leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch
Aug. 1922, 0/1 FRENTZEN leg.
Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach
Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/1 LEININGER
leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.07.1927, 1/0
BECKER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beiertheimer
Wäldchen, 29.07.1927, 1/2 BECKER leg.
KA, Karlsruhe, City, Park
Juli 1926, 0/1 BECKER leg.
03.08.1927, 0/1 BECKER leg.
09.08.1927, 0/1 BECKER leg.
15.08.1927, 0/1 BECKER leg.
21.08.1927, 1/1 BECKER leg.
24.07.1933, 0/1 LEININGER leg.

- MV53NO 21.06.1935, 1/0 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
04.07.1948, 1/1 NOW. leg.
09.07.1951, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Eggenstein, 07.07.1929,
1/0 BECKER leg.
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen
02.08.1927, 1/0 BECKER leg.
11.08.1927, 0/3 BECKER leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 05.06.1952, 1/0
NOW. leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Assisi-Teich, 03.09.1987, 0/2
KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wie-
se, 09.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1898, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwien-
sen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
KA, Untergrombach, Michaelsberg,
"Grund", 31.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV74SO KA, Bruchsal, Münzesheim, Dorf,
01.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg
13.07.1927, 1/0 LEININGER leg.
16.07.1927, 0/2 LEININGER leg.
- NT28SO FN, Meersburg, Hagnau, 13.08.1926, 0/1
LEININGER leg.
- NV05SW HN, Bad Rappenau, Babstadt,
08.08.1932, 1/1 LEININGER leg.
- NV16NW MOS, Mosbach, 01.07.1931, 0/1
BECKER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
19.07.1935, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
20.07.1941, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
27.07.1942, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
14.07.1950, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV48SO TBB, Tauberbischofsheim, Boxberg,
Bobstadt
16.07.1927, 1/0 LEININGER leg.
19.07.1927, 0/1 LEININGER leg.
- Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus* (Linnaeus,
1767)
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
28.06.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens* (Schilling,
1836)
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1907).
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 23.09.1932, 0/1
an Kirsche, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel,
23.09.1931, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 01.09.1987, 2/0 KUSSMAUL leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beierteimer
Wäldchen, 07.03.1951, 1/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, City, Park
05.10.1900, 2/1 coll. FISCHER (Meess,
1907).
18.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900,
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
19.09.1951, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen
01.10.1900, 0/1 coll. FISCHER.
14.04.1950, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
10.11.1948, 3/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.08.1900, 1/0
coll. FISCHER (Meess, 1907).
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 05.09.1933, 1/2
an Zwetschge, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
20.08.1932, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
07.09.1932, 2/1 an Apfel, BAL. leg.
24.05.1934, 0/1 an Zwetschge, BAL. leg.
27.05.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg.
02.06.1949, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
18.06.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg.
07.07.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
08.07.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 12.04.1940,
1/0 BAL. leg.
- Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus* (Fallén,
1807)
- Von dieser Art gibt es nur wenige Nachweise in
Baden-Württemberg: Breisach, die Umgebung von
Karlsruhe (Meess, 1907) wovon die Belege im SMNK
nicht auffindbar waren. Aus Württemberg nur Funde
um 1900 aus der Gegend von Cannstadt (Lampert,
1895) und Ulm in der Coll. Hüeber (Rieger, 1972). Die
Art ist damit in Baden-Württemberg seit über 30 Jah-
ren verschollen. Im "Mainzer Sand" gibt es Nachweise
jüngerer Datums (Günther, 1987).
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
17.09.1949, 1/1 NOW. leg.
- Alloeotomus germanicus* E.Wagner, 1939
- Die Exemplare von Fischer waren bereits unter *A.*
gothicus Fall. veröffentlicht (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
1897, 1/0 coll. FISCHER.
22.08.1899, 2/0 coll. FISCHER
(Meess, 1900).
05.09.1899, 0/1 coll. FISCHER
(Meess, 1900).
27.08.1967, 1/0 angefliegen, NOW. leg.

Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
09.07.1959, 1/0 NOW. leg.
25.07.1965, 1/0 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
13.07.1934, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.

Monalocoris filicis filicis (Linnaeus, 1758)

- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 10.10.1931, 0/1
an Waldgras, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel,
24.08.1933, 0/1 an Wurmfarne, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 6.07.1900,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal,
Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 02.07.1899,
0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1907).
- MV50NO KA, Bad Herrenalb, Frauenalb, 30.07.1899,
1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
17.08.1955, 2/0 NOW. leg.
30.07.1963, 0/1 NOW. leg.
29.06.1965, 0/1 NOW. leg.
28.08.1967, 0/1 NOW. leg.

- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 06.10.1948, 0/1
NOW. leg.

Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberger Hof, 30.08.1933,
0/2 an Adlerfarn, BAL. leg.
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glas-
waldsee, 05.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb
06.10.1948, 0/2 NOW. leg.
04.07.1956, 0/1 NOW. leg.

Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839)

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 02.08.1958, 1/0
NOW. leg.

Dicyphus (Dicyphus) epilobii Reuter, 1883

- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933,
0/2 an *Epilobium hirsutum*, BAL. leg.

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)

- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933,
0/1 an *Epilobium hirsutum*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel
23.09.1931, 2/0 an *Teucrium scorod.*,
BAL. leg.
03.10.1933, 1/2 an *Teucrium*, BAL. leg.
06.10.1933, 1/0 an *Teucrium*, BAL. leg.

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 29.06.1965, 1/0
NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 11.07.1955, 1/0
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
06.09.1950, 1/0 NOW. leg.
17.09.1954, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 19.09.1942,
1/0 an Küchenfenster, BAL. leg.
06.10.1948, 0/1 in Heckengestreue, BAL. leg.
02.09.1950, 1/0 an *Stachys sylvatica*,
BAL. leg.

Dicyphus (Dicyphus) pallidus (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll.
FISCHER (Meess, 1907).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
1897, 0/1 coll. FISCHER.
03.07.1953, 0/4 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
17.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
28.07.1930, 1/0 in Wiesenstreu, BAL. leg.

Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829)

- MU38NW OG, Achern, 25.09.1931, 1/0 an *Corylus*,
BAL. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 06.08.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 03.07.1953, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
11.06.1949, 2/0 NOW. leg.
23.06.1954, 3/3 NOW. leg.
17.09.1954, 0/1 NOW. leg.
21.07.1957, 1/0 NOW. leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
1/0 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 14.06.1934, 1/1
an *Ononis*, BAL. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/2 NOW. leg.

Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804)

- MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 1/1 coll.
FISCHER (Meess, 1907).
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/0 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 14.10.1948,
0/1 an *Ononis repens*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
09.08.1932 und 14.10.1948, 1/0 an
Ononis repens, BAL. leg.
13.07.1949, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
05.08.1949, 1/1 an *Ononis*, BAL. leg.
19.08.1949, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.

- Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 06.07.1934, 0/2 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 06.08.1936, 0/1, an *Fraxinus*, BAL. leg.
 26.07.1937, 0/1, an *Fraxinus*, BAL. leg.
- Pithanus maerkeli* (Herrich-Schaeffer, 1839)
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
 1900).
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/5 coll.
 FISCHER.
- Acetropis (Acetropis) carinata* (Herrich-Schaeffer,
 1842)
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 09.07.1951, 0/1 NOW. leg.
 MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 11.06.1934, 0/1
 an Traubentrespe, BAL. leg.
- Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758)
 MT17NO LÖ, Schopfheim, Hasel, 22.06.1898 1/2
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
 Mai 1939, 5/3 1 Ex. BECKER leg.
 Juli 1941, 9/3 BECKER leg.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 02.06.1925,
 1/0, LEININGER leg.
 MU18SO OG, Kehl a. R., Kork, 30.06.1944, 2/0 in
 Wiesenstreu, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern
 23.06.1931, 1/0 an *Trifolium pratense*,
 BAL. leg.
 26.08.1933, 1/0 im *Salicetum*, BAL. leg.
 MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhstein, 16.07.1958,
 0/1 NOW. leg.
 MU55SW FDS, Alpirsbach, Wittichen, 20.06.1925,
 2/0 LEININGER leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 2/0 coll.
 FISCHER.
 RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 3/2
 coll. FISCHER.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1900, 1/0
 coll. FISCHER.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden
 24.06.1921, 1/0 BECKER leg.
 25.06.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
 MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
 30.05.1959, 1/0 KORMANN leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 14.07.1956, 1/0
 NOW. leg.
 MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB,
 05.07.1987, 2/1 KUSSMAUL leg.
 KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wie-
 se, 09.07.1987, 1/2 KUSSMAUL leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
 28.06.1932, 0/1 BECKER leg.
 05.07.1933, 1/0 LEININGER leg.
- MV83SW PF, Bretten, Knittlingen, 24.06.1959, 1/0
 KORMANN leg.
 NT18NO FN, Überlingen a. B., Uhltingen, NSG
 Seefeldern, 19.06.1961, 0/1 AMSEL leg.
 NU66NO UL, Ulm, Mähringen, 13.07.1980, 1/1
 FREY leg.
 NV05SW HN, Bad Rappenau, Babstadt,
 16.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Wiese,
 10.06.1949, 2/0 BAL. leg.
 KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 28.06.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 04.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 28.06.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
- Leptopterna ferrugata* Fallén, 1807
 LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag,
 02.06.1925, 1/0 LEININGER leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
 1907).
 MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glas-
 waldsee, 05.07.1960, 1/0 NOW. leg.
 MV41SW RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1900, 1/0
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 05.06.1934, 1/0
 STRITT leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
 28.06.1932, 0/1 LEININGER leg.
 05.07.1933, 0/1 LEININGER leg.
- Stenodema (Brachystira) calcaratum* (Fallén, 1807)
 LT87NO LÖ, Lörrach, Istein
 03.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
 1900).
 12.07.1933, 0/1 LEININGER leg.
 MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 21.07.1938,
 0/1 auf Wiese, BAL. leg.
 OG, Kehl a. R., Bodersweier, Wald,
 10.10.1938, 1/0 in Bodenstreu, BAL. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., Wiese, 02.07.1937, 0/1
 BAL. leg.
 OG, Kehl a. Rh., 13.07.1937, 0/1 BAL.
 leg.
 MU28SW OG, Kehl a. R., Legelshurst, Wald,
 13.09.1938, 1/1 in Bodenstreu BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern
 30.06.1931, 0/1 an *Ainus* BAL. leg.
 10.09.1932, 0/1 BAL. leg.
 19.08.1933, 0/1 BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
 06.08.1961, 1/0 am Licht, NOW. leg.
 01.08.1963, 0/1 am Licht, NOW. leg.
 07.07.1968, 1/0 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898,
 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
 19.08.1953, 1/0 NOW. leg.
 27.07.1955, 0/4 NOW. leg.

- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 07.09.1933, 3/0 LEININGER leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.09.1898, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Knielingen, Burgau, 01.05.1988, 0/3 KUSSMAUL leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV81NW PF, Niefern, Enzrücken, 16.07.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Wollmatinger Ried, 30.07.1930, 0/3 LEININGER leg.
- NT18SW KN, Konstanz, Wollmatingen, 10.08.1928, 2/0 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 22.08.1938, 2/0 an *Elodea*, BAL. leg.
- Stenodema (Stenodema) holsatum* (Fabricius, 1787)
- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni 1941, 1 Ex. BECKER leg.
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg 30.05.1950, 0/2 STRITT leg.
Juni 1952, 1/0 NOW. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis 12.07.1899, 0/1 coll. FISCHER.
13.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/4 coll. FISCHER.
- MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhestein, 16.07.1958, 0/2 NOW. leg.
OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 0/7 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 13.08.1932, 0/1 an Waldgras BAL. leg.
19.08.1935, 0/1 an Waldgras BAL. leg.
Wald, 05.08.1937, 0/2 an Gräsern, BAL. leg.
- Stenodema (Stenodema) laevigatum* (Linnaeus, 1758)
- MU10NO FR, Freiburg, Schauinsland, 07.08.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU11NW FR, Freiburg 25.07.1900, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1907).
April 1934, 0/1 STRITT leg.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, Wald, 10.10.1938, 1/0 in Bodenstreu, BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Aug. 1926, 0/3 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern 16.07.1931, 1/0 an *Euphorbia*, BAL. leg.
23.07.1931, 1/0 an *Lythrum*, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.07.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER.
21.04.1934, 0/1 STRITT leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.05.1900, 0/3 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.08.1950, 0/2 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 23.08.1950, 1/1 NOW. leg.
19.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 13.08.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/2 coll. FISCHER.
- MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, Lehmwand, 17.08.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wiese, 09.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach 18.05.1934, 0/1 STRITT leg.
06.04.1979, 1/0? leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg 14.05.1899, 0/1 coll. FISCHER.
08.06.1947, 0/1 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 1/1 HASSLER leg.
KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 2/2 KUSSMAUL leg.
KA, Bruchsal, Habichtsbuckel u. Weiherthal, 07.05.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
KA, Untergrombach, Michaelsberg, 07.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
"Grund", 26.05.1988, 0/3 KUSSMAUL leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 3/1 HASSLER leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 0/1 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhohle, 13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Bruchsal, Spiegelberg, Ruderaffläche, 13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NT28SO FN, Meersburg, Hagnau, 24.08.1926 0/1 LEININGER leg.
- NU07NO TÜ, Tübingen, Schachbaumwiesen, 14.05.1981, 0/1 WESTRICH leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 22.08.1938, 0/1 an *Elodea*, BAL. leg.
15.09.1946, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg.
Wald, 14.10.1948, 2/0 an Gräsern, BAL. leg.

NV54NO 07.06.1949, 0/1 an Apfelbaum, BAL. leg.
16.07.1949, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.
Wald, 05.09.1950, 1/0 an Gräsern, BAL. leg.
SHA, Schwäbisch Hall, Enslingen,
01.09.1978, 0/1 SPEIDEL leg.

Stenodema (Stenodema) virens (Linnaeus, 1767)

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 13.08.1898, 1/0
coll. FISCHER (Meess, 1900).

Notostira elongata (Geoffroy, 1785)

Die Meldungen von *N. erratica* L. in Meess (1900)
erwiesen sich bis auf 2 Exemplare aus Griesbach alle-
samt als *N. elongata* Geoffr.

MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 22.08.1938,
2/1 LEININGER leg.

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 14.07.1933, 0/1
LEININGER leg.

MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).

MU18SW OG, Kehl a. Rh., 17.10.1938, 0/1 unter
Weidengestreue, BAL. leg.
11.06.1939, 0/1 BAL. leg.

MU38NW OG, Achern, 10.09.1932, 0/1 BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern, 13.06.1931, 1/0
an *Sarothamnus*, BAL. leg.

MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

MU69NW VS, Blumberg, Aselfingen, Aug. 1939,
1/0? leg.

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 15.06.1900,
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
16.09.1953, 1/0 NOW. leg.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
13.08.1927, 2/0 HOHNDORF leg.
18.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
21.08.1927, 1/1 BECKER leg.
01.10.1927, 3/1 LEININGER leg.
04.10.1927, 1/0 LEININGER leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 25.06.1987,
1/0 KUSSMAUL leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
22.08.1951, 3/4 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
24.08.1955, 1/0 NOW. leg.

MV52SW KA, Karlsruhe, Mörsch, Allmendäcker,
Sandgrube, 28.07.1988, 0/2 KUSSMAUL
leg.

MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 15.09.1898;
4/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen
11.08.1927, 1/2 BECKER leg.
07.09.1933, 1/2 LEININGER leg.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 30.06.1928, 1/0
BECKER leg.

MV62NO KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder,
24.09.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.

MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 2/0
HASSLER leg.

MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhoh-
le, 13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.

NA50NW TBB, Tauberbischofsheim, Wenkheim,
17.07.1927, 1/1 LEININGER leg.

NU07NO TÜ, Tübingen, Schachbaumwiesen,
12.05.1981, 0/1 FREY leg.

NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholder-
weide, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
02.06.1949, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.

Notostira erratica (Linnaeus, 1758)

MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach
Aug. 1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).

16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.

MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
1/0 NOW. leg.

NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholder-
weide, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.

Megaloceraea recticornis (Geoffroy, 1785)

LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 0/1
LEININGER leg.

MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 22.08.1938,
0/1 LEININGER leg.

MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
Juli 1941, 0/1 STRITT leg.

Juli 1941, 1/0 BECKER leg.

MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald,
09.07.1921, 1 Ex. BECKER leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, Saumseen,
01.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
17.06.1951, 1/0 NOW. leg.

MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB,
05.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
22.07.1942, 0/1 BAL. leg.
Wiese, 26.06.1949, 0/1 BAL. leg.

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
19.06.1950, 0/1 NOW. leg.

02.08.1958 1 0 NOW. leg.
11.08.1958, 0/1 NOW. leg.

17.07.1960, 0/1 am Licht, NOW. leg.
21.07.1963, 0/1 am Licht, NOW. leg.

24.07.1967, 1/1 angefliegen, NOW. leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
23.06.1950, 1/0 NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.08.1950, 0/1
NOW. leg.

KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.08.1950, 1/1 NOW. leg.

08.09.1951, 0/1 NOW. leg.

MV52SW KA, Karlsruhe, Mörsch, Allmendäcker,
Sandgrube, 28.07.1988, 0/2 KUSSMAUL
leg.

- MV62NO KA, Pfinztal, Tongrube Eder, Heulenberg, 20.08.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
 MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
 MV74SO KA, Bruchsal, Unteröwisheim, Breitwiesen, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.

Miridius quadrivirgatus (Costa, 1852)

Diese Art ist in Deutschland bisher nur aus Baden bekannt, Wagner (1952a) nennt die untenstehenden Fundorte, zuletzt 1978 in dem gleichen Gebiet gefunden (Voigt, persönl. Mitteilung)

- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier 15.07.1939, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
 17.07.1939, 1/0 an Gerste, BAL. leg.
 OG, Kehl a. R., Hanauer Land, Wiese 02.07.1937, 1/0 in Bodenstreu, RIEGER det., BAL. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh. 08.07.1934, 0/1 an *Lolium perenne*, BAL. leg.
 03.07.1937, 1/0 an *Lolium perenne*, BAL. leg.
 13.07.1937, 0/2 an *Triticum vulgare*, BAL. leg.
 Wiese, 20.07.1937, 0/2 an *Lolium*, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern 27.06.1931, 1/0 an *Epilobium*, BAL. leg.
 25.07.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.

Phytocoris (Exophytocoris) minor Kirschbaum, 1856

In Süddeutschland aus Rheinhessen und vom Mittelrhein bekannt (Wagner, 1952a). Bei Mainz erst wieder 1982 gefunden (Günther, 1987). Der Fund des Männchens an *Pinus* wurde bereits veröffentlicht (Günther, Rieger & Burghardt, 1982), sonst kein weiterer Fundort in Baden-Württemberg.

- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel 09.09.1933, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
 16.09.1933, 0/1 an *Abies alba*, BAL. leg.

Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus Kirschbaum, 1856

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.07.1932, 1/0 an Apfelbaum, BAL. leg.
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 1/1 RIEGER det., NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 07.09.1932, 2/0 an Apfelbaum, BAL. leg.

Phytocoris (Phytocoris) hirsutululus Flor, 1860

Dieser Fund wurde bereits von Rieger (1987) als Erstnachweis für Baden-Württemberg veröffentlicht, inzwischen aus vier 10 x 10 km Quadranten des UTM-Gitters bekannt (Rieger & Strauß, 1992).

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 14.08.1962, 0/1 am Licht, RIEGER det., NOW. leg.

Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1860

- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 09.08.1933, 1/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 06.07.1934, 2/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 13.07.1934, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
 29.07.1940, 2/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 01.08.1940, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 01.08.1940, 1/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 07.08.1948, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.

Phytocoris (Phytocoris) reuteri Saunders, 1875

Die Karlsruher Tiere wurden unter *P. pini* Kb. gemeldet (Meess, 1900).

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 08.09.1898, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 14.08.1953, 0/1 am Licht, RIEGER det., NOW. leg.
 22.08.1955, 2/0 am Licht, NOW. leg.
 22.08.1957, 0/1 am Licht, NOW. leg.
 24.08.1960, 1/0 am Licht, NOW. leg.
 NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 06.09.1933, 0/1 an Zwetschgenbaum, BAL. leg.

Phytocoris (Phytocoris) tiliae (Fabricius, 1776)

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.07.1932, 0/1 an Apfelbaum, BAL. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 24.07.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 24.08.1951, 1/0 NOW. leg.
 NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 26.07.1934, 2/1 an *Quercus*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 02.09.1932, 0/1 an *Malus*, BAL. leg.

Phytocoris (Compsocerochoris) juniperi Frey-Gessner, 1865

Von Rieger (1987) wurde bereits das Männchen vom 8.8.1940 als Erstnachweis für Baden-Württemberg gemeldet.

- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel 18.07.1933, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
 26.07.1934, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
 08.08.1940, 1/0 an *Juniperus*, RIEGER det., coll. BALLE (Rieger, 1987).


Phytocoris (Ktenocoris) austriacus E. Wagner, 1954

Eine Zusammenfassung der Verbreitung dieser Art in Baden-Württemberg geben Rieger & Strauß (1992). Die folgenden Nachweise liefern Fundpunkte für 4 weitere 5 x 5 km Quadranten des UTM-Gitters. Das Tier von Frauenalb wurde schon unter *P. varipes* Boh. gemeldet (Meess, 1900).

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 16.07.1931, 1/0 an *Tanacetum*, BAL. leg.
 MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt, 05.10.1933, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.

- MV50NO KA, Bad Herrenalb, Frauenalb, 16.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV61NW KA, Karlsruhe, Waldbronn, Albtal, 12.08.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- Phytocoris (Ktenocoris) ulmi* (Linnaeus, 1758)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU11NW FR, Freiburg, 05.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900)..
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach Aug. 1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NU42SO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Station, 06.08.1980, 1/0 FREY leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 04.08.1932, 0/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg.
- 07.08.1933, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- 04.07.1934, 0/1 an Zwetschge, BAL. leg.
- Phytocoris (Ktenocoris) varipes* (Boheman, 1852)
- MU10NO FR, Freiburg, Schauinsland, 21.08.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- MU11NW FR, Freiburg 05.08.1899, 2/1 coll. FISCHER.
- 25.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern 16.07.1931, 0/1 an *Euphorbia*, RIEGER det., BAL. leg.
- 17.07.1931, 1/0 an *Tanacetum*, BAL. leg.
- OG, Oberachern, Bienenbuckel, 22.08.1935, 0/1 an *Pinus*, RIEGER det., BAL. leg.
- MU38SO OG, Achern, Kappelrodeck, Brandmatt, 12.09.1933, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.08.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 2/1 HASSLER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 11.08.1932, 1/0 an *Trifolium alpestre*, BAL. leg.
- Trift, 12.08.1932, 0/2 an *Trifolium alp.*, BAL. leg.
- 03.08.1933, 0/1 an *Trifolium alpestre*, BAL. leg.
- Brache, 10.08.1935, 0/1 BAL. leg.
- Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)
- MU38NW OG, Achern, 25.09.1931, 2/0 an *Corylus*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 01.10.1962, 0/1 NOW. leg.
- 12.10.1968, 0/1 NOW. leg.
- 12.10.1968, 1/3 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Ettlingen, Hedwigsquelle, 30.09.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV82SW PF, Pforzheim, Dürrn, Erlenbruch, Ufer, 06.10.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 23.09.1949, 0/3 an *Corylus*, BAL. leg.
- Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1839)
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 01.09.1933, 0/1 an *Prunus domestica*, BAL. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Juli 1959, 1/0 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 21.08.1950, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 17.08.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- NV17SO MOS, Mosbach, Rittersbach, Trift, 26.07.1934, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel 24.07.1934, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- 26.07.1934, 0/2 an *Quercus*, BAL. leg.
- Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 0/2 coll. FISCHER.
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 23.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
- LU92SW FR, Breisach, 06.06.1925, 1/0 LEININGER leg.
- MT17NO LÖ, Schopfheim, Hasel, 22.06.1898, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni 1941, 0/1 BECKER leg.
- MU11NW FR, Freiburg 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- 25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 26.06.1937, 1/0 BAL. leg.
- 24.06.1938, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern 18.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- 10.09.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
- OG, Achern, Oberachern

- 25.06.1921, 1/0 BECKER leg.
13.06.1931, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
19.06.1931, 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Asefingen, 15.08.1928, 0/1 FRENTZEN leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
17.06.1931, 0/1 BECKER leg.
RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1900, 1/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
22.06.1926, 1/2? leg.
10.08.1927, 0/1 BECKER leg.
15.08.1927, 1/6 BECKER leg.
21.08.1927, 2/4 BECKER leg.
02.07.1932, 0/1 BECKER leg.
11.08.1958, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Killisfeld, 07.08.1931, 1/0 BECKER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube
28.07.1988, 1/2 KUSSMAUL leg.
28.07.1988, 0/4 an *Tanac.*, KUSSMAUL leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 25.09.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
12.08.1900, 1/0 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 13.08.1898, 0/1 coll. FISCHER.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut
20.07.1932, 1/2 REIFF leg.
27.08.1932, 2/1 LEININGER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/4 HASSLER leg.
- MV67SO MA, Mannheim, Rheinau, 08.09.1931, 0/1 an *Calluna*, BAL. leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg,
01.10.1988, 1/0 HASSLER leg.
KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern,
01.10.1988, 1/1 HASSLER leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
09.09.1931, 1/0 BECKER leg.
- MV82SW PF, Pforzheim, Dürrn, Erlenbruch, Ufer,
06.10.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 0/2 KUSSMAUL leg.
- NV05SW HN, Bad Rappenau, Babstadt,
05.09.1921, 2/0 LEININGER leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach,
20.07.1935, 0/1 an Luzerne, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
07.08.1934, 0/1 an *Ononis repens*, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach,
21.09.1948, 0/1 an *Taraxacum*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
09.08.1932, 0/1 an *Rumex*, BAL. leg.
31.08.1932, 0/1 an Luzerne, BAL. leg.
23.07.1935, 0/1 an *Galium*, BAL. leg.
30.07.1935, 1/1 BAL. leg.
05.08.1942, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
23.09.1948, 0/1 BAL. leg.
28.06.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
08.07.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
MOS, Adelsheim, Hergenstadt,
05.08.1949, 0/1 an *Stachys*, BAL. leg.
- Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)
- MU38NW OG, Achern
25.07.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
01.08.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,
28.07.1988, 0/2 KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Horster Graben, 17.08.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, östl. DB,
03.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB,
17.08.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
10.08.1936, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
Wiese, 19.08.1936, 0/1 BAL. leg.
06.08.1942, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- Adelphocoris reicheli* (Fieber, 1836) (Karte 7)
- Aus Württemberg sind 2 alte Funde um 1900 bekannt (Hüeber 1894-1913 & Rieger, 1972). In der Oberreinebene ist (war) diese Art anscheinend verbreitet, trotzdem erst von Voigt (1970) zuerst für Baden nachgewiesen, er veröffentlicht dort einen Fund von Nowotny im Juli 1966 aus dem Durlacher Wald. 1970 nochmals bei Karlsruhe gefangen (Voigt, persönl. Mitteilung), seither ist *A. reicheli* Fieb. in Baden-Württemberg verschollen, ein neuerer Fund liegt aus Bayern vor (Schuster, 1990).
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
20.07.1932, 1/0 an *Teucrium*, BAL. leg.
22.08.1933, 0/1 an *Clematis*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
20.07.1958, 1/0 KORMANN leg.
16.08.1958, 0/2 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898, 0/1 coll. FISCHER.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
16.07.1950, 0/1 NOW. leg.



Karte 7 *Adelphocoris reicheli* (Fieber, 1836).
Baden-württembergische
Fundorte in der Samm-
lung des SMNK.

	27.07.1953, 0/1 NOW. leg.	MT59NO	WT, Bonndorf, Wutachgeb., 21.08.1938,
	27.07.1955, 11/2 NOW. leg.		1/0 LEININGER leg.
	24.08.1955, 2/9 NOW. leg.	MT59NW	WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni
	17.07.1957, 0/1 NOW. leg.		1941, 1 Ex. BECKER leg.
MV52SW	KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.08.1900 1/1		WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juli 1941,
	coll. FISCHER.		1/0 BECKER leg.
MV62NW	KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,	MT69NO	VS, Blumberg, 15.08.1928, 2/0
	08.08.1930, 1/0 BECKER leg.		FRENTZEN leg.
NV37SW	KÜN, Schöntal, Hopfengarten,	MU02NW	FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 1/0
	05.08.1939, 0/1 an <i>Scrophularia</i> , BAL. leg.		NOW. leg.
		MU11NW	FR, Freiburg, 25.07.1900, 0/1 coll.
<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)			FISCHER.
LT87NO	LÖ, Lörrach, Istein	MU18SO	OG, Kehl a. R., Bodersweier
	03.08.1899, 2/1 coll. FISCHER.		23.07.1938, 0/1 an <i>Trifolium repens</i> , BAL.
	19.06.1931, 3/1 LEININGER leg.		leg.
MT17NO	LÖ, Schopfheim, Hasel, 22.06.1898, 1/2		14.07.1941, 1/0 an Luzerne, BAL. leg.
	coll. FISCHER (Meess, 1900).		

- MU38NW OG, Achern
15.06.1931, 1/1 an *Trifolium pratense*,
BAL. leg.
23.06.1931, 2/0 an *Trifolium pratense*,
BAL. leg.
10.09.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
18.08.1933, 1/0 an *Trifolium pratense*,
BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 3/3 LEININGER
leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald,
09.07.1921, 0/1 BECKER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.07.1927, 1/0
LEININGER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 30.07.1963, 0/1
NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
10.08.1927, 0/1 BECKER leg.
15.08.1927, 1/2 BECKER leg.
17.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
21.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898
1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
12.08.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
30.06.1923 1/0 LEININGER leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder,
24.09.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB
17.08.1987, 2/0 KUSSMAUL leg.
03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Tongrube Eder, Heulenberg,
25.08.1987, 2/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wie-
se, 09.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1898, 2/0
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV74SO KA, Bruchsal, Unteröwisheim, Breitwie-
sen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV81NW PF, Niefern, Enzrücken
06.08.1986, 2/0 WALLNER leg.
15.09.1986, 1/0 WALLNER leg.
- MV82SW PF, Pforzheim Dürrn, Erlenbruch, Ufer,
06.10.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NT18NO FN, Überlingen a. B., Uhdingen, NSG
Seefeldn, 31.05.1961, 1/0 AMSEL leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen,
Aug.1929, 1/0 FRENTZEN leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/1 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckar-
mühlbach, 17.06.1929, 0/1 LEININGER
leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental
12.08.1931, 1/0 an *Trifolium pratense*,
BAL. leg.
21.08.1931, 1/0 an Luzerne, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 23.07.1935,
1/0 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- NV37NW MOS, Osterburken, 20.07.1935, 0/1 an
Luzerne, BAL. leg.
- NV37SW MOS, Adelsheim, Hergenstadt,
05.08.1949, 0/1 an *Stachys*, BAL. leg.
- Calocoris (Trichocalocoris) pilicornis* (Panzer, 1806)
An den beiden untenstehenden Fundorten wurde die-
se seltene Art auch später gefunden (Kless, 1961 und
Burghardt & Rieger, 1978).
- MU50SO VS, Donaueschingen, Gauchachschlucht,
04.06.1938, 0/1 STRITT leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
28.06.1932, 0/1 BECKER leg.
- Calocoris (Trichocalocoris) schmidti* (Fieber, 1836)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 31.05.1938, 0/1 BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 10/6
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
23.06.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
27.05.1959, 0/1 KORMANN leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 13.06.1934, 0/1 BAL.
leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949,
2/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
02.06.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg.
18.06.1949, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg.
24.06.1949, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg.
24.06.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
07.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
- Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus* (Fabricius, 1776)
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
01.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
Juli 1941, 1/0 STRITT leg.
- Calocoris (Rhabdomiris) striatellus* (Fabricius, 1794)
- MU18SO OG, Kehl a. R., Kork, 29.05.1944, 1/0 an
Quercus, BAL. leg.
- MU28NO OG, Achern, Großweier, Wald,
27.05.1932, 0/2 an *Corylus*, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 1/0
NOW. leg.
- MU38NW OG, Achern
08.05.1931, 0/1 an *Rhamnus*, BAL. leg.
27.05.1932, 1/3 an *Rhamnus*, BAL. leg.
27.05.1932, 1/2 an *Corylus*, BAL. leg.
08.06.1932, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 16.06.1986,
1/0 WALLNER leg.

- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rappenwörth, 08.05.1926, 1/0 LEININGER leg.
 MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 29.05.1900, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 09.05.1934, 0/1 STRITT leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 24.05.1949, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 07.06.1949, 1/0 an Apfelbaum, BAL. leg.

Calocoris (Closterotomus) biclavatus
 (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach
 Aug. 1899, 2/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 16.07.1900, 0/2 coll. FISCHER.
 MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 1/3 NOW. leg.
 MU48SW OG, Achern, Kappelrodeck, Hornisgrinde, 25.08.1933, 0/1 an *Picea*, BAL. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 16.07.1955, 1/0 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 06.07.1934, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 15.06.1949, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg.
 18.06.1949, 1/0 an *Cornus*, BAL. leg.
 18.06.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg.

Calocoris (Closterotomus) fulvomaculatus
 (De Geer, 1773)

- MU28NO OG, Achern, Großweier, Wald,
 14.06.1933, 0/1 an *Rhamnus*, BAL. leg.
 MU29SW OG, Achern, Rheinau
 04.06.1934, 1/0 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.
 21.05.1952, 7/2 NOW. leg.
 MU38NW OG, Achern
 11.06.1931 1/1 an *Rhamnus*, BAL. leg.
 10.06.1932, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 28.06.1932, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
 MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle,
 02.07.1964, 0/1 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Juni 1960, 2/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, Juli 1948, 1/1 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 19.05.1948, 1/0 NOW. leg.
 NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
 17.07.1933, 0/1 an *Ononis repens*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 24.05.1934, 0/1 an Gräsern, BAL. leg.
 03.06.1949, 1/0 an *Populus*, BAL. leg.
 15.06.1949, 2/1 an *Cornus*, BAL. leg.
 24.06.1950, 0/1 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.

Calocoris (Calocoris) affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 22.08.1938, 0/1 LEININGER leg.
 MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
 Aug. 1924, 0/1 LEININGER leg.
 Aug. 1938, 0/2 STRITT leg.
 MU38NW OG, Achern, 27.06.1932, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach
 Aug. 1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 16.07.1900, 2/1 coll. FISCHER.
 MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 2/0 LEININGER leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 2/1 coll. FISCHER.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb
 05.06.1952, 1/0 NOW. leg.
 16.07.1955, 2/1 NOW. leg.
 NU42NO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Tiefenbach, 24.07.1980, 1/0 FREY leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 27.06.1932, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 10.08.1933, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 Waldrand, 15.07.1941, 0/1 BAL. leg.
 20.07.1941, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 13.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.

Calocoris (Calocoris) alpestris (Meyer-Duer, 1843)

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht,
 14.07.1944, 7/1 STRITT leg.
 MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, 06.08.1952, 2/0 STRITT leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER.
 MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/3 NOW. leg.
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 0/3 NOW. leg.
 MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle,
 05.06.1952, 2/1 NOW. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 05.06.1952, 0/1 NOW. leg.

Calocoris (Calocoris) norvegicus (Gmelin, 1788)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 3/1 LEININGER leg.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/1 NOW. leg.
 MU38NW OG, Achern
 08.06.1931, 1/0 an Gräsern BAL. leg.
 18.06.1931, 1/0 an *Pisum arvense*, BAL. leg.
 28.06.1933, 1/0 im Salicetum, BAL. leg.
 OG, Achern, Oberachern, 11.07.1932, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV62NO KA, Pfintztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB, 05.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfintztal, Wöschbach, Buschäcker, 09.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 11.07.1933, 0/1 BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 04.08.1932, 1/0 an *Lathyrus pratensis*, BAL. leg.
11.08.1933, 1/0 BAL. leg.
21.07.1943, 0/1 Luzerne, BAL. leg.
21.07.1948, 0/1 Luzerne, BAL. leg.
- Calocoris (Calocoris) roseomaculatus* (De Geer, 1773)
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 23.06.1929, 1/1 LEININGER leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht Mai 1939, 2/0 BECKER leg.
Aug. 1941, 0/1 BECKER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 07.07.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden 17.07.1898, 0/2 coll. FISCHER.
05.07.1927, 1/1 LEININGER leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 11.07.1988, 0/1, KUSSMAUL leg.
- NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg 13.07.1927, 0/2 LEININGER leg.
16.07.1927, 1/4 LEININGER leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 15.07.1933, 0/1 BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, Trift, 03.08.1933, 0/1 BAL. leg.
- Hadrodemus m-flavum* (Goeze, 1778)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 1/3 LEININGER leg.
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 10.07.1933, 0/1 LEININGER leg.
- LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 02.06.1925, 1/1 LEININGER leg.
- LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
- MT17NO LÖ, Schopfheim, Hasel, 22.06.1898, 0/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MT19NW FR, Staufen, Belchen, Juli 1925, 0/1 ZIMBER leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht Aug. 1928, 1/0 BECKER leg.
Mai 1939, 0/1 BECKER leg.
Juli 1941, 0/1 STRITT leg.
Juli 1941, 1/2 BECKER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg 02.06.1925, 1/1 LEININGER leg.
14.07.1933, 0/1 LEININGER leg.
21.06.1953, 1/1 NOW. leg.
21.06.1956, 1/1 NOW. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 6/3 NOW. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU55SW FDS, Alpirsbach, Wittichen, 20.06.1925, 0/1 LEININGER leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Aselfingen, 09.06.1938, 1/1 STRITT leg.
- MU81SW TUT, Immendingen, 28.06.1934, 1/1 STRITT leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
29.06.1965, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Juli 1925, 1 Ex. LEININGER leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 06.07.1955, 1/0 NOW. leg.
- MV61SW KA, Karlsruhe, Marxzell, Ittersbach, 02.07.1930, 0/1 LEININGER leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 23.05.1959, 0/1 NOW. leg.
- NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg, 16.07.1927, 1/2 LEININGER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 14.06.1949, 4/2 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Gundelsheim, Neckarmühlbach 25.05.1926, 1/0 LEININGER leg.
17.06.1929, 0/3 LEININGER leg.
- NV06SO MOS, Mosbach, Neckarzellern, 27.05.1926, 1/0 LEININGER leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, Hamburg, 26.04.1940, 0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.
- Miris striatus* (Linnaeus, 1758)
- Eine unserer größten und schönsten heimischen Weichwanzen, die weit verbreitet ist und recht selten gefangen wird, da sie nur in geringer Individuendichte vorkommt.
- MT17NO LÖ, Schopfheim, Hasel, 22.06.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, 14.07.1944, 7/1 STRITT leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 2/6 NOW. leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Aselfingen, 10.06.1938, 1/0 STRITT leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Duttenthal-hohle, 13.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 25.05.1949, 1/0 an *Prunus*, BAL. leg.
- Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835)
- Erstnachweis für Baden-Württemberg!** In Süddeutschland aus Rheinhessen und Bayern bekannt (Wagner, 1952a). Das prächtig gefärbte Tier war im SMNK unter *Miris striatus* L. eingeordnet.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 22.06.1953, 1/1 NOW. leg.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/1 NOW. leg.
 MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 0/4 coll. FISCHER.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 01.07.1939, 1/0 an Gräsern, BAL. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 04.07.1948, 1/1 NOW. leg.
 09.07.1951, 4/3 NOW. leg.
 21.07.1954, 3/0 NOW. leg.
 13.07.1955, 0/2 NOW. leg.
 19.07.1955, 0/1 NOW. leg.
 MV62NO KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wiese, 09.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 22.07.1940, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 16.07.1949, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.

Dichrooscytus gustavi (Josifov, 1981)

- Schuster (1981) meldet diese Art als *D. vallesianus* Fieb. 1861 neu für Baden-Württemberg. Nach der Arbeit von Josifov (1981) muß dieser Nachweis als *D. gustavi* Jos. gewertet werden.
 NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach, 25.05.1934, 1/0 BAL. leg.

Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885

- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 19.06.1941, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 12.07.1941, 1/0 an *Picea*, BAL. leg.
 18.07.1941, 0/2 an Fichte, BAL. leg.

Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 19.06.1934, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 1/0 NOW. leg.

Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 26.06.1937, 0/1 an *Salix alba*, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern 18.05.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 08.06.1931, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.
 15.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 18.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 12.09.1931, 0/1 an *Angelica*, BAL. leg.
 OG, Achern, Oberachern 13.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 Jungwald, 22.06.1931, 0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 15.08.1899, 3/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/2 NOW. leg.
 MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 2/1 coll. FISCHER.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/2 coll. FISCHER.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1900, 0/2 coll. FISCHER.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 16.08.1958, 1/0 NOW. leg.
 MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 05.06.1952, 3/0 NOW. leg.
 MV68SW MA, Mannheim, City, 21.06.1934, 1/0 an *Rubus*, BAL. leg.
 NV27SW MOS, Oberscheffenz, Ginsterhügel, 11.07.1933, 0/1 BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 26.08.1932, 0/2 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 09.08.1938, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 15.06.1949, 0/2 an *Prunus*, BAL. leg.

Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallén, 1829)

- MU38NW OG, Achern 08.06.1931, 2/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 14.06.1931, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
 30.06.1931, 1/0 an *Alnus*, BAL. leg.
 NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 27.06.1940, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.

Lygocoris (Neolygus) viridis (Fallén, 1807)

- MU38NW OG, Achern, 11.06.1931, 1/0 an *Alnus*, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 21.07.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg.

Lygocoris (Apolygus) lucorum (Meyer-Duer, 1843)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 26.06.1937, 0/2 an *Artemisia*, BAL. leg.
 MU20SO FR, Todtnau, Feldberger Hof, 30.08.1933, 0/1 BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 19.06.1950, 1/3 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 1/0 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 20.08.1952, 0/1 NOW. leg.
 27.07.1955, 1/0 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV68SW MA, Mannheim, City, 15.06.1934, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
 NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 06.08.1931, 0/2 an *Artemisia*, BAL. leg.

- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 30.08.1937, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
- Lygocoris (Apolygus) spinolae* (Meyer-Duer, 1841)
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 16.08.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 21.06.1934, 1/0 an *Rubus*, BAL. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental 12.08.1931, 1/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg.
21.08.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 02.09.1932, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
24.08.1938, 1/0 an *Artemisia*, BAL. leg.
15.06.1949, 1/0 an *Cornus*, BAL. leg.
- Lygus adspersus* (Schilling, 1837)
- Erstnachweis dieser wieder von Kerzhner (1984) von *Lygus gemellatus* H.-S. abgetrennten Art für Baden-Württemberg durch Rieger (1987). Dieser gibt 3 Fundorte für Baden-Württemberg, in meiner eigenen Sammlung gibt es Belege von 3 weiteren unveröffentlichten Fundorten von verschiedenen xerothermen Hängen.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 30.09.1948, 1/0 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg.
12.10.1948, 1/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg.
- Lygus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 17.07.1931, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 2/3 coll. FISCHER.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni 1941, 1/1 BECKER leg.
- MU38NW OG, Achern 22.07.1930, 1/0 BAL. leg.
25.09.1930, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
23.06.1931, 1/0 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
22.04.1932, 0/1 an *Prunus paduus*, BAL. leg.
- OG, Achern, Oberachern 17.07.1931/1 an *Urtica*, BAL. leg.
27.09.1933, 0/1 an *Vaccinium*, BAL. leg.
- OG, Oberachern, Bienenbuckel, 02.10.1933, 0/1 an *Teucrium*, BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 1/2 LEININGER leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 25.05.1963, 0/1 EBERT leg.
RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 24.08.1921, 0/1 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beierteimer Wäldchen, 28.07.1927, 0/1 BECKER leg.
KA, Karlsruhe, City, Park 13.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
27.09.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
01.10.1927, 2/0 LEININGER leg.
04.10.1927, 0/1 LEININGER leg.
11.10.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
21.07.1963, 3/0 am Licht, NOW. leg.
01.08.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg.
02.08.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Scheibehardt, Wald 08.05.1925, 0/1 BECKER leg.
14.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 14.07.1950, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 15.07.1948, 1/0 NOW. leg.
30.08.1950, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 07.03.1948, 0/1 NOW. leg.
04.07.1948, 1/0 NOW. leg.
06.09.1950, 1/2 NOW. leg.
21.07.1954, 1/0 NOW. leg.
17.07.1957, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 2/1 KUSSMAUL leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen 02.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
11.08.1927, 1/0 BECKER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 16.09.1900, 2/0 coll. FISCHER.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 18.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Knielingen, Burgau, 01.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV61NW KA, Karlsruhe, Waldbronn, Etzenrot, 08.08.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Wöschbach, 10.08.1930, 1/0 BECKER leg.
KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder, 24.09.1987, 7/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, Lehmwand, 17.08.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfnz u. DB, 05.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 1/2 HASSLER leg.
KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.

- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 8/4 HASSLER leg. 11.10.1933, 1/0 unter Waldaub, BAL. leg. OG, Oberachern, Bienenbuckel
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg, 01.10.1988, 0/2 HASSLER leg. 08.10.1931, 1/0 an *Vaccinium*, BAL. leg. 27.09.1933, 0/1 an *Calluna*, BAL. leg. 06.10.1933, 1/0 an *Teucrium*, BAL. leg.
- KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 1/4 HASSLER leg. MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 24.08.1921, 0/1 BECKER leg.
- MV74SO KA, Bruchsal, Unteröwisheim, Breitwiesen, 27.07.1988, 3/2 HASSLER leg. MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 13.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg. 26.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg. Sep. 1927, 0/2 LEININGER leg. 01.10.1927, 0/1 LEININGER leg. 11.07.1955, 1/0 NOW. leg. 10.07.1959, 1/0 am Licht, NOW. leg. 21.07.1963, 0/2 am Licht, NOW. leg. 27.07.1963, 0/1 am Licht, NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 20.07.1949, 0/1 BECKER leg. 17.09.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV81NW PF, Niefern, Enzrücken, 06.08.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental 08.08.1931, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg. 12.08.1931, 1/0 an *Echium*, BAL. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 24.08.1931, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 25.04.1934, 0/1 an *Fagus*, BAL. leg. 04.08.1936, 0/1 BAL. leg. 20.07.1943, 0/1 an Luzerne, BAL. leg. 16.09.1948, 1/1 an *Polygonum amp.*, BAL. leg. 23.09.1948, 1/0 an *Polygonum amp.*, BAL. leg. 30.09.1948, 1/1 an *Achillea*, BAL. leg. 06.10.1948, 1/0 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg. 12.10.1948 und 10.05.1949, je 1/0 BAL. leg. 02.09.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 05.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 04.10.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
- Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1839)
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/0 NOW. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliffkopf 16.07.1958, 1/2 NOW. leg. Juli 1959, 0/2 NOW. leg.
- Lygus rugulipennis* Poppius, 1911
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 2/0 coll. FISCHER.
- MU11NW' FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU38NW OG, Achern 23.06.1931, 1/2 an *Trifolium pratense*, BAL. leg. 27.06.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 07.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 09.09.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.
- KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 1/0 BECKER leg.
- KA, Karlsruhe, Neureut, 28.09.1898, 1/0 coll. FISCHER.
- KA, Pfinztal, Wöschbach, Buschäcker, 09.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg. KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 1/2 KUSSMAUL leg. KA, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 26.07.1948, 1/0 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 11.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 25.09.1898, 4/2 coll. FISCHER.
- KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 1/0 BECKER leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 28.09.1898, 1/0 coll. FISCHER.
- MV62NO KA, Pfinztal, Wöschbach, Buschäcker, 09.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg. KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 1/2 KUSSMAUL leg. KA, Untergrombach, Bahngleise, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV64SW KA, Karlsruhe, Graben, 04.07.1925, 1/0 LEININGER leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1958, 1/0 NOW. leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 2/0 HASSLER leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 10.08.1931, 1/0 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 21.03.1932, 0/1 unter Waldaub, BAL. leg. 25.08.1937, 0/1 BAL. leg. 23.07.1942, 0/1 an Kamille, BAL. leg. 16.09.1948, 3/0 an Gräsern, BAL. leg. 30.09.1948, 0/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg. 06.10.1948, 1/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg. 27.06.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 07.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 09.09.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.

27.09.1949, 1/0 an Hasel, BAL. leg.
 14.08.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 19.08.1950, 0/1 an *Artemisia vulgare*,
 BAL. leg.
 05.09.1950, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Lygus wagneri Remane, 1955

Das Exemplar aus Griesbach wurde bereits als *L. pratensis* (L.) gemeldet (Meess, 1900).

LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag,
 20.06.1953, 1/0 NOW. leg.
 MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 20.08.1938,
 1/0 LEININGER leg.
 MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni
 1941, 3/2 BECKER leg.
 MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 0/1
 NOW. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
 NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee,
 14.08.1928, 0/1 LEININGER leg.

Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus, 1758)

MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., Aug. 1941,
 0/3 BECKER leg.
 MU29SW OG, Achern, Rheinau, 25.06.1934, 1/0 an
Echium, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, 12.09.1931, 5/4 an *Angelica*,
 BAL. leg.
 MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/2 LEININGER
 leg.
 MV41SW RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/1
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 02.08.1963, 1/0
 am Licht, NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/2
 coll. FISCHER.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb
 04.08.1954, 0/3 NOW. leg.
 04.07.1956, 0/1 NOW. leg.
 MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB,
 03.09.1987, 0/3 KUSSMAUL leg.
 MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/0
 HASSLER leg.
 NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrom-
 metum, 10.09.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
 NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 24.08.1931, 0/1
 an *Euphrasia*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 12.09.1931, 0/1 an *Angelica*, BAL. leg.
 05.08.1932, 0/1 an *Daucus*, BAL. leg.
 07.08.1933, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg.
 06.05.1934, 0/2 an *Rumex crispus*, BAL.
 leg.
 13.05.1934, 0/1 an *Aegopodium*, BAL. leg.
 24.05.1934, 0/2 an *Aegopodium*, BAL. leg.
 05.08.1934, 0/1 an *Daucus*, BAL. leg.
 28.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Orthops (Orthops) basalis (Costa, 1852)

MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Baldenschwand,
 Juni 1952, 0/1 NOW. leg.
 MU38NW OG, Achern, 23.09.1931, 1/0 an *Alnus*,
 BAL. leg.
 OG, Achern, Oberachern, Waldrand,
 22.06.1931, 0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
 15.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
 1907).
 MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899,
 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 10.07.1952,
 1/0 NOW. leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll.
 FISCHER (Meess, 1907).
 MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim
 13.05.1900, 1/0 coll. FISCHER.
 24.08.1921, 0/1 LEININGER leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
 26.07.1948, 0/1 NOW. leg.
 22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 24.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 2/4
 NOW. leg.
 MV62NO KA, Pfinztal, Horster Graben, 03.09.1987,
 0/1 KUSSMAUL leg.
 MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwie-
 sen, 27.07.1988, 0/2 HASSLER leg.
 MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 29.06.1949, 1/0
 NOW. leg.
 MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 0/2
 HASSLER leg.
 MV74SW KA, Bruchsal, Ramberg, Auweghohle,
 13.05.1988, 0/2 KUSSMAUL leg.
 KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhoh-
 le, 13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, Juni 1949,
 0/1 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 15.04.1931, 1/0 an *Malus* auf Borke, BAL.
 leg.
 26.08.1932, 2/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 01.09.1932, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
 23.09.1948, 1/0 an *Rumex crispus*, BAL.
 leg.
Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 1758)
 Diese Art läßt sich sehr gut mit Rieger (1985) von *O. basalis* C. trennen: er gibt für *O. kalmii* L. 17 Fundpunkte für Baden-Württemberg, für *O. basalis* C. mehr als doppelt so viele. Auch in dieser Untersuchung bestätigt sich, daß *O. kalmii* L. die weitaus seltenere Art ist. Die letztgenannten 3 W von C. Rieger determiniert.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 06.07.1927, 1/0
 LEININGER leg.

- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg, 01.10.1988, 0/2 HASSLER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/3 KUSSMAUL leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 01.09.1932, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg. 14.10.1948, 0/1 in Waldstreu, BAL. leg.
- Pinalitus atomarius* (Meyer-Duer, 1843)
- Hier der vierte Nachweis für Baden-Württemberg dieser montanen an Fichten lebenden Art. Zusammenfassung der bisherigen Nachweise bei Rieger & Strauß (1992).
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 0/1 NOW. leg., RIEGER det. bestätigt.
- Pinalitus rubricatus* (Fallén, 1807)
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 24.08.1933, 0/1 an *Picea*, BAL. leg.
- MU38SO OG, Achern, Kappelrodeck, Brandmatt 26.08.1933, 1/1 an *Picea*, BAL. leg. 18.09.1933, 0/1 an *Picea*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliffkopf, Juli 1959, 0/1 NOW. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 05.09.1939, 0/1 an *Picea*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 06.07.1934, 0/1 an *Picea*, BAL. leg. 13.07.1934, 1/1 an *Picea*, BAL. leg. 10.08.1934, 0/1 an *Larix*, BAL. leg.
- Agnocoris reclairei* E. Wagner, 1949
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 12.02.1948, 0/1 NOW. leg., Autotypoid WAGNER.
- MV68SW MA, Mannheim, City 25.06.1934, 0/2 an *Populus alba*, BAL. leg. 30.06.1934, 1/0 BAL. leg.
- Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/3 coll. FISCHER.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 31.05.1938, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, 23.05.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. OG, Achern, Oberachern, 23.07.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 1/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle, 05.06.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV51NW KA, Rastatt, Malsch, Sulzbach, 05.05.1984, 0/1 an Braunwurz, EBERT leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 09.05.1956, 0/1 NOW. leg. 23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee 17.11.1948, 1/1 NOW. leg. 19.11.1948, 1/0 NOW. leg. 16.11.1949, 1/1 NOW. leg. 01.11.1950, 0/1 NOW. leg. 26.10.1951, 1/0 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 08.06.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV77SO HD, Heidelberg, City, 06.01.1923, 1/0 BECKER leg.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn, 02.08.1938, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 24.08.1938, 1 0 an *Corylus*, BAL. leg. 18.05.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 07.07.1949, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 15.07.1949, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg. 28.07.1949, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg. 27.09.1949, 1/3 an *Urtica*, BAL. leg. 14.07.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 26.08.1950, 2/0 an *Urtica*, BAL. leg. 02.09.1950, 1/2 an *Urtica*, BAL. leg. 04.09.1950, 0/3 an *Urtica*, BAL. leg.
- Camptozygum aequale* (Villers, 1789)
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 26.06.1931, 4/2 an *Pinus*, BAL. leg. OG, Oberachern, Bienenbuckel, 25.06.1931, 0/5 an *Pinus*, BAL. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 23.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 19.06.1934, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 19.07.1941, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg. 25.08.1941, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
- Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)
- MU38NW OG, Achern, 16.09.1931, 0/1 BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhenstein, 01.07.1960, 0/2 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg 06.08.1952, 1/0 NOW. leg. 09.07.1958, 0/1 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald Jan. 1950, 0/2 NOW. leg. 10.11.1950, 0/2 NOW. leg. 19.09.1951, 0/2 NOW. leg.

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 12.03.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 07.09.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 11.09.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 05.05.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 30.08.1948, 1/0 NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 07.08.1934, 1/0 an *Galium*, BAL. leg.
- NV37NW MOS, Osterburken, 20.07.1935, 0/1 an *Galium mollugo*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten Wald, 05.01.1932, 0/1 unter Laub, BAL. leg.
Wald, 21.03.1934, 1/0 unter Laub, BAL. leg.
13.07.1934, 0/3 an *Pinus*, BAL. leg.

Polymerus (Polymerus) carpathicus Horváth, 1882

Von dieser Art sind bisher 2 Fundorte in Baden-Württemberg bekannt: das Wollmatinger Ried bei Konstanz (Wagner, 1938 u. Heckmann, 1987) und das Osterried bei Laupheim (Strauß, 1987)

- NT09SO FN, Überlingen a. B., Sipplingen, 28.06.1939, 1/0 ROSENBOHM leg., coll. BAL.

Polymerus (Polymerus) holosericeus (Hahn, 1831)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 11.06.1939, 0/1 an *Galium*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 18.07.1933, 0/2 BAL. leg.

Polymerus (Polymerus) nigrinus (Fallén, 1829)

Alle bei Meess (1900 und 1907) als *P. holosericeus* Hhn. gemeldeten und im SMNK auch unter dieser Art eingeordneten Exemplare erwiesen sich als *P. nigrinus* Fall.

- MU11NW FR, Freiburg
05.08.1899, 6/5 coll. FISCHER (Meess, 1900).
25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB, 05.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 03.08.1934, 0/1 an *Galium mollugo*, BAL. leg.

Polymerus (Poeciloscytus) asperulae Fieber, 1861

Seltene Art die an *Asperula glauca* L. gebunden ist, nur drei Fundorte in Baden-Württemberg: Sandhausen (Meess, 1900 sowie Burghardt & Rieger, 1978) die Wutachschlucht (Kless, 1961), in Württemberg bei Pfullingen (Hüeber, 1894-1913).

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 16.07.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).

Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858)

Von untengenanntem Fundort wurde diese Art bereits von Burghardt & Rieger (1978) als Erstnachweis für Baden-Württemberg gemeldet. Keine weiteren Fundorte in Baden-Württemberg.

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
25.08.1947, 1/0 BECKER leg.
17.09.1949, 20/9 NOW. leg.

Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus

E. Wagner, 1951

- MV74SO KA, Bruchsal, Unteröwisheim, Breitwiesen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg., RIEGER det.

Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MU11NW FR, Freiburg
05.08.1899 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Hanauer Land, 22.06.1937, 0/1 BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/1 coll. FISCHER.
RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 14.08.1898, 1/0 coll. FISCHER.
- MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, östl. DB, 11.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB 17.08.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Wöschbach, Buschäcker, 09.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV83NW KA, Bretten, Bauerbach, 29.06.1922, 3/1 BECKER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 11.08.1932, 1/0 an Luzerne, BAL. leg.

- Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus* (Panzer, 1806)
- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald, 20.07.1922, 1/0 BECKER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 01.10.1927, 1/0 LEININGER leg. 04.10.1927, 0/1 LEININGER leg. 19.06.1950, 2/4 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 14.06.1949, 0/1 NOW. leg. 15.06.1949, 1/1 NOW. leg.
- Capsus ater* (Linnaeus, 1758)
- MU01SW FR, Freiburg, Schallstadt, Mengen, Kirchhof, 08.06.1922, 2/0 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern, 11.06.1931, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 15.08.1899, 2/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhestein, 01.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 1/0 NOW. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1901, 4/0 coll. FISCHER.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.06.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhartd, Wald, 23.06.1950, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 01.06.1947, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 13.06.1932, 1/0 LEININGER leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Wöschbach, Alter Berg, Wiese, 09.07.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald, 03.06.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 23.05.1959, 1/0 NOW. leg.
- NU42SW BC, Bad Buchau, NSG Blinder See, 01.08.1980, 1/0 FREY leg.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee, 04.06.1928, 1/0 LEININGER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckarmühlbach, 17.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 18.07.1941, 0/1 BAL. leg.
- Capsodes (Capsodes) gothicus* (Linnaeus, 1758)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 3/1 LEININGER leg.
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 04.06.1925, 0/2 LEININGER leg.
- LU92SO FR, Breisach, Ihringen 02.06.1923, 1/0 FRENTZEN leg. 05.06.1925, 1/0 LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 4/1 NOW. leg.
- MU38NW OG, Achern, 25.06.1921, 0/1 BAL. leg. OG, Achern, Oberachern 13.06.1931, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 19.06.1931, 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 2/3 coll. FISCHER (Meess, 1900). RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 2/0 coll. FISCHER.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 11.06.1949, 1/0 NOW. leg. 15.06.1951, 3/1 NOW. leg. 28.06.1951, 2/0 NOW. leg. 09.07.1951, 1/0 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 07.07.1929, 1/0 BECKER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- Capsodes (Horistus) cingulatus* (Fabricius, 1787)
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren 04.06.1925, 0/1 LEININGER leg. 21.06.1953, 1/2 NOW. leg. 24.06.1953, 1/1 NOW. leg.
- MU01SW FR, Freiburg, Munzingen, 09.06.1922, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 1/0 NOW. leg.
- MU02SW FR, Breisach, Ihringen, Himmelberg, 21.05.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 13.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt 04.09.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). 06.07.1900, 2/4 coll. FISCHER (Meess, 1900). RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 1/3 coll. FISCHER.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 30.07.1963, 1/1 NOW. leg. 25.06.1964, 0/3 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 22.06.1923, 1/0 LEININGER leg.

- 13.07.1929, 1/0 HOHNDORF leg., coll. NOW.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 09.07.1951, 5/5 NOW. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.07.1956, 2/2 NOW. leg.

Halticus apterus (Linnaeus, 1761)

- MU11NW FR, Freiburg 05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 25.07.1900, 2/1 coll. FISCHER.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 30.06.1937, 0/1 auf Wiese, BAL. leg.
 MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 14.07.1897, 0/1 coll. FISCHER.
 NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 15.07.1933, 2/1 1 Ex. (M, 1 Ex. macrop-ter) an *Sarothamnus*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 10.08.1932, 0/2 (1 W macr.) an *Trifolium*, BAL. leg.

Halticus luteicollis (Panzer, 1805)

- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier 24.06.1938, 1/0 an *Malva silvatica*, BAL. leg.
 23.07.1938, 0/1 an *Malva silvatica*, BAL. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 24.06.1938, 0/1 an *Malva silvatica*, BAL. leg.
 MU29SW OG, Achern, Rheinau, 19.06.1934, 1/0 an *Populus tremula*, BAL. leg.
 NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 20.07.1934, 0/1 an *Mentha aquatica*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 09.08.1932, 1/0 an *Aegopodium*, BAL. leg.
 04.08.1938, 0/1 an *Symphoni. carpus*, BAL. leg.
 05.08.1942, 1/0 an *Pimpinella*, BAL. leg.

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.

Pachytomella parallela (Meyer-Duer, 1843)

Boreomontane Art, die in den Hochmooren und auf den Feuchtwiesen des Schwarzwaldes wohl häufig ist.

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberger Hof, 30.08.1933, 1/0 unter *Potentilla si.*, BAL. leg.
 MU31SW FR, Kirchzarten, Breitnau, Juli 1907, 1/0? leg., coll. BAL.

- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 1/0 1 Larve coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 11/7 NOW. leg.
 MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhestein 16.07.1958, 9/7 1 Larve NOW. leg.
 01.07.1960, 5/0 NOW. leg.
 MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliffkopf, Juli 1959, 5/5 NOW. leg. (Voigt, 1977c).
 MU59SW RA, Gernsbach, Forbach, 08.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.

Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)

- Diese seltene Art war bisher nur von Funden um 1900 bekannt (Hüeber, 1894-1913; Meess, 1907 und Rieger, 1972). Nur ein neuerer Fund bei Lauda (Rieger & Strauß, 1992).
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Juli 1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).

Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1776)


- MU38NW OG, Achern, Oberachern 03.06.1931 und 19.06.1931, je 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
 Jungwald, 22.06.1931, 1/0 BAL. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 14.06.1949, 1/0 (f. *mutabilis*) NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 28.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Orthocephalus saltator Hahn, 1835

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 1/0 NOW. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 15.07.1937, 1/0 auf Wiese, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 13.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 29.07.1935, 1/0 unter faulender Luzerne, BAL. leg.

Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)

- MU11NW FR, Freiburg, 05.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beierteimer Wäldchen, 21.07.1966, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 11.08.1965, 2/1 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 21.07.1965, 0/1 AMSEL leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 07.08.1933, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 05.08.1934, 2/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 14.07.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.



Karte 8. *Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1831).
Baden-württembergische
Fundorte in der Samm-
lung des SMNK.

Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli,
1763)

NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
13.07.1933, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.

Heterocordylus (Heterocordylus) leptocerus (Kirsch-
baum, 1856)

Von dieser Art veröffentlichte Hieber (1894-1913)
einen Nachweis aus Murr bei Marbach, dessen Beleg
aber verloren ist (Rieger, 1972), ein weiterer Nach-
weis in der Wutachschlucht (Kless, 1961).

MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhestein, 01.07.1960,
2/0 an *Sarothamnus* NOW. leg.

Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis Hahn, 1831
(Karte 8)

Von dieser Art gibt Hieber (1894-1913) zwei Nach-
weise: Bulach und Murr. In Baden anscheinend ver-
breitet (Meess, 1900 & 1907), allerdings keine Nach-
weise nach 1938. Aus Württemberg liegen 2 neuere
Nachweise bei Nürtingen vor (Rieger, 1972).

MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
03.05.1932, 1/1 an *Sarothamnus*, BAL.
leg.

MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1907).

MU49SO RA, Gernsbach, Forbach, Herrenwies,
04.06.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1907).

- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 29.05.1900, 3/6 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald, 04.06.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn, 29.08.1938, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis* (Herich-Schaeffer, 1835)
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 04.06.1934, 0/1 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 18.06.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg. 27.06.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg. 04.07.1949, 0/2 an *Prunus*, BAL. leg. 08.07.1949, 0/1 an *Prunus*, BAL. leg. 24.06.1950, 1/1 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.
- Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Vogtsburg, Haselschacher Buck, 29.08.1933, 1/2 BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, 25.09.1931, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 17.08.1940, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 05.08.1936, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg. 26.08.1937, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg. 10.08.1938, 4/0 an *Corylus*, BAL. leg. 24.08.1938, 0/2 an *Corylus*, BAL. leg. 10.08.1942, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg. 24.08.1949, 1/3 an *Corylus*, BAL. leg. 09.09.1949, 0/2 an *Corylus*, BAL. leg.
- Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Duer, 1843)
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 03.07.1934, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg. 06.07.1934, 3/2 an *Fraxinus*, BAL. leg. 17.07.1941, 1/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Orthotylus) flavinervis* (Kirschbaum, 1856)
- MU38NW OG, Achern, 08.06.1931, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Orthotylus) marginalis* Reuter, 1884
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 19.06.1941, 1/0 an Gräsern, BAL. leg. OG, Kehl a. R., Hanauer Land, 23.06.1937, 0/1 an *Salix alba*, BAL. leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 26.06.1937, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.08.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 14.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV68SW KA, Mannheim, City 19.06.1934, 1/0 an *Salix alba*, BAL. leg. 25.06.1934, 2/0 an *Salix alba*, BAL. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 14.07.1933, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 04.07.1949, 1/1 an *Prunus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Orthotylus) nassatus* (Fabricius, 1787)
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 11.08.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 13.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- Orthotylus (Orthotylus) prasinus* (Fallén, 1829)
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 05.08.1936, 0/1 an *Corylus*, RIEGER det., BAL. leg. 21.07.1941, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Orthotylus) tenellus* (Fallén, 1829)
- MU38NW OG, Achern, 10.06.1932, 1/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Neopachylops) adenocarpi adenocarpi* (Perris, 1857)
- Erstnachweis dieser atlantischen an Besenginster lebenden Art erst 1989 bei Hockenheim und später bei Neustadt im Schwarzwald (Rieger & Strauß, 1992). Hier nun ein alter Fundpunkt zwischen den beiden anderen gelegen.
- MU38NW OG, Achern, 27.06.1932, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- Orthotylus (Neopachylops) concolor* (Kirschbaum, 1856)
- Aus Württemberg ist diese an *Sarothamnus* gebundene Art erst durch Rieger (1972) bekannt geworden.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 22.06.1931, 0/1 BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.07.1967, 1/0 angefliegen, NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/3 an *Saroth.*, KUSSMAUL leg.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn 29.07.1938 und 31.07.1938, je 0/2 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- NV07NW MOS, Strümpfelbrunn, Katzenbuckel, 01.08.1938, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Neopachylops) virescens* Douglas & Scott, 1865
- MU38NW OG, Achern, Oberachern Waldrand, 22.06.1931, 1/1 an *Teucrium*, BAL. leg. 16.07.1931, 0/2 an *Sarothamnus*, BAL. leg.

- MU38SO OG, Achern, Kappelrodeck, Brandmatt, 26.08.1933, 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 17.07.1957, 0/3 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 an *Saroth.*, KUSSMAUL leg.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn, 29.07.1938, 2/0 *Sarothamnus*, BAL. leg.
- Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum* (Fallén, 1807)
- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 05.11.1938, 1/0 unter *Calluna*, BAL. leg.
- Melanotrichus flavosparsus* (C.Sahlberg, 1842)
- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933, 0/3 an Melde, BAL. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 01.09.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 1900, 0/2? leg.
08.08.1958, 0/1 NOW. leg.
02.08.1963, 0/1 am Licht, NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB, 17.08.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal 08.06.1934, 0/3 an Melde, BAL. leg.
04.06.1935, 0/1 an Melde, BAL. leg.
- Mecomma (Mecomma) ambulans* (Fallén, 1807)
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07 1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07 1960, 0/1 (macropter!) RIEGER det., NOW. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 1/0 NOW. leg.
- Globiceps (Paraglobiceps) cruciatus* Reuter, 1879
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 24.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 1/0 NOW. leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 30.06.1937, 1/0 auf Wiese, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 18.06.1931, 0/1 an *Galium*, BAL. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald, 08.07.1922, 0/2? leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/3 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 27.05.1967, 1/0 angefliegen, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 13.07.1956, 2/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 04.07.1948, 0/2 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 09.06.1934, 1/0 an *Artemisia*, BAL. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- Globiceps (Paraglobiceps) flavomaculatus* (Fabricius, 1794)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 05.07.1937, 0/1 auf Wiese, BAL. leg.
24.06.1938, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 16.07 1931, 2/0 an *Urtica*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach 15.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
16.07.1900, 3/1 coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 2/0 coll. FISCHER.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 30.07 1963, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 03.07.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 23.07 1952, 1/1 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 16.07.1955, 1/0 NOW. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 23.07.1935 0/1 an *Trifolium prat.*, RIEGER det., BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 06.07.1934, 1/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- Globiceps (Globiceps) sphegiformis* (Rossi, 1790)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 24.06.1938, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/2 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 23.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 14.06.1950, 1/0 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 14.07 1933, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 03.07.1934, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

- MU38NW OG, Achern
30.06.1931, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.
12.09.1931, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.
15.09.1933, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern, 20.07.1932, 0/1
an *Malus*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
21.07.1959, 1/0 NOW. leg.
24.08.1960, 1/0 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
06.09.1950, 1/0 NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
21.07.1934, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)

- MU38NW OG, Achern, 27.05.1932, 1/0 an *Quercus*,
BAL. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.05.1900,
0/1 coll. FISCHER.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 25.05.1955, 1/0
NOW. leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 29.05.1900, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV71NO PF, Pforzheim, Hohberg, Wald,
25.05.1986, 1/0 WALLNER leg.
- NV05SW HN, Bad Rappenau, Babstadt,
21.05.1921, 1/0 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
27.05.1949, 0/2 an *Cornus* u. *Prunus*,
BAL. leg.

Cyllocoris histrionicus (Linnaeus, 1767)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 2/1
NOW. leg.
- MU38NW OG, Achern
27.05.1932, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
01.06.1932, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 30.05.1958, 1/0
AMSEL leg.

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)

- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
22.08.1933, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 21.07.1959, 0/1
NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
20.08.1932, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
31.08.1932, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.

Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
15.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
- NV17SO MOS, Mosbach, Rittersbach, 24.07.1934,
1/0 an *Quercus*, BAL. leg.

Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1855)

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental
22.07.1934, 1/0 unter *Artemisia*, BAL. leg.
18.08.1935, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
13.08.1932, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
02.08.1935, 1/0 an *Salix alba*, BAL. leg.

Pilophorus perplexus (Douglas & Scott, 1875)

- Josifov (1989) synonymisierte *P. pusillus* Reut. mit *P. perplexus* Doug. & Sc., da das Typenmaterial Reuters eindeutig *P. perplexus* Doug. & Sc. war. *P. pusillus* Reut. wird dadurch zu einer Form von *P. perplexus* Doug. & Sc., die sich durch geringere Körpergröße auszeichnet. Von dieser Form fand sich ein Exemplar in der Coll. Balles (s. u.). ..elde., 05.07.1898, 0/1 coll. FISCHER.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1
NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
23.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
05.10.1955, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
24.08.1951, 0/3 NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel
23.07.1934, 1/0 an *Salix*, BAL. leg.
24.07.1934, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
07.09.1932, 0/1 an Apfelbaum, BAL. leg.
02.08.1935 1 0 an Zwetschge, BAL. leg.
17.08.1935, 0/1 (f. *pusillus*!) unter Moos
im Pinetum, BAL. leg.
24.08.1938, 0/1 an Zwetschge, BAL. leg.

Pilophorus simulans Josifov, 1989

- Diese Art ist der kleineren Form von *P. perplexus* Doug. & Sc. sehr ähnlich und äußerlich nur durch den beborsteten Hinterrand des Kopfes zu unterscheiden, sie wurde erst von Josifov (1989) erkannt. Viele frühere Meldungen von *P. pusillus* Reut. betreffen *P. simulans* Jos. und es ergibt sich somit folgende Synonymie: *P. simulans* Jos. = *P. pusillus* auct. non Reuter, 1878. Es ist erst ein Fundort aus Baden-Württemberg bekannt: Amstetten (Günther leg., Rieger, 1987, Josifov, 1989).
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt,
05.08.1949, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.

Cremnocephalus alpestris E.Wagner, 1941

MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950,
1/1 NOW. leg.

Omphalonotus quadriguttatus (Kirschbaum, 1856)

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
03.08.1937, 0/4 unter *Ononis*, BAL. leg.

Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767)

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
1/0 NOW. leg.

Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835)

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
02.08.1935, 1/0 unter *Ononis*, BAL. leg.
Pinetum, 07.08.1935, 0/1 unter Moos,
BAL. leg.
Pinetum, 12.08.1935, 0/2 unter Moos,
BAL. leg.
13.08.1935, 0/1 unter Kiefernmoos, BAL.
leg.

Macrotylus (Macrotylus) herrichi (Reuter, 1873)

LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 1/1
LEININGER leg.

MU01NW FR, Freiburg Tuniberg, Meringingen,
06.06.1922, 1/0 LEININGER leg.

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/2
NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
18.06.1955, 5/2 NOW. leg.

MV78NO HD, Weinheim/B.
06.05.1953, 2/1 NOW. leg.
23.05.1959, 2/1 NOW. leg.

NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
14.06.1949, 1/7 NOW. leg.

Macrotylus (Alloeonycha) horvathi (Reuter, 1876)

Der erste Nachweis dieser an *Ballota nigra* L. gebundenen Art für Baden-Württemberg (MU 97, Kochhartgraben) findet sich in Rieger (1987). Zur Verbreitung in der Bundesrepublik (Rieger, Burghardt & Remane, 1980). Der unten genannte Fundort ist den dort aufgeführten aus dem unteren Maingebiet benachbart.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
25.08.1934, 25.08.1937 und 05.08.1939,
je 1/0 an *Ballota nigra* L., BAL. leg.
11.08.1939, 1/0 BAL. leg.
30.08.1950, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg.
06.09.1950, 0/3 an *Ballota nigra* L., BAL.
leg.

Macrotylus (Alloeonycha) paykulli (Fallén, 1807)

NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
13.07.1933, 0/2 an *Ononis*, BAL. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
12.08.1932, 1/0 an *Ononis repens*, BAL.
leg.
31.08.1932, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
02.08.1935, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.

Macrotylus (Alloeonycha) solitarius (Meyer-Duer, 1843)

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
05.08.1932, 0/1 an *Stachys sylvatica*,
BAL. leg.
07.08.1933, 0/1 an *Centaurea*, BAL. leg.
29.07.1937, 0/1 an *Stachys sylvatica*,
BAL. leg.

Harpocera thoracica (Fallén, 1807)

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 0/1
NOW. leg.

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Mai 1955, 1/1
NOW. leg.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, April 1951, 1/0
NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
22.04.1949, 12/11 an *Juglans*, NOW. leg.
23.06.1954, 0/1 NOW. leg.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
17.04.1957, 1/1 NOW. leg.

MV71NO PF, Pforzheim, Hohberg, Wald,
24.05.1986, 1/0 WALLNER leg.

MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW.
leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
25.04.1934, 0/1 an Heckenrose, BAL. leg.
21.05.1949, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
24.05.1949, 0/1 an *Prunus spinosa*, BAL.
leg.

Plagiognathus (Plagiognathus) alpinus (Reuter, 1875)

NV16NO MOS, Mosbach, Katzental
20.07.1934, 16.08.1939, 20.08.1939, und
29.07.1941, je 1/0 an *Mentha aquatica*,
BAL. leg.

Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius, 1794)

MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni
1941, 0/1 BECKER leg.

MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER.

MU38NW OG, Achern, 04.07.1932, 0/2 an *Salix*,
BAL. leg.

OG, Achern, Oberachern
13.06.1931, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
18.06.1931, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.

- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 15.08.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 06.06.1966, 0/1 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald, 23.06.1950, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 28.06.1951, 0/1 NOW. leg. 23.06.1954, 1/0 NOW. leg. 18.08.1954, 0/1 NOW. leg.
 MV62NO KA, Pfünz, Söllingen, östl. DB, 11.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
 MV68SW MA, Mannheim, City 15.06.1934, 0/1 BAL. leg. 18.06.1934, 0/1 an *Gräsern*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 03.08.1936, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg. 05.08.1936, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg. 12.07.1949, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg. 14.07.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff, 1864)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 14.07.1937, 2/0 auf Wiese, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 2/2 coll. FISCHER.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 30.07.1963, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 13.07.1956, 1/0 NOW. leg.
 MV68SO MA, Mannheim, Käfertal 08.06.1934, 2/0 an *Artemisia vulgaris*, BAL. leg. 11.06.1934, 2/1 an *Potentilla*, BAL. leg.
 NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn 29.07.1938, 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg. 01.08.1938, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 08.08.1931, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
 NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 19.08.1933, 0/1 BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 05.08.1932, 1/0 an *Trifolium pratense*, BAL. leg. 03.08.1936, 2/0 an *Urtica*, BAL. leg. 28.07.1939, 0/1 "St. silo", BAL. leg. 24.07.1941, 1/0 BAL. leg. 24.07.1942, 1/0 an Schneebeere, BAL. leg. 13.07.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 15.07.1949, 1/1 *Urtica*, BAL. leg.

Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis (Kirschbaum, 1856)

- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 23.07.1938, 1/2 an Luzerne u. *Lolium*, BAL. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh. 15.07.1937, 1/0 auf Wiese, BAL. leg. 23.07.1938, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, Oberachern 22.06.1931, 0/1 an *Grashang*, BAL. leg. 23.06.1931, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 4/1 coll. FISCHER.
 MU89NW CW, Calw, 03.07.1940, 0/1 ZWECKER leg., coll. BAL.

Plagiognathus (Poliopterus) albipennis (Fallén, 1829)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 26.06.1937, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg. 1940, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 0/2 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 19.06.1950, 0/1 NOW. leg. 02.08.1963, 1/0 am Licht, NOW. leg. 11.08.1966, 1/0 angefliegen, NOW. leg.
 MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 13.06.1934, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.

Plagiognathus (Poliopterus) arenicola E. Wagner, 1941


- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 13.06.1934, 0/1 an *Eryngium*, BAL. leg.

Atomoscelis onustus (Fieber, 1861)

- Erstnachweis für Baden-Württemberg!** Es ist in unklar wie es zu diesem Fund dieser nach Wagner (1952 & 1975) wahrscheinlich halophilen Art kommen konnte. Mir sind keine Salzstellen aus Karlsruhe und Umgebung bekannt, evtl. könnte die damalige hohe Salzfracht des Rheins eine Rolle gespielt haben. Der nächstgelegene Fundort liegt bei Schwabenheim a. d. Selz bei Mainz (Günther, 1981).
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, 21.07.1959, 0/1 NOW. leg., RIEGER det. bestätigt.

Campylomma verbasci (Meyer-Duer, 1843)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 2/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 04.07.1939, 0/2 an *Verbascum*, BAL. leg.
 MU29SW OG, Achern, Rheinau, 28.05.1934, 0/1 BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, 12.09.1931, 0/1 an *Angelica*, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 19.06.1950, 0/2 NOW. leg. 21.07.1959, 0/1 NOW. leg.



Karte 9. *Lepidargyrus ancorifer* (Fieber, 1858). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 27.09.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 14.06.1934, 0/1 an *Verbascum*, BAL. leg.
- MA, Mannheim, Käfertal, Rheinaue, 30.06.1934, 1/0 an *Verbascum*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 24.08.1938, 0/1 an Zwetschge, BAL. leg.

Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807)

- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 17.07.1957, 1/0 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 09.06.1934, 0/2 an *Potentilla aren.*, BAL. leg.

Chlamydatus (Euattus) pullus Reuter, 1870

- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden 09.09.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- 17.07.1952, 1/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 22.09.1965, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 18.06.1934, 1/0 BAL. leg.

Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans (Fallén, 1807)

- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 4/11 NOW. leg.

- Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens* Boheman, 1852
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 21.06.1953, 0/7 NOW. leg. (Voigt, 1977b).
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 2/5 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
10.07.1952, 1/7 NOW. leg. (1 Ex. macrop-
ter!).
09.07.1958, 6/4 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 9/6 NOW.
leg.
- Sthenarus rottermundi* Scholtz, 1846
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 12.06.1937, 1/1 an
Populus alba, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 30.06.1934, 0/1 an
Populus alba, BAL. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 25.06.1934, 0/1 an
Populus alba, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, Waldrand
14.04.1934, 1/0 unter Kiefernmoos, BAL.
leg.
- Salicarius roseri* (Herrich-Schaeffer, 1839)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh.
11.06.1937, 4/5 an *Salix alba*, BAL. leg.
17.06.1937, 1/0 an *Salix alba*, BAL. leg.
- Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829)
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 10.07.1959, 0/1
am Licht, NOW. leg.
- Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, Brache,
28.07.1933, 1/0 BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Kalktrift,
10.08.1935, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
- Atractotomus (Atractotomus) magnicornis* (Fallén,
1807)
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 24.08.1960, 1/0
NOW. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 05.09.1933, 0/1
an *Picea*, BAL. leg.
- Atractotomus (Atractotomus) mali* (Meyer-Duer, 1843)
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 17.06.1938,
0/1 an *Malus*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.07.1932, 0/1
an *Malus*, BAL. leg.
- Atractotomus (Atractotomus) parvulus* Reuter, 1878
- Bisher 4 Nachweise für Baden-Württemberg (Rieger,
1987), ein weiterer unveröffentlicht vom Hohentwiel bei
Singen (Aukema & Rieger, persönl. Mitteilung).
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
22.08.1933, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
- Compsidolon (Coniortodes) salicellus* (Herrich-Schaeffer, 1841)
- MU38NW OG, Achern, 30.06.1931, 0/1 an *Corylus*,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
10.08.1938, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- Lepidargyrus ancorifer* (Fieber, 1858) (Karte 9)
- Bis vor kurzem war die Art noch unter *Psallus* ssp.
Apocremnus eingeordnet, inzwischen gilt sie als eigen-
e Gattung, die Subspecies erhalten Antrang (Drapo-
lyuk, 1993).
- Bisher war die Art in Baden-Württemberg nur vom
Isteiner Klotz bekannt (Günther, Rieger & Burghardt,
1982). Die Art ist wohl in der Oberrheinebene verbreit-
et, vom Hochrhein zwei Fundorte bei Jestetten
(Heckmann leg., unveröffentlicht).
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 21.07.1938,
1/0 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, 18.08.1933, 0/1 an *Trifolium*
pratense, BAL. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 09.07.1958, 2/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,
28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- Psallus (Mesopsallus) ambiguus* (Fallén, 1807)
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 25.06.1938, 0/2 an *Pirus*
malus, BAL. leg.
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glas-
waldsee, 05.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 14.07.1933,
0/1 an *Salix*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
03.06.1949, 0/1 an *Malus*, BAL. leg.
06.06.1949, 1/0 an Apfelbaum, BAL. leg.
- Psallus (Hylopsallus) perrisii* Mulsant, 1852
- NV11NW LB, Ludwigsburg, Favoritenpark,
27.05.1953, 1/0 NOW. leg.
- Psallus (Hylopsallus) variabilis* (Fallén, 1829)
- MU18SO OG, Kehl a. R., Hanauer Land,
18.06.1937, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- Psallus (Psallus) confusus* Rieger, 1981
- Diese Art läßt sich im männlichen Geschlecht sehr gut
mit Rieger (1981b) bestimmen.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 17.06.1940,
1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
- Psallus (Psallus) flavellus* Stichel, 1933
- MU38NW OG, Achern, 28.06.1932, 1/0 an *Fraxinus*,
BAL. leg.

Psallus (Psallus) varians (Herrich-Schaeffer, 1842)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 1/0 NOW. leg.
 MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliffkopf, Juli 1959, 1/0 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 25.06.1964, 1/0 NOW. leg.
 MV81NW PF, Niefern, Enzrücken, 09.06.1986, 0/1 WALLNER leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 12.07.1941, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg. 28.05.1949, 0/1 an *Populus*, BAL. leg. Beide W: Rieger det.

Psallus (Pityopsallus) luridus REUTER, 1878

- NU66NO UL, Ulm, Mähringen, 28.06.1981, 3/0 FREY leg.

Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 03.07.1953, 0/2 NOW. leg. 27.07.1966, 0/1 („a.w.“) NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 15.07.1965, 0/2 NOW. leg. 11.08.1965, 0/2 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 05.07.1896, 1/0 coll. FISCHER.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 05.08.1934, 1/0 an *Galeopsis*, BAL. leg. 06.08.1942, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.

Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 0/1 NOW. leg.
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 17.06.1938, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
 MU28NO OG, Achern, Großweier, Wald, 28.06.1934, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, 11.06.1931, 0/1 an *Alnus*, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 2/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 25.06.1964, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 14.06.1950, 0/1 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 24.06.1960, 2/1 AMSEL leg.

Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 24.06.1938, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg. 25.06.1938, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.

Lopus decolor decolor (Fallén, 1807)

- MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 2/0 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 01.08.1935, 0/2 an Waldgras, BAL. leg. MOS, Adelsheim, Hergenstadt, 01.08.1935, 0/2 an Waldgras, BAL. leg.
 NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, Wald, 10.07.1940, 0/1 BAL. leg.

Amblytylus albidus (Hahn, 1834)

Bisher ist Sandhausen der einzige Fundort dieser Art in Baden-Württemberg. Der Nachweis ist bereits in Meess (1907) publiziert, seither nicht wieder aufgefunden.

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 16.07.1899, 1/0 RIEGER det., coll. FISCHER.

Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)

- MU38NW OG, Achern 04.07.1932, 0/1 im Salicetum, BAL. leg. 28.06.1933, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 14.06.1955, 1/0 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 15.06.1951, 1/4 NOW. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 16.07.1955, 0/1 NOW. leg.
 MV68SO MA, Mannheim, Käfertal 11.06.1934, 0/2 an *Bromus racemosus*, BAL. leg. 14.06.1934, 2/0 an *Melandryum album*, BAL. leg.

Megalocoleus molliculus (Fallén, 1829)

- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 0/2 LEININGER leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 09.07.1958, 1/2 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 16.07.1950, 0/1 NOW. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 0/1 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 08.08.1932, 0/2, BAL. leg. 03.08.1933, 0/1 an *Achillea*, BAL. leg.

- 19.07.1935, 0/1 an *Achillea*, BAL. leg.
 29.07.1935, 0/1 an *Achillea*, BAL. leg.
 24.07.1942, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
 12.08.1942, 0/1 an *Achillea*, BAL. leg.

Megalocoleus pilosus (Schrank, 1801)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 13.07.1937, 1/0 auf Wiese, BAL. leg.

Hoplomachus thunbergi (Fallén, 1807)

- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1907).

Conostethus roseus (Fallén, 1829)

Erstnachweis für Baden-Württemberg! Anscheinend ist der Fundort "Achern" in diesem Falle etwas großzügig aufgefaßt worden, das Tier könnte am Rheinufer gefangen worden sein. Die Art lebt sonst an Gräsern auf sterilen Böden an Gewässerufem. Der nächstgelegene Fundort befindet sich bei Speyer in Rheinland-Pfalz (C. Rieger, persönl. Mitteilung).

- MU38 OG, Achern, 05.06.1936, 0/1 RIEGER det., BAL. leg.

Placochilus seladonicus (Fallén, 1807)

- MT69NW VS, Blumberg, Achdorf, Aug. 1924, 1/1 coll. LEININGER.

Asciodema obsoletum (Fieber, 1864)

Erstnachweis dieser an Besenginster lebenden Art für Baden-Württemberg erst 1979 bei Eßlingen (NU29) durch Rieger (1987).

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 03.07.1932, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
 NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn 30.07.1938 und 01.08.1938, je 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.

Nabidae

Prostemma guttula (Fabricius, 1787)

- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 0/2 NOW. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 1/0 NOW. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg 06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
 17.09.1952, 0/1 NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 10.09.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 25.08.1930, 5/1 BECKER leg.
 17.09.1949, 0/2 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 30.08.1948, 1/0 NOW. leg.

Alloeorhynchus flavipes (Fieber, 1836)

Seltene xerothermophile Art von der erst Voigt (1977b) für Baden-Württemberg 2 Fundorte veröffentlichte (Kaiserstuhl und Ittersbach bei Karlsruhe) ein weiterer Fundort ist Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978). Bei Hüeber (1891-1913) findet sich ein vager Hinweis auf ein Vorkommen dieser Art in Württemberg ohne Fundortangabe.

- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 05.11.1938, 0/1 unter *Sedum*, BAL. leg.

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Aug. 1922, 0/1 (macropter) FRENTZEN leg.
 MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 15.09.1931, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 15.10.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 12.08.1900, 0/1 (macrop.) coll. FISCHER (Meess, 1900).
 16.08.1900, 0/1 (macrop.) coll. FISCHER (Meess, 1900).
 15.08.1927, 0/1 BECKER leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 06.09.1950, 0/2 NOW. leg.
 24.08.1957, 1/0 NOW. leg.
 NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach, 27.08.1936, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 19.08.1936, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 26.08.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.

Aptus mirmicoides (O.Costa, 1834)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 14.07.1933, 1 Larve LEININGER leg.
 MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1 NOW. leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 1/0 NOW. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg 06.08.1952, 1/0 NOW. leg.
 01.09.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 1/0 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 03.07.1922, 2 Larven LEININGER leg.
 13.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
 17.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 06.05.1936, 1/0 LEININGER leg.

- KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
08.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 22.09.1898, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Neureut, 20.07.1932,
1 Larve LEININGER leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Horster Graben, Wiese,
03.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, Lehmwand,
17.08.1987, 1 Larve KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Söllingen, zw. Pfinz u. DB
17.08.1987, 1 Larve KUSSMAUL leg.
03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfinztal, Tongrube Eder, Heulenberg,
20.08.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1900, 1/0
coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
14.05.1899, 1/2 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen,
27.07.1988, 5 Larven HASSLER leg.
KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise,
22.07.1988, 1 Larve HASSLER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988,
1 Larve HASSLER leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg,
01.10.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Ramberg, Auweghohle,
13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhohle,
13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B.,
27.08.1952, 0/1 NOW. leg.
06.05.1959, 1/0 NOW. leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 1/0
LEININGER leg.
- NU07NO TÜ, Tübingen-Lustnau, 20.07.1981, 2 Larven
FREY leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide,
10.09.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt,
10.10.1949, 1/0 unter *Prunus spinosa*,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
07.09.1932, 0/2 an *Malus*, BAL. leg.
17.08.1935, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
07.08.1936, 1/0 (macropter) an *Fraxinus*,
BAL. leg.
01.08.1949, 1/0 an *Betula*, BAL. leg.
05.08.1949, 1/1 (M macropt.) an *Cornus*,
BAL. leg.
24.08.1949, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- Anaptus major* (A.Costa, 1842)
- MU38NW OG, Achern, 19.08.1933, 0/1 im Salicetum,
BAL. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1
NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg,
06.08.1952, 0/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.08.1952, 0/1 NOW. leg.
15.07.1965, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube
28.07.1988, 1/0 unter *Tanacetum*,
KUSSMAUL leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
07.09.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/0 NOW.
leg.
- Nabicula (Dolichonabis) limbata* (Dahlbom, 1850)
- MT29NO WT, Todtnau, Bernau, Aug. 1934, 0/1
STRITT leg.
- MT69NW VS, Blumberg, Achdorf, 12.08.1939, 0/1
BECKER leg.
- MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“,
Aug. 1928, 0/1 BECKER leg.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle,
16.08.1936, 1/0 LEININGER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.07.1952, 0/2 NOW. leg.
24.08.1955, 0/2 NOW. leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Söllingen, östl. DB,
11.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NU07NW TÜ, Tübingen, Stadtgebiet, 09.07.1981,
0/1 FREY leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
10.08.1932, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
14.08.1937, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- Nabicula (Nabicula) flavomarginata* (Scholtz, 1847)
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900,
1/0 coll. FISCHER.
- MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhenstein, 16.07.1958,
2/0 NOW. leg.
- Nabis (Nabis) brevis* Scholtz, 1847
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
11.04.1931, 0/1 an *Quercus*, BAL. leg.
Wald, 04.05.1931, 0/2 in Bodenstreu,
BAL. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
10.07.1952, 0/1 NOW. leg.
06.08.1952, 1/0 NOW. leg.
17.09.1952, 0/2 NOW. leg.
- MV61NW KA, Waldbronn, Etzenrot, 08.08.1988, 0/1
KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder,
24.09.1987, 0/2 KUSSMAUL leg.

- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 11.03.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Büchenau, Schönbornwiesen, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg. KA, Untergrombach, Habichtsbuckel u. Weihertal, 07.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg. KA, Untergrombach, Michaelsberg, "Grund", 26.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Oberöwisheim, Mausberg, 01.10.1988, 1/1 HASSLER leg. KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 0/3 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Duttenthalohle, 12.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg. KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhohle, 13.05.1988, 0/2 KUSSMAUL leg. KA, Bruchsal, Spiegelberg, Ruderalfläche, 13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg. UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 14.10.1949, 0/1 in *Prunus spi.*-Bodenstreu, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 08.03.1934, 0/1, BAL. leg. 21.03.1934, 1/0 "Waldrandmoos", BAL. leg. 12.10.1948, 0/1, BAL. leg.
- Nabis (Nabis) ericetorum* Scholtz, 1846
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/1 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 27.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- NU42SO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Taubes Ried, 13.06.1981, 0/1 FREY leg.
- Nabis (Nabis) ferus* (Linnaeus, 1758)
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/2 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 07.09.1933, 1/0 LEININGER leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 05.06.1928, 1/1 LEININGER leg.
- Nabis (Nabis) pseudoferus* Remane, 1949
- Die Belegexemplare der Meldungen von *Nabis ferus* L. bei Meess (1900) sind allesamt *N. pseudoferus* Rem. LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 6/1 LEININGER leg.
- MU38NW OG, Achern, 29.05.1931, 1/0 BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 18.02.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.05.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900)..
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder, 24.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg. KA, Pfinztal, Tongrube Eder, Heulenberg, 25.08.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV67SO MA, Mannheim, Rheinau, 08.09.1931, 0/2 an *Pinus*, BAL. leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 0/2 HASSLER leg.
- MV74SO KA, Bruchsal, Unteröwisheim, Breitwiesen, 27.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 2/0 LEININGER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg. UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 24.08.1931, 0/1 BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach 05.03.1934, 0/1 unter Waldmoos, BAL. leg. 14.03.1934, 1/0 unter Waldmoos, BAL. leg. 19.08.1949, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 05.01.1932, 0/1 unter Waldlaub, BAL. leg. 22.03.1932, 1/0 unter Waldmoos, BAL. leg. 01.04.1932, 0/1 unter "Waldrandmoos", BAL. leg. 04.04.1932, 0/1 unter "Waldrandmoos", BAL. leg. 08.03.1934, 0/1 auf Wiese, BAL. leg. 21.03.1934, 2/1 unter Waldmoos, BAL. leg. 01.10.1948, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg. 14.10.1948, 0/1 an Gräsern, BAL. leg. 21.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 02.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- Nabis (Nabis) punctatus* A.Costa, 1847
- Die in Baden-Württemberg wohl seltenste *Nabis* (s. str.) -Art die im Bodenseegebiet ihren Verbreitungsschwerpunkt hat und dort mancherorts häufiger als *N. pseudoferus* Rem. ist (Heckmann, 1989). Einzelne Nachweise vom Isteiner Klotz (Rieger, persönl. Mitteilung), vom Tübinger Spitzberg und bei Ulm (Schwoerbel, 1966), aus dem Buchswald bei Grenzach (Schmid, 1979) und von Mühlheim (Péricart, 1987)
- MT89 KN, Singen, Hegau, 13.08.1935, 0/1 LEININGER leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 0/2 LEININGER leg.
- NT18SW KN, Konstanz, Wollmatingen, 10.08.1928, 0/1 LEININGER leg.

Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus, 1758)

Die Exemplare in Meess (1900) betreffend die Meldungen von *N. brevis* Sz. (Kniebis und Griesbach) sind *N. rugosus* L.

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, 20.05.1951, 1/0 STRITT leg.
- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, Waldrand, 19.10.1938, 0/2 unter Laub, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 23.09.1931, 1/0 an *Corylus* BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 15.08.1922, 1/0 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 06.07.1947, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 02.05.1898, 2/2 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 14.05.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Untergrombach-Süd, Bergwald, 11.10.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
- KA, Untergrombach, NSG Kaiserberg, 04.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Ramberg, Auweghöhle, 13.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhöhle, 13.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 14.07.1946, 1/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- 23.05.1959, 0/1 NOW. leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 0/1 LEININGER leg.
- NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg, 16.07.1927, 0/1 LEININGER leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 06.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- NU07SW Tü, Tübingen, Spitzberg, 27.05.1982, 0/1 Wik. leg.
- NU66NO UL, Ki. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 3/1 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/3 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 17.08.1931, 1/0 an *Sambucus ebulus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 14.10.1948, 1/1 an Waldgras, BAL. leg.
- 02.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Anthocoridae*Temnostethus (Temnostethus) gracilis* Horváth, 1907

- NU65SO UL, Ulm, Erbach, Donaustetten, 02.06.1993, 0/1 BRECHTEL leg.

Temnostethus (Temnostethus) longirostris (Horváth, 1907)

Hierbei handelt es sich um 2 Belegexemplare von Rieger & Günther (1982).

- NU28NW ES, Nürtingen, Im Rieth, 10.07.1978, 1/1 RIEGER leg. & det.

Anthocoris amplicollis Horváth, 1893

- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 26.08.1932, 2/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- 06.07.1934, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- 10.08.1936, 2/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- 06.08.1937, 2/0 an *Fraxinus*, BAL. leg.

Anthocoris confusus Reuter, 1884

- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 21.06.1961, 0/1 NOW. leg.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle, 03.06.1959, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 25.05.1955, 1/0 NOW. leg.
- 25.06.1964, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 08.03.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen Aug. 15.08.1946, 1/0 NOW. leg.
- Sep. 1946, 0/2 NOW. leg.
- Okt. 1946, 1/0 NOW. leg.
- Nov. 1946, 1/0 NOW. leg.
- 14.10.1953, 1/0 NOW. leg.
- KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 01.11.1952, 0/1 NOW. leg.
- 31.05.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 23.05.1959, 0/1 NOW. leg.

Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 23.06.1937, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 21.05.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 30.10.1957, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beiertheimer Wäldchen, 16.02.1950, 0/6 NOW. leg.
- KA, Karlsruhe, City, Park, März 1946, 1/3 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 04.03.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg 15.11.1900, 2/4 coll. FISCHER (Meess, 1900).

- 25.11.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
19.05.1948, 0/1 NOW. leg.
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- Anthocoris limbatus* Fieber, 1836
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
22.01.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
28.01.1900, 0/9 coll. FISCHER (Meess, 1900).
18.02.1900, 0/2 coll. FISCHER.
- Anthocoris minki* (Dohrn, 1860)
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald
19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/3 NOW. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 19.06.1934, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 23.06.1955, 2/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
08.04.1949, 0/1 NOW. leg.
14.06.1955, 2/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
15.06.1949, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
- Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)
- MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 14.05.1951, 0/1 STRITT leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg
Juni 1952, 0/1 NOW. leg.
Baldenschwand, Juni 1952, 0/1 NOW. leg.
Rinkendobel, Juni 1952, 0/2 NOW. leg.
- MU38NW OG, Achern, 25.09.1931, 2/0 an *Prunus* pad. u. *Corylus*, BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern
25.04.1932, 0/1 an *Prunus paduus*, BAL. leg.
11.07.1932, 0/1 an Apfelbaum, BAL. leg.
- MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glaswaldsee, 05.07.1960, 0/5 NOW. leg.
- MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhstein
16.07.1953, 0/1 NOW. leg.
01.07.1960, 2/2 NOW. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
27.06.1950, 0/1 NOW. leg.
21.06.1961, 0/1 NOW. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV50NO KA, Bad Herrenalb, Frauenalb,
03.11.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle
05.06.1952, 0/2 NOW. leg.
03.06.1953, 0/1 NOW. leg.
03.06.1959, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.
25.05.1955, 0/1 NOW. leg.
17.08.1955, 0/4 NOW. leg.
19.09.1956, 1/1 NOW. leg.
30.10.1957, 1/0 NOW. leg.
20.05.1959, 0/1 NOW. leg.
23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
12.06.1962, 0/1 NOW. leg.
30.07.1963, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 13.07.1967, 0/1 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
07.11.1956, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
16.11.1949, 0/2 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 06.03.1957, 0/1 NOW. leg.
- MV63NO KA, Untergrombach-Süd, Bergwald,
11.10.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV74SW KA, Bruchsal, Ramberg, Auweghohle,
13.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, Juni 1949,
0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 01.08.1941,
0/1 auf Trift, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
04.08.1932, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
13.08.1932, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
07.08.1933, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
18.04.1934, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
27.04.1934, 0/1 an Zwetschge, BAL. leg.
19.07.1935, 1/0 an *Ballota nigra* L., BAL. leg.
24.08.1938, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
05.08.1940, 0/1 an *Populus tremula*, BAL. leg.
10.03.1941, 0/1 unter Laub, BAL. leg.
27.06.1949, 0/2 an *Prunus*, BAL. leg.
02.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- Anthocoris pilosus* (Jakovlev, 1876)
- Die 4 unten aufgeführten Exemplare wurden bereits veröffentlicht (Rieger 1987).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
Juli 1946, 0/2 NOW. leg.
Aug. 1946, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 15.07.1946, 0/1 NOW. leg.

Anthocoris sarothamni Douglas & Scott, 1865

Erstnachweis dieser an Besenginster lebenden Art bei Eßlingen (NU29) (Rieger, 1987).

- MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt
26.08.1933, 1/0 RIEGER det., BAL. leg.
12.09.1933, 2/1 BAL. leg.
18.09.1933, 0/1 alle an *Sarothamnus*,
BAL. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube
28.07.1988, 1/2 unter *Sarothamnus*,
KUSSMAUL leg.

Anthocoris simulans Reuter, 1884

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 13.07.1967, 0/1
am Licht, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald
23.06.1950, 0/1 NOW. leg.
19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
06.07.1934, 1/3 an *Fraxinus*, BAL. leg.

Acompcocoris alpinus Reuter, 1875

Diese Art, obwohl erst von Rieger (1987) zum ersten Mal für Baden-Württemberg gemeldet, dürfte fast überall an Koniferen zu finden sein.

- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 21.06.1961,
0/1 NOW. leg.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle,
02.07.1964, 0/1 NOW. leg.

Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835)

- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
20.07.1934, 0/1 an *Larix*, BAL. leg.

Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)

- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 21.09.1938,
0/1 unter *Hieracium pil.*, BAL. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
13.07.1956, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
22.09.1965, 0/2 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,
28.07.1988, 1/3 KUSSMAUL leg.

Orius (Heterorius) horvathi (Reuter, 1884)

Erstnachweis dieser Art für Baden-Württemberg bei Rastatt (MV41) durch R. Remane: 2 M in coll. Kamerschens (Rieger, 1987). Hierbei handelt es sich sicherlich um die in Baden-Württemberg seltenste *Orius*-Art. Die Nachweise von Duderstadt (1974) und Voigt (1977a & 1978) beruhen offenbar auf Fehldeterminationen. Die Art ist inzwischen auch vom Hohentwiel bekannt (HECKMANN, unveröffentl.).

- MV68SW MA, Mannheim, City, 28.06.1934, 0/1 in
Rosenblüte, RIEGER det., BAL. leg.

- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 28.06.1950,
0/1 an *Urtica*, RIEGER det., BAL. leg.

Orius (Heterorius) majusculus (Reuter, 1879)

- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
16.11.1949, 0/2 NOW. leg.
01.11.1950, 0/2 NOW. leg.
26.10.1951, 0/3 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Elfmorgenbruch,
29.04.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum,
10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.

Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758)

- MU38NW OG, Achern, 12.09.1931, 0/1 an *Angelica*,
BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern, 23.07.1931, 1/0
an *Corylus*, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel,
25.04.1932, 0/2 an *Prunus paduus*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899,
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
18.09.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
18.09.1965, 1/0 am Licht, NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.07.1952, 1/0 NOW. leg.
23.09.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 25.06.1934, 2/1 an
Salix alba, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
25.04.1934, 0/2 an *Malus* u. *Lamium al.*,
BAL. leg.
13.05.1934, 0/1 an *Aegofas.*, BAL. leg.
05.08.1936, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
05.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Orius (Heterorius) vicinus (Ribaut, 1923)

- Seltener nachgewiesen als *O. minutus* L. und *majusculus* Reut.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
25.04.1932, 0/3 an *Prunus paduus*, BAL.
leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 05.08.1936,
0/1 an *Corylus*, NOW. leg.

Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
11.08.1954, 1/1 (macropter) NOW. leg.
01.09.1966, 1/0 (macropter) NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.03.1948, 4/2
NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
17.11.1948, 0/1 NOW. leg.
16.11.1949, 2/4 NOW. leg.

Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844)

Der Erstnachweis dieser Art für Baden-Württemberg erfolgte durch Nowotny (1953). Das Zitat wurde aber (Arbeit über Coleopteren) übersehen und daher von Rieger (1987) veröffentlicht.

MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald,
23.04.1951, 0/1 RIEGER det., NOW. leg.

Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 15.07.1958, 0/1 NOW. leg.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 10.10.1958, 2/1 an Apfelbaumrinde, NOW. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
21.03.1932, 1/1 unter Apfelbaumborke,
BAL. leg.

Lyctocoridae*Lyctocoris campestris* (Fabricius, 1794)

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
21.07.1959, 0/1 am Licht, NOW. leg.

26.09.1967, 0/1 angefliegen, NOW. leg.

NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, Öhmdwiese,
10.08.1931, 0/1 BAL. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
16.04.1931, 1/0 an Apfelbaum, BAL. leg.

Cimicidae*Cimex lectularius* Linnaeus, 1758

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 1898, 1/0 coll.
FISCHER (Meess, 1900).

Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816)

MU26SO OG, Offenburg, Gengenbach, 1898, 0/2
in Schwalbennest, coll. FISCHER
(Meess, 1907).

Reduviidae*Empicoris culiciformis* (De Geer, 1773)

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Juni 1955, 0/1
NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.09.1900, 1/0 coll. FISCHER.
08.05.1950, 1/2 NOW. leg.
12.06.1950, 2/1 NOW. leg.

Coranus subapterus (De Geer, 1773)

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
14.07.1947, 0/1 RIEGER det., NOW. leg.

Coranus woodroffei Putshkov, 1982

Von dieser erst von Putshkov (1982) von *Coranus subapterus* DeG. abgetrennten Art wurden von Rieger (1987) erstmalig 3 Fundorte in Baden-Württemberg genannt, auch Strauß (1987) gibt 3 Fundpunkte.

NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 1/0 NOW. leg.

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

MU38NW OG, Achern, Oberachern, 12.05.1931, 1/0
an *Prunus cerasifera*, BAL. leg.

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1
Larve NOW. leg.

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 25.06.1964, 1/0
NOW. leg.

MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 19.05.1934, 1/1
STRITT leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
11.07.1947, 0/1 NOW. leg.
04.07.1951, 0/1 NOW. leg.

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, Mai 1935, 0/1?
leg.

MV67NO MA, Mannheim, Friedrichsfeld,
07.06.1885, 0/1 an *Quercus*,? leg.

MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
04.05.1950, 1/0 KES. leg., coll. NOW.

Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767)

Neben dem Isteiner Klotz (Meess, 1907) sind die untenstehenden Fundorte die einzigen in Baden-Württemberg. Für den Kaiserstuhl schon von Strohm (1933) und dort am Badberg (Engel & Weidner, 1952) erwähnt. Seither ist die Art verschollen. In Deutschland sonst im Mittelrheingebiet und im Osten.

LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 3/0 FRENTZEN leg.

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 1899, 0/1? leg.

Rhynocoris iracundus iracundus (Poda, 1761)

LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren,
22.06.1953, 2/0 NOW. leg.

LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 0/1
FRENTZEN leg.

MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
14.08.1939, 5/1 STRITT leg.
14.07.1943, 1/0 STRITT leg.

MT89SO KN, Singen, Hohentwiel, Juni 1953, 0/1
NOW. leg.

MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Tiengen,
04.06.1922, 0/2 LEININGER leg.

MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Juni 1922,
1/1 FRENTZEN leg.

MU40SW VS, Titisee-Neustadt, Wutach, Gutachor.,
03.07.1940, 0/1 GREMMINGER leg.

MV67NO MA, Mannheim, Friedrichsfeld,
25.06.1884, 0/1? leg.

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren
22.06.1953, 1/0 NOW. leg.
21.06.1959, 1/0 NOW. leg.
- MT69NO VS, Blumberg, Aug. 1923 0/1 FRENTZEN leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899
1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV51NW KA, Malsch, Sulzbach, in
Whg., 18.02.1993, 1 Larve staubmaskiert,
EBERT leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 19.09.1956, 1/0
NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
19.07.1897, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
Juni 1928, 0/1 E. RETTICH leg.
Juni 1929, 0/1 FRENTZEN leg.
07.06.1934, 1/0 STRITT leg.
15.06.1934, 0/1 STRITT leg.
24.05.1953, 1/0 NOW. leg.
08.06.1953, 1/0 NOW. leg.
20.07.1962, 1/0 WILKE leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Weststadt, 14.08.1985, 0/1
EBERT leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 07.07.1929,
0/1 BECKER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach
30.05.1959, 1/0 AMSEL leg.
18.06.1959, 0/1 AMSEL leg.
- NT18SW KN, Konstanz, Aug. 1929, 0/1
LEININGER leg.
- NU42SO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Station,
01.08.1980, 1/0 FREY leg.

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.08.1900,
2/0 coll. FISCHER.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
01.06.1947, 1 Larve, NOW. leg.
03.09.1952, 1 Larve, NOW. leg.
13.11.1957, 1 Larve, NOW. leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
30.04.1952, 1/0 NOW. leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, Spitzberg, 27.05.1982, 1/0
Wlk. leg.

Phymata crassipes (Fabricius, 1775)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 23.06.1942, 2/1
KES. leg.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee,
04.06.1923, 2/0 LEININGER leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, Spitzberg, 09.05.1981, 0/1
WESTRICH leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Kalktrift,
06.08.1935, 0/2 auf Boden, BAL. leg.

Aradidae*Aradus betulinus* Fallén, 1829

- Bisher zwei Nachweise aus Baden-Württemberg: die
Wutatschlucht (Kless, 1961) und Oberessendorf bei
Bad Waldsee in Oberschwaben (Strauß, 1987).
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
Juli 1949, 0/1 NOW. leg.
14.06.1951, 0/1 NOW. leg.

Aradus cinnamomeus (Panzer, 1794)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 06.06.1934, 0/2 an
Pinus, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
24.08.1933, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 14.06.1951,
0/1 NOW. leg.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle, Juni 1952,
1/1 (macropter) NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
23.06.1950, 0/4 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
13.08.1932, 0/2 an *Pinus*, BAL. leg.
21.08.1932, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
25.08.1941, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.

Aradus conspicuus (Herrich-Schaeffer, 1835)

- Von dieser Art gibt es bisher 5 Fundorte in Baden-
Württemberg (Weidner, 1958 und Rieger, 1989b).
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 17.08.1955, 1/1
NOW. leg.

Aradus corticalis (Linnaeus, 1758)

- In der Literatur gibt es einen einzigen weiteren Nach-
weis aus Württemberg, jedoch ohne präzise Fundort-
angabe (Hüeber, 1891). Untenstehender Fund von
Meess (1900) unter *A. annulicornis* F. gemeldet.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 03.06.1899, 0/1
RIEGER det., coll. FISCHER.

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

- MV50NO KA, Bad Herrenalb, Frauenalb, Nov. 1947
1/0 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
16.06.1955, 0/1 NOW. leg.
28.06.1955, 2/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
04.03.1948, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 15.04.1900,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
17.11.1948, 0/1 NOW. leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
30.04.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV82SO PF, Pforzheim, Arlinger, 10.05.1986, 0/1
WALLNER leg.

Aneurus avenius (Dufour, 1833)

- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch,
01.06.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 16.06.1966, 1/0
NOW. leg.

Piesmatidae

Piesma (Piesma) capitatum (Wolff, 1804)

Diese Art läßt sich erst sicher mit Heiss & Péricart (1983) von *P. maculatum* Lap. trennen. Im SMNK waren untenstehende Tiere beider Arten mit Stichel (1955-62) und Wagner (1966) determiniert und so eher zufällig eingeordnet.

- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlichwald,
02.11.1949, 0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 0/3
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
06.04.1949, 0/1 NOW. leg.
12.10.1949, 0/1 NOW. leg.
26.10.1949, 1/0 NOW. leg.
30.08.1950, 0/2 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
05.05.1948, 0/1 NOW. leg.
05.03.1953, 0/1 NOW. leg.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949,
0/1 NOW. leg.

Piesma (Piesma) maculatum (Laporte, 1832)

- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel
07.06.1932, 0/1 an *Abies alba*, BAL. leg.
01.10.1932, 2/0 in Waldlaub, BAL. leg.
20.10.1933, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
Callunetum, 21.10.1933, 0/2 am Boden,
BAL. leg.
MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.02.1950, 0/1
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen,
27.02.1952, 0/1 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
März 1950, 0/2 NOW. leg.
04.04.1951, 1/0 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
06.04.1949, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
05.03.1953, 2/0 NOW. leg.
28.10.1953, 0/1 NOW. leg.
17.03.1954, 1/0 NOW. leg.
MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 04.06.1900, 0/1
coll. FISCHER.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949,
0/1 NOW. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
26.08.1932, 0/1 an *Fraxinus*, BAL. leg.
25.08.1941, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
12.04.1944, 0/1 an Heckenmoos, BAL. leg.
23.08.1949, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.

Piesma (Parapiesma) quadratum (Fieber, 1844)

Erstnachweis für Baden-Württemberg! Diese Art ist im Norden und Osten Deutschlands verbreitet, die nächstgelegenen Fundorte liegen im Rhein-Main-Gebiet (Heiss & Péricart, 1983). Die "Rübenwanze" war früher gefürchtet, da sie als Überträger von Rickettsien fungiert, welche die "latente Rosettenkrankheit" der Zuckerrübe auslösen.

- MU29SW OG, Achern, Rheinau
26.06.1934, 0/4 an Melde, BAL. leg.
28.06.1934, 0/1 an Melde, BAL. leg.
30.06.1934 2/1 an *Atriplex*, BAL. leg.

Berytidae

Berytinus (Berytinus) clavipes (Fabricius, 1775)

- LU92NO FR, Niederrotweil, Faule Waag,
20.06.1953, 1/0 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.03.1948,
1/1 NOW. leg.
NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, Pinetum,
26.03.1934, 1/2 unter Moos, BAL. leg.
NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt
10.10.1949, 1/0 unter *Prunus spinosa*,
BAL. leg.
12.10.1949, 1/2 unter *Prunus spinosa*,
BAL. leg.
14.10.1949, 0/1 unter *Prunus spinosa*,
BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
12.08.1932, 1/0 BAL. leg.
Pinetum, 10.08.1935, 0/1 unter Moos,
BAL. leg.
Wiese, 23.08.1935, 0/1 in Bodenstreu,
BAL. leg.
Waldrand, 26.02.1937, 1/0 unter Moos,
BAL. leg.
Wald, 05.04.1944, 1/1 unter Laub, BAL.
leg.
MOS, Osterburken, Dörnishof, Waldrand,
03.04.1934, 0/1 unter Moos, BAL. leg.

Berytinus (Berytinus) minor (Herrich-Schaeffer, 1835)

- LU92NO FR, Niederrotweil, Faule Waag,
20.06.1953, 0/1 NOW.
MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/0
NOW. leg.
MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952,
0/2 NOW. leg.
MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen,
29.11.1949, 1/0 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
20.11.1947, 0/1 NOW. leg.
02.09.1949, 1/0 NOW. leg.
26.10.1949, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.08.1952, 0/3 NOW. leg.
03.09.1952, 1/2 NOW. leg.

- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
02.08.1934, 0/1 unter *Ononis*, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, Waldrand
26.03.1934, 0/1 in Kiefernmoos, BAL. leg.
07.04.1934, 1/0 in Kiefernmoos, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt,
12.10.1949, 0/1 unter *Prunus spinosa*,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
Waldrand, 01.04.1932, 2/1 unter Moos,
BAL. leg.
Waldrand, 08.03.1934, 1/0 in *Abiesmoos*,
BAL. leg.
29.07.1935, 0/1 unter *Trifolium*, BAL. leg.

Berytinus (Lizinus) crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)

Bei Meess (1907) findet sich ein Nachweis von *B. clavipes* F. mit gleichem Fundort und -datum, so daß anzunehmen ist, daß es sich um eine Fehldeterminati-
on handelt.

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach,
16.07.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
13.07.1956, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
19.07.1935, 1/0 in Bodenstreu, BAL. leg.

Berytinus (Lizinus) geniculatus (Horváth, 1885)

Erstnachweis für Baden-Württemberg von Voigt (1977b) am gleichen Fundort, der bisher der einzige in diesem Bundesland geblieben ist. Fundorte in der Nähe liegen im nördlichen Elsaß bei Illkirch (Reiber & Puton, 1876), in Hessen aus der Gegend um Darmstadt und Frankfurt (Péricart, 1984).

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
14.07.1946, 0/1 NOW. leg.

Berytinus (Lizinus) signoreti (Fieber, 1859)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 06.05.1958, 0/1
NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
Waldrand, 14.04.1934, 1/2 in *Pinusmoos*,
BAL. leg.
24.07.1935, 1/0 BAL. leg.
05.08.1935, 2/0 in Bodenstreu, BAL. leg.
Waldrand, 09.08.1935, 0/1 in *Pinusmoos*,
BAL. leg.
Waldrand, 22.08.1935, 0/1 in *Pinusmoos*,
BAL. leg.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweiler, 05.10.1949, 0/1
NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
17.08.1949, 0/4 NOW. leg.
16.09.1953, 1/0 NOW. leg.

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,
28.07.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
25.07.1930, 0/1 LEININGER leg.

Gampsocoris punctipes (Germar, 1822)

- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 22.08.1931,
0/2 an *Ononis repens*, BAL. leg.
- NV17SO MOS, Mosbach, Rittersbach, 12.08.1941,
0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
07.08.1934, 0/1 an *Ononis repens*, BAL.
leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
07.04.1934, 0/2 unter Kiefernmoos, BAL.
leg.
19.08.1949, 1/2 an *Ononis*, BAL. leg.
20.08.1949, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
09.08.1932, 0/2 an *Ononis* BAL. leg.
12.08.1932, 1/1 an *Ononis* BAL. leg.
31.08.1932, 1/0 an *Ononis* BAL. leg.
29.07.1937, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
22.07.1949, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.
06.08.1949, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
19.08.1949, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.
03.09.1949, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
06.09.1949, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
26.07.1950, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933,
1/0 an *Circea lutea*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
16.09.1933, 0/1 an *Pinus* angefliegen,
BAL. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.08.1950, 1/1
1 Larve NOW. leg.
- MV61NW KA, Karlsruhe, Waldbronn, Albtal,
12.08.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 12.10.1963, 0/1 H. LIE-
NIG leg., coll. NOW.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
28.08.1937, 1/5 an *Circea lutea*, BAL. leg.
30.08.1937, 5/1 an *Circea lutea*, BAL. leg.

Lygaeidae

Arocatus roeselii (Schilling, 1829)

Die Verbreitung dieser Art wird in Rieger & Strauß (1992) diskutiert.

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 14.04.1950, 1/0
NOW. leg.

Lygaeus equestris equestris (Linnaeus, 1758)

- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 6/1
LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 14.07.1933, 0/1
LEININGER leg.
21.06.1953, 1/1 NOW. leg.
- MU03SW EM, Emmendingen, Riegel, Michaelsberg
09.04.1923, 3/0 FRENTZEN leg.
02.05.1923, 1/1 FRENTZEN leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 5/4
NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
25.07.1930, 1/1 LEININGER leg.
21.05.1931, 2/0 BECKER leg.
05.07.1933, 3/1 LEININGER leg.
09.06.1934, 1/2 LEININGER leg.
09.05.1938, 0/1 LEININGER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 5/2 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
19.05.1948, 0/1 NOW. leg.
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.

Lygaeus simulans Deckert, 1985

Diese Art wurde erst 1985 von *Lygaeus equestris* L. abgetrennt (Deckert, 1985). In der Sammlung des Museums fanden sich unter *L. equestris* L. nur 2 Exemplare von *L. simulans* Deck. Damit hat diese Art nun 5 Fundpunkte in Baden-Württemberg. Bisherige Nachweise in Rieger & Strauß (1992).

- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 0/2
NOW. leg.

Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)

Sehr seltene xerothermophile Art, die im Kaiserstuhl von Ihringen, Aachkarren (Strohm, 1933) und Oberrotweil (Schmid, 1967) bekannt ist. Weitere sehr alte Fundorte sind der Hohentwiel (Hüeber, 1891-93) und die Gegend von Immendingen im oberen Donautal (Schreckenstein, 1802). Angeblich soll die Art auch einmal am Michaelsberg bei Untergrombach gefunden worden sein (Voigt, persönl. Mitteilung). Vom Hohentwiel und in unmittelbarer Nähe aus der Schweiz im Kanton Thurgau liegen ebenfalls ältere Meldungen vor (Hofmänner, 1928), ebenso aus dem Mittelrheingebiet bekannt (Zebe, 1971). Das Vorkommen am Kaiserstuhl muß also als Reliktstandort interpretiert werden.

- LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 0/1
FRENTZEN leg.

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
Juni 1931, 0/1 KNEUCKER leg.
Juni 1941, 0/5 BECKER leg.
Aug. 1941, 0/1 BECKER leg.
- MT79SO KN, Singen, Binningen, 07.07.1929, 0/1
LEININGER leg.
- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 3/4

LEININGER leg.

- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Merdingen,
06.06.1922, 1/0 LEININGER leg.
- MU01SO FR, Freiburg, Schallstadt, 29.08.1934, 2/1
LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 2/4
NOW. leg.
- MU03SW EM, Emmendingen, Riegel, Michaelsberg,
05.09.1949, 1/1 HAUER leg.
- MU69NW VS, Blumberg Aselfingen, 15.08.1938, 1/0
FRENTZEN leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald
05.09.1920, 1/0 BECKER leg.
01.05.1922, 1/0 LEININGER leg.
21.09.1922, 0/1 BECKER leg.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Au am Rhein, 20.08.1923,
0/1 BECKER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
Aug. 1947, 2/2 NOW. leg.
22.08.1959, 2/8 KORMANN leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
01.10.1899, 1/0 coll. FISCHER.
Okt. 1920, 1/2 LEININGER leg.
29.09.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
Sep. 1929, 1/1 LEININGER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Grünwinkel, 27.09.1900,
1/0 coll. FISCHER.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 01.10.1900, 0/2
coll. FISCHER (Meess, 1907).
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, Sep.
1946, 2/3 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
April 1946, 0/1 NOW. leg.
24.04.1947, 2/4 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
17.09.1921, 0/1 LEININGER leg.
12.06.1930, 1/1 LEININGER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 16.09.1900, 0/1
coll. FISCHER.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 18.09.1898, 1/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1951, 1/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 15.08.1898, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert,
06.11.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
11.09.1900, 1/0 coll. FISCHER.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
17.07.1946, 1/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., Mai 1953, 1/2 NOW.
leg.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee,
04.06.1928, 1/0 LEININGER leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Wollmatinger Ried,
05.08.1934, 3/1 LEININGER leg.
- NT18NO FN, Überlingen a. B. Uhdingen, NSG
Seefeldten, 19.06.1961, 1/0 AMSEL leg.

- NT18SW KN, Konstanz, Wollmatingen, 10.08.1928, 6/0 LEININGER leg.
 NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen, Aug. 1928, 1/1 FRENTZEN leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 12.05.1948, 0/1 NOW. leg.
- Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778)
 Auch von Wagner (1966), Voigt (1970) und Wachmann (1986) für den Kaiserstuhl erwähnt, aus Württemberg gibt es nur eine alte nichtlokalisierbare Angabe (Hüeber, 1891-93). Weiterhin wurde die Art in einer Sandgrube bei Rastatt gefunden (R. Remane, persönl. Mitteilung). Diese Art ist aus dem Mittelrheingebiet nicht bekannt, so daß eine Zuwanderung von Süden wahrscheinlich ist.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 7/10 NOW. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- Nysius senecionis* (Schilling, 1829)
 MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/3 NOW. leg.
 MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949 1/1 NOW. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 9/6 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 28.08.1953, 1/0 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 23.11.1949, 1/0 NOW. leg.
 16.02.1950, 1/0 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald, 08.11.1949, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 2/2 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 03.09.1949, 3/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 04.07.1948, 0/2 NOW. leg.
 11.07.1948, 2/3 NOW. leg.
 23.08.1950, 2/2 NOW. leg.
 MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
 MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1958, 0/1 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 3/0 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 2/3 NOW. leg.
- Nysius ericae* (Schilling, 1829)
 MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beierthemer Wäldchen, 28.07.1927, 0/2 BECKER leg.
 KA, Karlsruhe, City, Park 13.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
- 09.10.1928 1/0 HOHNDORF leg.
 19.06.1950, 0/1 NOW. leg.
 04.06.1963, 0/1 NOW. leg.
 05.08.1963, 0/1 NOW. leg.
 20.07.1967, 0/1 angefliegen, NOW. leg.
 03.09.1967, 0/1 angefliegen, NOW. leg.
 01.10.1967, 0/1 angefliegen, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden 17.07.1952, 1/2 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 03.09.1952, 0/1 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 14.07.1946, 0/1 NOW. leg.
 17.09.1949, 0/2 NOW. leg.
- Nysius thymi* (Wolff, 1804)
 MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 5/7 (4 Paare in copula) coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV53SW KA, Knielingen, Burgau, 01.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
 MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg., RIEGER det.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 26.06.1932, 1/5 BECKER leg.
 09.06.1934, 4/4 LEININGER leg.
- Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1839)
 MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 2/1 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne Juli 1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 Juli 1946, 0/1 NOW. leg.
 17.09.1949, 0/1 NOW. leg.
- Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 14.06.1951, 1/0 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 05.11.1963, 1/0 angefliegen NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 30.11.1947, 0/1 NOW. leg.
 MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 21.10.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.08.1954, 0/1 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert, 06.11.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/1 NOW. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
14.10.1948, 1/0 an Waldgras, BAL. leg.

Cymus aurescens Distant, 1883

MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899,
1/0 coll. FISCHER.

MU58SO FDS, Freudenstadt, Huzenbach,
13.06.1965, 0/2 NOW. leg.

MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, Sep. 1948,
1/0 NOW. leg.

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 29.06.1965, 1/0
NOW. leg.

MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen
23.07.1952, 2/0 NOW. leg.
19.08.1953, 1/0 NOW. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
25.08.1941, 0/1 BAL. leg.

Cymus clavicolus (Fallén, 1807)

MU46SO FDS, Freudenstadt, Bad Peterstal, Glas-
waldsee, 05.07.1960, 1/0 NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
06.09.1949, 1/0 NOW. leg.

MV63NO KA, Untergrombach, Habichtsbuckel u.
Weihertal, 07.05.1988, 1/0 KUSSMAUL
leg.

Cymus glandicolor Hahn, 1831

MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Felsenweg, Juni
1952, 1/0 NOW. leg.

MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

MU47NW FDS, Ottenhöfen, Ruhestein
16.07.1958, 0/1 NOW. leg.
01.07.1960, 0/1 NOW. leg.

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 29.05.1900, 1/3
coll. FISCHER (Meess, 1900).

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 06.05.1900, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).

Cymus melanocephalus Fieber, 1861

MV41SW RA, Rastatt, 22.04.1900, 0/1 coll.
FISCHER.

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
Aug. 1953, 1/1 NOW. leg.
23.08.1967, 1/0 NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
02.09.1949, 0/1 NOW. leg.
12.10.1949, 1/2 NOW. leg.

KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.08.1952, 2/1 NOW. leg.
03.09.1952, 0/1 NOW. leg.
19.08.1953, 3/1 NOW. leg.
09.07.1959, 1/0 NOW. leg.

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 29.05.1900, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1907).

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald, 03.06.1900,
0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).

NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, Wald,
05.08.1949, 1/3 an *Luzula*, BAL. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Wald
22.08.1949, 0/1 an *Luzula*, BAL. leg.
14.10.1949, 0/1 an *Luzula*, BAL. leg.

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) (Karte 10)

Diese Art wird von Voigt (1977b) aus Karlsruhe-Neu-
reut als neu für Baden gemeldet, aus Württemberg
von Spitzberg bekannt (Schwoerbel, 1966). Später
auch von Burghardt & Rieger (1978) für Sandhausen
gemeldet, zuletzt für Sandäcker bei Wiesental (Voigt
& Rietschel, 1993).

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949,
5/12 (3 Ex. macropter) NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
06.09.1950, 4/3 NOW. leg.
09.05.1957, 1/0 NOW. leg.

MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 05.09.1900, 0/1
coll. FISCHER.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1951, 1/3 NOW. leg.
10.09.1952, 2/3 NOW. leg.
07.09.1957, 1/0 NOW. leg.

MV63SW KA, Karlsruhe, Hagsfeld, Juli 1946, 1/1
NOW. leg.

Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 1787)

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden
Aug. 1947, 1/0 NOW. leg.
17.07.1952, 1/0 1 Larve NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
02.09.1949, 1/1 NOW. leg.
12.10.1949, 1/0 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
17.09.1949, 1/5 NOW. leg.

Geocoris (Geocoris) grylloides (Linnaeus, 1761)

MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1958,
0/1 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, Juli
1946, 2/5 NOW. leg.

NV17SO MOS, Mosbach, Rittersbach, 12.08.1941,
0/2, BAL. leg.


Macroplax preysleri (Fieber, 1836)

NV01NO LB, Markgröningen, Leudelsbachtal, Aug.
1948, 0/1 NOW. leg.

Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843)

Aus Württemberg nicht bekannt, für Baden zuerst von
Voigt (1983) in Ettlingen-Bruchhausen gefunden. Aus
den Funden im SMNK zeigt sich, daß diese an *Matri-
caria* lebende Art nicht neu eingewandert ist. Zuletzt
auf Sandäckern bei Waghäusel/Wiesental gefunden
(Voigt & Rietschel, 1993).

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
02.09.1949, 1/0 NOW. leg.



Karte 10. *Dimorphopterus spinolae* (Signoret, 1857). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

13.07.1956, 1/0 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 20.08.1952, 0/1 NOW. leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
 16.05.1956, 1/0 NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 17.03.1954, 1/0 NOW. leg.

Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)

LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren,
 22.06.1953, 6/7 NOW. leg.

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 0/3
 NOW. leg.

MU59SW RA, Gernsbach, Forbach, 08.07.1900, 1/2
 coll. FISCHER (Meess, 1907).

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1
 NOW. leg.

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 0/1
 NOW. leg.

MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 03.11.1957, 0/1
 NOW. leg.

NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 02.06.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 30.06.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 14.08.1950, 1/2 an *Urtica*, BAL. leg.
 19.08.1950, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg.
 21.08.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
 30.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Platyplax salviae (Schilling, 1829)

LU90SO FR, Müllheim, Buggingen, 04.06.1956, 1/1
 NOW. leg.

LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Lim-
 burg, 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.

- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Tiengen, 06.06.1922, 0/6 LEININGER leg.
- MU13NW EM, Emmendingen, Malterdingen, 08.05.1922, 1/2 FRENTZEN leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 23.05.1963, 2/7 EBERT leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 28.07.1967, 1/0 angefliegen, NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 30.11.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 08.04.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B.
06.05.1953, 5/9 NOW. leg.
06.08.1953, 1/1 NOW. leg.
23.05.1959, 1/1 NOW. leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, Spitzberg, 27.05.1982, 0/1 Wlk. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 12.05.1948, 1/0 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 30.07.1949, 0/1 an *Salvia*, BAL. leg.
- Plinthisus (Plinthisus) brevipennis* (Latreille, 1807)
- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 05.11.1938, 0/2 unter Ginster, BAL. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/3 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 30.11.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald
08.11.1949, 1/1 NOW. leg.
10.11.1950, 2/1 (W macropter) NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
26.10.1949, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
17.03.1954, 1/0 NOW. leg.
08.04.1954, 2/1 NOW. leg.
07.11.1956, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
26.10.1951, 1/0 NOW. leg.
10.09.1952, 2/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B.
27.08.1952, 1/0 NOW. leg.
06.05.1953, 1/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/0 NOW. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
07.04.1934, 1/0 unter Waldmoos, BAL. leg.
12.04.1934, 0/1 in Kiefernrandmoos, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
04.04.1934, 1/0 in Waldrandmoos, BAL. leg.
- Tropistethus holosericeus holosericeus* (Scholtz, 1845)
- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
17.09.1952, 1/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
06.04.1949, 0/6 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.08.1952, 0/2 NOW. leg.
03.09.1952, 1/0 NOW. leg.
08.04.1954, 1/1 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
26.10.1951, 0/1 NOW. leg.
10.09.1952, 1/4 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 2/0 NOW. leg.
- NV01NO LB, Markgröningen, Leudelsbachtal, Aug. 1948, 1/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
24.03.1934, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg.
27.03.1934, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt,
10.10.1949, 1/0 in *Prunus spi.*-Gestreu, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Brache,
08.08.1935, 1/0 BAL. leg.
- Drymus (Drymus) pilicornis* (Mulsant & Rey, 1852)
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee
26.10.1951, 1/4 NOW. leg.
10.09.1952, 4/4 NOW. leg.
- Drymus (Sylvadrymus) brunneus* (F.Sahlberg, 1848)
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Zastlerbachtal, Juni 1952, 1/0 NOW. leg.
- MU38NW OG, Achern
30.09.1931, 1/0 (macropter) BAL. leg.
12.10.1931, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
28.09.1949, 2/0 NOW. leg.
29.09.1951, 0/4 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 01.09.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 18.08.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1956, 1/0 NOW. leg.
- NV01NO LB, Markgröningen, Leudelsbachtal, Aug. 1948, 1/0 NOW. leg.

- Drymus (Sylvadrymus) ryeii* Douglas & Scott, 1865
 MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.05.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER.
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor 14.06.1951, 1/0 NOW. leg. 29.09.1951, 2/0 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen 30.07.1947, 0/1 NOW. leg. 30.11.1947, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 04.03.1948, 1/0 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 12.03.1899, 0/1 coll. FISCHER.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 17.10.1949, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
- Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus* (Fabricius, 1775)
 MV42SW RA, Durmersheim, Röttlichwald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 01.09.1954, 0/1 NOW. leg. 23.08.1967, 1/0 NOW. leg.
 MV60NO CW, Bad Herrenalb, 06.03.1957, 0/1 NOW. leg.
 NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt 10.10.1949 und 14.10.1949, je 1/0 in *Prunus spin.*-Gestreu, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 22.03.1932, 0/1 unter Waldlaub, BAL. leg. 30.03.1932, 1/0 BAL. leg. 01.04.1932, 1/0 in Waldrandmoos, BAL. leg. 12.04.1944, 0/1 in Heckenmoos, BAL. leg. 29.08.1949, 1/0 an Hasel, BAL. leg. 18.10.1949, 2/0 unter Waldlaub, BAL. leg. 19.10.1949, 0/1 unter Waldlaub, BAL. leg. MOS, Osterburken, Dörnishof, 30.03.1932, 1/0 in Waldrandmoos, BAL. leg.
- Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)
 Voigt (1983 und 1977c) meldet diese Art als neu für Baden-Württemberg in 5 Exemplaren von Seebach-Legelsau (MU38). Weiterhin in Konstanz auf einem Halbtrockenrasen gefunden (noch nicht veröffentlichter eigener Fund).
 MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 5/2 NOW. leg.
- Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)
 MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 16.09.1933, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg.
 MU58SO FDS, Freudenstadt, Hüzenbach, 13.06.1965, 0/1 NOW. leg.
 MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor 20.07.1949, 2/0 NOW. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1 NOW. leg.
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, Löhebachtal, 26.03.1934, 0/1 auf Moos, BAL. leg. KÜN, Schöntal, Oberkessach, 07.04.1934, 0/1 auf *Pinus*randmoos, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 08.09.1950, 0/1 in *Pinus*grundgestreu, BAL. leg. 18.09.1950, 1/0 in *Pinus*grundgestreu, BAL. leg.
- Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775)
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, Sep. 1952, 2/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 06.04.1949, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 23.09.1953, 1/1 NOW. leg.
 MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 5/8 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- Gastrodes abietum* Bergroth, 1914
 MU18SW OG, Kehl a. Rh., 14.01.1938, 0/1 im Keller unter Brett, BAL. leg.
 MU20SO FR, Todtnau, Feldberg Juni 1952, 1/1 NOW. leg. Felsenweg, Juni 1952, 0/1 NOW. leg.
 MU59SW RA, Gernsbach, Forbach, 06.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 04.03.1961, 0/1 NOW. leg. 04.04.1963, 0/1 angefliegen, NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 30.11.1947, 1/0 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald 10.11.1950 1 0 NOW. leg. 19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
 MV63SW KA, Karlsruhe, Hagsfeld Jan. 1946, 2/4 NOW. leg. 04.12.1946, 0/2 NOW. leg. 08.12.1946, 0/2 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 20.08.1932, 1/2 an *Pinus*, BAL. leg. 21.08.1932, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg. 31.08.1932, 0/2 an *Pinus*, BAL. leg. 22.08.1935, 1/1 *Pinus*, BAL. leg.

Ischnocoris angustulus (Boheman, 1853)

Erstnachweis für Baden-Württemberg! Die nächstgelegenen Fundorte liegen im Mittelrheingebiet (Zebe, 1971) und im Vogelsberg in Hessen (Burghardt, 1977), in Norddeutschland ist die Art in Heidegebieten anscheinend häufiger.

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
10.07.1952, 0/2 NOW. leg.
18.07.1952, 1/1 NOW. leg.
06.08.1952, 1/1 NOW. leg.
17.09.1952, 18/16 NOW. leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
3/2 NOW. leg.

Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829)

- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
2/2 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., Mai 1953, 1/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/0 NOW. leg.

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1907).
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 29.09.1937, 1/2 BAL.
leg.
- MU38NW OG, Achern, 15.06.1931, 1/0 an *Urtica*,
BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern, 11.05.1931, 0/1
an *Urtica*, BAL. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
23.11.1949, 2/1 NOW. leg.
18.04.1968, 0/1 am Licht, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald
07.01.1950, 2/1 NOW. leg.
18.01.1950, 1/0 NOW. leg.
März 1950, 1/0 NOW. leg.
23.06.1950, 1/0 NOW. leg.
04.04.1951, 1/0 NOW. leg.
Jan. 1954, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 1/0
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
06.04.1949, 0/2 NOW. leg.
22.03.1950, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Albufer
05.12.1948, 1/0 NOW. leg.
19.03.1952, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
02.12.1948 1/1 NOW. leg.
29.11.1949, 4/2 NOW. leg.
03.09.1952, 2/1 NOW. leg.
07.09.1952, 1/1 NOW. leg.
05.03.1953, 1/0 NOW. leg.
28.10.1953, 0/1 NOW. leg.
11.11.1953, 1/0 NOW. leg.
17.03.1954, 0/1 NOW. leg.

- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
16.11.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 04.07.1956, 0/1
NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg
19.02.1899, 0/1 coll. FISCHER.
12.03.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/0 NOW.
leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV11NW LB, Ludwigsburg, Favoritenpark,
15.10.1952, 0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental
20.07.1934, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
20.07.1934, 0/1 an *Mentha aquatica*, BAL.
leg.
- NV37SW KUN, Schöntal, Hopfengarten
Vogtsteich, 09.04.1934, 1/0 unter Laub,
BAL. leg.
05.04.1944, 1/0 unter Heckenmoos, BAL.
leg.
21.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
26.08.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
04.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)

Die Angabe für Griesbach in Meess (1900) beruht auf einer Fehldetermination (= *S. thomsoni* Reut.)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 08.09.1931, 0/1 an
Knautia, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel
02.10.1933, 2/6 unter *Calluna*, BAL. leg.
08.10.1933, 0/1 unter *Vaccinium*, BAL.
leg.
22.10.1933, 3/2 unter *Calluna*, BAL. leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
27.06.1950, 1/0 NOW. leg.
29.09.1951, 2/2 NOW. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949,
10/9 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg,
17.09.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 01.10.1967, 1/0
angeflogen NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
12.10.1949, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
03.05.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube
28.07.1988, 3/1 unter *Sarothamnus*,
KUSSMAUL leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Knielingen, 12.05.1953,
0/1 NOW. leg.

Scolopostethus pseudograndis E. Wagner, 1949

Überraschenderweise fand in Péricart (1994) keine Synonymisierung von *S. pseudograndis* E. Wgn. mit *S. grandis* (Horvath, 1880) statt. Das vorliegende Männchen wäre nach den Bestimmungsschlüsseln *S. grandis* Horv., die Weibchen dagegen *S. pseudograndis* E. Wgn. Aus Baden-Württemberg bisher 3 Fundorte (Wagner, 1966 u. Voigt, 1983).

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 15.08.1954, 1/0 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald März 1950, 0/1 NOW. leg.
 10.11.1950, 0/1 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 23.09.1953, 0/1 NOW. leg.

Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)

- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 18.02.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).

Scolopostethus pilosus (Reuter, 1874)

- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 26.10.1951, 0/1 NOW. leg.

Scolopostethus puberulus Horváth, 1887

- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Albufer, 19.03.1952, 1/0 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 05.03.1953, 0/1 NOW. leg.

Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874

Der Beleg von Fischer war als *S. decoratus* Hhn. determiniert und als solcher veröffentlicht (Meess, 1900).

- MU28NO OG, Achern, Großweier, Wald, 11.10.1933, 0/1 unter Waldlaub, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, Oberachern, 27.08.1933, 1/0 unter Waldlaub, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 25.05.1955, 1/0 NOW. leg.
 23.06.1960, 2/3 NOW. leg.
 09.06.1962, 1/0 NOW. leg.
 29.06.1965, 1/1 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald 18.01.1950, 1/2 NOW. leg.
 10.11.1950, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 0/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 12.02.1948, 1/0 NOW. leg.
 03.09.1952, 4/5 NOW. leg.
 11.11.1953, 0/1 NOW. leg.
 21.07.1954, 0/1 NOW. leg.
 01.12.1954, 0/1 NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee 16.11.1949, 0/1 NOW. leg.
 10.09.1952, 0/1 NOW. leg.

- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/2 NOW. leg.
 NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel 03.08.1934, 1/0 unter *Artemisia*, BAL. leg.
 07.08.1934, 1/0 unter *Artemisia*, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 10.03.1934, 3/3 (in copula) unter Laub, BAL. leg.
 13.03.1934, 1/0 in Waldrandlaub, BAL. leg.
 21.03.1934, 2/0 in *Fraxinus*laub, BAL. leg.
 Vogtsteich, 21.03.1934, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
 06.08.1936, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.

Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 19.10.1938, 1/1 in Waldlaub, BAL. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/1 RIEGER det., NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhart, Wald, 04.04.1951, 1/0 RIEGER det., NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 1/0 RIEGER det., NOW. leg.
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 26.03.1934, 1/0 unter Waldrandmoos, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 06.03.1934, 1/0 unter Stein bei *Lasius*, BAL. leg.

Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870)

- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 19.10.1938, 0/1 BAL. leg.
 MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 03.10.1933, 1/1 unter Waldmoos, BAL. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949, 1/1 RIEGER det., NOW. leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 17.09.1952, 0/2 RIEGER det., NOW. leg.
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach 05.03.1934, 2/0 in Kiefernrandmoos, BAL. leg.
 14.03.1934 1/1 in Kiefernrandmoos, BAL. leg.
 26.03.1934, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 03.03.1932, 1 Ex. BAL. leg.
 31.03.1932, 0/1 in Waldrandmoos, BAL. leg.
 01.04.1932, 1/0 in Waldrandmoos, BAL. leg.
 04.04.1932, 1/1 in Waldrandmoos, BAL. leg.
 26.02.1934, 0/1 in Waldmoos, BAL. leg.
 08.03.1934, 1/1 in Waldmoos, BAL. leg.
 12.04.1944, 0/1 in Heckenmoos, BAL. leg.

27.08.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.
18.10.1949, 0/2 in Waldlaub, BAL. leg.
MOS, Osterburken, Dörnishof,
01.04.1932, 0/1 in Waldmoos, BAL. leg.

Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1842)

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.03.1948,
0/3 NOW. leg.
MV60NO CW, Bad Herrenalb, 06.10.1948, 0/1
NOW. leg.

Stygnocoris fuliginus (Geoffroy, 1785)

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 4/1
NOW. leg.
MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952,
3/2 NOW. leg.
MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlich-
wald, 02.11.1949, 3/1 NOW. leg.
MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949, 0/1
NOW. leg.
MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg
06.08.1952, 3/7 NOW. leg.
17.09.1952, 1/1 NOW. leg.
09.07.1958, 2/0 NOW. leg.
MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 29.11.1949, 0/1
NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
18.01.1950, 0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
04.07.1947, 1/0 NOW. leg.
12.10.1948, 0/1 NOW. leg.
26.10.1949, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
23.07.1952, 0/2 NOW. leg.
MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
17.09.1949, 0/2 NOW. leg.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/0 NOW. leg.

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)

MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
19.09.1932, 1/1 an *Tanacetum*, BAL. leg.
MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952,
0/1 NOW. leg.
MV50SO CW, Bad Herrenalb, Plotzsägmühle,
08.09.1957, 0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
03.09.1952, 2/1 NOW. leg.
MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 02.08.1900, 0/1
(macropter) coll. FISCHER.
MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 05.09.1900, 0/1
coll. FISCHER.
NV16NO MOS, Mosbach, Katzental
10.08.1931, 0/1 an *Trifolium pratense*,
BAL. leg.
03.08.1941, 0/1 BAL. leg.


NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, Öhmd,
25.08.1931, 1/1 auf Grasboden, BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
29.07.1935, 0/1 unter Luzerne, BAL. leg.

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)

MU20SO FR, Todtnau, Feldberger Hof, 30.08.1933,
0/1 an *Calluna*, BAL. leg.
MU29SW OG, Achern, Rheinau, 08.09.1931, 0/2 an
Calluna, BAL. leg.
MU38NW OG, Achern, Oberachern, 15.09.1931, 1/1
an *Calluna*, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel,
08.10.1931, 1/2 an *Calluna*, BAL. leg.
MV50SO CW, Bad Herrenalb, Plotzsägmühle,
08.09.1952, 0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
06.09.1950, 0/1 NOW. leg.
MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
10.09.1952, 0/2 NOW. leg.
NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
03.08.1934, 0/1 unter *Artemisia*, BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Brache,
05.08.1935, 0/1 BAL. leg.

Acompus rufipes (Wolff, 1804)

Die Angabe in Wagner (1966) über *A. palliceps* H.-S. als "in Baden häufig" rührt offensichtlich daher daß er das Exemplar von NOW. aus Daxlanden als *A. pallipes* f. *laetipes* fehdeterminiert hatte. Aus Württemberg ist *A. palliceps* H.-S. nur durch die Roser'sche Angabe (Hüeber, 1891) bekannt.
MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 1/1 (macropter) NOW. leg.
MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/2 NOW. leg.
MU38NW OG, Achern, Mühlkanal, 30.09.1931, 2/2 (2M macropter) in Gestreu, BAL. leg.
OG, Achern
30.09.1931, 1/0 (macropter) BAL. leg.
04.07.1932, 4/1 (2M 1W macropter) im Salicetum, BAL. leg.
19.08.1939, 0/1 im Salicetum, BAL. leg.
MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
28.06.1955, 1/0 NOW. leg.
09.06.1962, 1/0 NOW. leg.
MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
03.07.1953, 2/6 NOW. leg.
11.05.1968, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen,
04.03.1948, 1/0 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden
21.05.1906, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
19.03.1948, 0/1 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
11.06.1949, 14/7 NOW. leg.
07.07.1951, 1/0 NOW. leg.
22.09.1954, 0/1 NOW. leg.



Karte 11. *Aellopus atratus* (Goeze, 1778). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK (sowie der nächstgelegene Fundort in der Pfalz bei Speyer).

- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 3/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 27.06.1949, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.

Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)

- MV41SW RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 2/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.03.1948, 2/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, Mai 1964, 0/1 NOW. leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 05.06.1928, 1/2 LEININGER leg.


Pachybrachius luridus (Hahn, 1826)

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 15.08.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 1/1 coll. FISCHER.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

Aellopus atratus (Goeze, 1778) (Karte 11)

Von dieser Art existiert eine alte Meldung aus der Umgebung von Ulm (Lampert, 1897) - evtl. könnte es sich hierbei um das kleine Lautertal handeln - und eine weitere für Utzmemmingen (Fischer, 1961). Voigt (1983) veröffentlichte bereits die Meldung von Maxau (Okt. 1948) als Erstnachweis für Baden-Württemberg, in Baden ist die Art seit 1953 verschollen. Schuster (1986) meldet diese Art für das kleine Lautertal bei Ulm. In der benachbarten Pfalz aus Speyer bekannt (Meess, 1907).

- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 22.06.1953, 0/2 NOW. leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg 23.04.1931, 0/2 GREMMINGER leg. 21.06.1953, 0/4 NOW. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 30.06.1934, 0/1 unter *Echium*, BAL. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 2/1 NOW. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 22.06.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau Okt. 1948, 2/2 an Bahndamm, NOW. leg. 20.10.1948, 7/4 NOW. leg. 16.09.1953, 4/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 12.10.1949, 1/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 17.07.1946, 1/1 NOW. leg. 07.09.1949, 1/2 NOW. leg.
- Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)
- LU92SW FR, Breisach, Breisach, 04.06.1925, 0/1 LEININGER leg.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Hanauer Land, 10.03.1937, 8/2 im *Salicetum* am Boden, BAL. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 4/0 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 17.08.1949, 1/1 NOW. leg. 16.09.1953, 1/1 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 19.06.1950, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 02.09.1949, 5/1 NOW. leg. 30.08.1950, 0/1 NOW. leg. 22.08.1951, 1/2 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/1 NOW. leg.
- NV12SO LB Ludwigsburg, Marbach a. N., 08.04.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW MOS, Osterburken, Dörnishof, 27.03.1934, 0/1 BAL. leg.
- Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 20.05.1931, 0/1 an *Vicia sep.*, BAL. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 2/1 NOW. leg.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949, 2/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 19.03.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Hagsfeld, 18.04.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 2/0 NOW. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach 24.03.1934, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg. 07.04.1934, 1/0 in *Pinusrandmoos*, BAL. leg. 11.04.1934, 0/1 in *Pinusrandmoos*, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 14.10.1949, 0/1 unter *Prunus spinosa*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 03.04.1936, 1/0 in Heckengestreu, BAL. leg.
- Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)
- MU11NW FR, Freiburg, 25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 08.03.1950, 1/0 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 09.04.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 03.09.1952, 0/1 NOW. leg. 28.10.1953, 1/1 NOW. leg. 11.11.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 18.03.1900, 5/7 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 1/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 15.06.1949, 0/1 NOW. leg. 17.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV11NW LB, Ludwigsburg, Favoritenpark, Okt. 1952, 1/0 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 06.08.1934, 1/0 auf Sandboden, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 1935, 0/1 in *Pinusgestreu*, BAL. leg.
- Raglius vulgaris* (Schilling, 1829)
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Aug. 1928, 0/1 BECKER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 24.10.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). 17.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald 14.04.1926, 1/0 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 06.05.1936, 0/1 LEININGER leg. KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 30.08.1950, 0/2 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 26.10.1951, 0/1 NOW. leg.



Karte 12. *Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

- MV54NW KA, Karlsruhe, Dettenheim, 19.09.1986, 2/2? leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 25.04.1953, 0/1 STRITT leg.

Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)

Bis auf dieses eine Exemplar erwiesen sich die 15 im SMNK vorhandenen "*R. phoeniceus* Rossi" als Fehldeterminationen.


- NA50NW TBB, Tauberbischofsheim, Wenkheim, 17.07.1922, 1/1 LEININGER leg.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)

- MT89 KN, Singen, Hegau 11.08.1931, 0/4 LEININGER leg. 14.08.1935, 0/1 LEININGER leg.

- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 24.09.1937, 0/1 unter Kies, BAL. leg. 29.09.1937, 1/0 in Walddaub, BAL. leg. 30.09.1937, 1/0 auf Sandboden, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 20.10.1932, 1/0 am Waldrand, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 2/2 NOW. leg.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 20.10.1948, 1/1 NOW. leg. 16.09.1953, 0/4 NOW. leg.

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
21.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
01.10.1927, 0/1 LEININGER leg.
18.08.1930, 0/1 LEININGER leg.
03.05.1960, 1/0 KORMANN leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 0/1
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
04.07.1947, 1/0 NOW. leg.
02.09.1949, 2/1 NOW. leg.
12.10.1949, 1/3 NOW. leg.
30.08.1950, 0/2 NOW. leg.
22.08.1951, 2/2 NOW. leg.
04.04.1952, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.07.1947, 0/1 am Boden, NOW. leg.
20.08.1952, 1/1 NOW. leg.
06.10.1954, 1/0 NOW. leg.
20.10.1955, 0/1 NOW. leg.
28.03.1956, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 07.09.1900, 2/3
coll. FISCHER.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
11.09.1900, 1/2 coll. FISCHER.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus
05.08.1953 1/2 NOW. leg.
05.08.1958, 0/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Heidelberg, Nußloch, 15.04.1922, 0/1
LEININGER leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 0/2 NOW.
leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen,
Aug. 15.08.1929, 1/0 FRENTZEN leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt
10.10.1949, 1/0 in *Prunus spin.*-Gestreu,
BAL. leg.
12.10.1949, 0/1 in *Prunus spin.*-Gestreu,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
05.01.1932, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
21.03.1932, 1/0 an Apfelbaum auf Borke,
BAL. leg.
08.10.1949, 2/0 in *Prunus spin.*-Gestreu,
BAL. leg.
18.10.1949, 2/1 in Waldlaub, BAL. leg.
- Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798) (Karte 12)
Meess (1900) meldet diese Art für Sandhausen, später dort wiedergefunden (Burghardt & Rieger, 1978).
Zuletzt auf Sandäckern bei Wiesental nachgewiesen (Voigt & Rietschel, 1993) Aus Württemberg ist diese Art bisher nicht bekannt. Mit den untenstehenden Funden ergibt sich eine Verbreitung in Baden-Württemberg die auf die Oberrheinische Tiefebene beschränkt ist.
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren,
22.06.1953, 1/1 NOW. leg.
FR, Breisach, Ihringen, 03.06.1923, 0/2
FRENTZEN leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 1/0
NOW. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 3/5
NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Flugplatz, 26.05.1947, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
27.04.1947, 0/1 NOW. leg.
02.09.1949, 6/3 NOW. leg.
22.08.1951, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
11.11.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
0/1 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 09.06.1934 1
Ex. an *Melandrium album*, BAL. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City
09.06.1934, 2/0 an *Melandrium album*,
BAL. leg.
14.06.1934, 1/0 an *Melandrium album*,
BAL. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
16.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
17.07.1946, 0/2 NOW. leg.
17.09.1949, 2/3 NOW. leg.
- Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)
Die beiden Belege von Fischer waren als *P. nubilus*
Fall. fehldeterminiert und als solche gemeldet (Meess,
1900).
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, Juni 1953, 1/0
NOW. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952,
1/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 23.06.1960, 0/1
NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
Nov. 1946, 0/1 NOW. leg.
18.01.1950, 1/0 NOW. leg.
März 1950, 1/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
22.08.1951, 1/0 NOW. leg.
04.04.1952, 1/0 NOW. leg.
18.06.1955, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
12.02.1948, 1/0 NOW. leg.
14.06.1951, 0/1 NOW. leg.
20.08.1952, 1/0 NOW. leg.
03.09.1952, 1/5 NOW. leg.
05.09.1953, 1/0 NOW. leg.
13.11.1957, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 10.06.1900, 1/2
coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,



Karte 13. *Peritrechus gracilicornis* (Puton, 1877). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

- MV53SO 28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg. KA, Karlsruhe, Wildpark, 13.08.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckarmühlbach, 17.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 10.08.1934, 1/0 BAL. leg.

Peritrechus gracilicornis (Puton, 1877) (Karte 13)
 Erstnachweis für Baden durch Voigt (1970) mit dem Fund von Nowotny bei Karlsruhe (Scheibenhardt). Eine Verbreitungskarte dieser seltenen Art gibt Rieger (1979), dort enthalten schon der Fundort von Rieger (1980). Die unten genannten neuen Funde schließen

- einige Lücken in der Verbreitung dieser Art und unterstützen die Argumentation für eine Ausbreitung über Oberrhein und Neckar. Inzwischen auch aus Konstanz und vom Hohentwiel bekannt (HECKMANN unveröffentl.).
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 22.06.1953, 1/1 NOW. leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 5/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 30.11.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 25.06.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 10.11.1950, 0/1 NOW. leg. (Voigt, 1970).

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen
April 1946, 3/1 NOW. leg.
20.11.1947, 0/3 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
05.03.1953, 0/1 NOW. leg.
28.10.1953, 0/1 NOW. leg.
17.03.1954, 0/1 NOW. leg.
05.05.1954, 0/1 NOW. leg.
06.10.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV66NW HD, Schwetzingen, Rheininsel Ketsch,
30.04.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/2 NOW.
leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
12.05.1948, 1/0 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
01.04.1932, 1/0 unter Waldrandmoos,
BAL. leg.
18.10.1949, 1/0 unter Waldlaub, BAL. leg.
19.11.1949, 1/0 in Heckenstreu, BAL. leg.

Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 10.07.1952, 0/1 NOW. leg.

Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)

Zwei Belege der Meldungen von Meess (1900) waren
P. geniculatus Hhn.

- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
05.03.1934, 0/1, BAL. leg.
27.03.1934, 1/0 an Kiefernrandmoos,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 08.03.1934,
0/1 an Tannenrandmoos, BAL. leg.
MOS, Osterburken, Dörnishof,
26.02.1934, 1/0 in Waldmoos, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 18.04.1940,
0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Rinkendobel, Fel-
senweg, Juni 1952, 1/0 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 03.11.1954, 0/1
NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
05.03.1953, 1/0 NOW. leg.
06.10.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV60NO CW, Bad Herrenalb, 16.07.1955, 0/1
NOW. leg.

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)

- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/0
NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
20.10.1948, 0/1 NOW. leg.
17.08.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV50NO KA, Bad Herrenalb, Frauenalb, Nov.
1947, 1/0 NOW. leg.

- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
09.04.1952, 0/1 NOW. leg.
20.08.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
26.10.1951, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
12.05.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 22.07.1934,
3/0 an Grashang, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach 07.04.1934,
1/0 an Waldrandmoos, BAL. leg.
11.04.1934, 4/2 BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt
10.10.1949 und 12.10.1949, je 0/1 in *Pru-
nus spin.*-Gestreu, BAL. leg.
14.10.1949, 0/1 in *Prunus spin.*-Gestreu,
BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
Wiese, 23.07.1935, 1/0 auf Boden, BAL.
leg.
16.04.1948, 1/2 in Heckenlaub, BAL. leg.

Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1842)

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg, 17.09.1952, 2/0 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
23.06.1950, 2/1 NOW. leg.
10.11.1950, 1/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
12.10.1949, 0/2 NOW. leg.
26.10.1949, 1/1 NOW. leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Hagsfeld, Jan. 1946, 1/0
NOW. leg.


Megalonotus emarginatus (Rey, 1888) (Karte 14)

Erstnachweis dieser Art für Baden-Württemberg mit 3
Fundpunkten gibt Rieger (1987).

- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/0 NOW.
leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 22.07.1934,
1/0 an Grashang, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
11.04.1934, 1/0 BAL. leg.
12.04.1934, 2/0 BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
05.04.1944, 1/0 in Heckenmoos, BAL. leg.

Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
20.10.1948, 1/0 NOW. leg.
17.08.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.11.1947, 1/0
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
06.04.1949, 1/0 NOW. leg.
22.03.1950, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
20.08.1952, 0/1 NOW. leg.
19.08.1953, 0/1 NOW. leg.



Karte 14. *Megalonotus emarginatus* (Rey, 1888). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/2 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/1 NOW. leg.

Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870) (Karte 15)


Diese Art wurde zum ersten Mal von Voigt (1977a & 1978) in Baden-Württemberg im Rußheimer Altrhein- gebiet gefunden, ebenso in Sandhausen (Burkhardt & Rieger, 1978). Inzwischen liegt die Art auch vom Hohen- tiel (Aukema & Rieger, persönl. Mitteilung), aus einer Sandgrube im Hegau (HECKMANN unveröff.) und von Sandäckern bei Waghäusel/Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993) vor.

MU18SW OG, Kehl a. Rh., 27.09.1937, 0/1 unter *Artemisia*, BAL. leg.
 MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 1/0 NOW. leg.

MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlich- wald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 1/0 NOW. leg.
 MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 18.03.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 10.09.1952, 0/1 NOW. leg.
 NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 12.10.1949, 1/0 in *Prunus spin.*-Gestreue, BAL. leg.

Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)

MV42SW RA, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 2/2 NOW. leg.
 MV67SO HD, Schwetzingen, 14.04.1922, 0/1 LEININGER leg.
 MV71NO PF, Pforzheim, 1950, 1/0 coll. MÜLLER.



Karte 15. *Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

Emblethis griseus (Wolff, 1802) (Karte 16)

Diese Art wurde von Burghardt & Rieger (1978) als neu für Baden-Württemberg von Sandhausen gemeldet, dann erst wieder auf Sandäckern bei Wiesental gefunden (Voigt & Rietschel, 1993). In der SMNK waren sämtliche Tiere unter *E. verbasci* F. eingeordnet.

MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 3/5 NOW. leg.

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949, 5/3 NOW. leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 1/1 NOW. leg.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 10.09.1952, 1/0 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 07.09.1949, 2/0 NOW. leg.

12.09.1949, 1/0 NOW. leg.

05.10.1949, 1/1 NOW. leg.

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1952, 0/1 NOW. leg.

MV78NO HD, Weinheim/B. 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.

06.05.1953, 1/0 NOW. leg.

NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 22.07.1934, 0/1 am Boden, BAL. leg.

Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)


Bereits von Meess (1900) für Sandhausen beschrieben, der Beleg war aber nicht mehr auffindbar.

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/1 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 14.07.1946, 3/0 NOW. leg.

20.07.1947, 0/1 BECKER leg.

17.09.1949, 1/3 NOW. leg.



Karte 16. *Emblethis griseus* (Wolff, 1802). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

Macrodera micropterum (Curtis, 1836)

MU47SO FDS, Freudenstadt, Allerheiligen, Schliffkopf, Juli 1952, 0/1 NOW. leg.

MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor
Sep. 1948, 4/4 NOW. leg.
20.07.1949, 1/1 NOW. leg.
Sep. 1949, 0/4 NOW. leg.
29.09.1951, 3/10 NOW. leg.

MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 17.09.1952, 4/3 NOW. leg.

Pionosomus varius (Wolff, 1804)

Erstnachweis für Baden in Sandhausen (Voigt, 1970) später dort auch von Burghardt & Rieger (1978) gefunden, ebenfalls von Sandäckern bei Waghäusel/Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993) bekannt. Aus Württemberg existiert nur die alte Roser'sche Angabe (Hüeber, 1891).

MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/1 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 6/9 NOW. leg.

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)

MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg
21.10.1938, 1/0 in Ginstergrundmoos, BAL. leg.
05.11.1938, 1/1 in Ginstergrundmoos, BAL. leg.

05.07.1943, 1/4 BAL. leg.
05.07.1943, 2/2 an *Jasione*, BAL. leg.
07.07.1943, 0/1 BAL. leg.

MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 3/4 NOW. leg.

MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/3 NOW. leg.

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807) (Karte 17)

Diese Art ist anscheinend in der oberrheinischen Tiefebene verbreitet, obwohl sie erst von Voigt (1977a & 1978) erstmalig für Baden aus Rußheim nachgewiesen wurde, ebenso von Burkhardt & Rieger (1978) für Sandhausen. Aus Württemberg ist dagegen nur ein einziger Fund um 1890 in der Sammlung Hüeber aus Wiblingen bei Ulm (Rieger, 1972) bekannt.

- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 0/3 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
 11.10.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
 19.06.1950, 2/2 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 02.09.1949, 8/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 23.07.1952, 0/1 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
 07.09.1949, 2/0 NOW. leg.
 17.09.1949, 3/3 NOW. leg.

Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius (Linnaeus, 1758)

Die Meldung von Meess (1900) beruht auf einer Fehldetermination (= *T. dispar* Stål).

- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 1/1 NOW. leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 0/2 (macropter) NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 03.07.1953, 0/1 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 0/2 (1 Ex. macropter) NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
 02.09.1949, 0/1 NOW. leg.
 12.10.1949, 0/1 (macropter) RIEGER det., NOW. leg.
 30.08.1950, 0/2 RIEGER det., NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 10.09.1952, 1/0 (macropter) NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
 14.07.1946, 2/0 RIEGER det., NOW. leg.
 17.09.1949, 1/1 RIEGER det., NOW. leg.
 MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.

Trapezonotus (Trapezonotus) dispar (Stål, 1872)

Der Fischer'sche Beleg war als *T. arenarius* L. fehldeterminiert und als solcher gemeldet (Meess, 1900).

- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Baldenschwand,
 Juni 1952, 1/1 NOW. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 28.08.1953, 1/2 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald,
 10.11.1950, 1/1 NOW. leg.

- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
 12.02.1948, 0/1 NOW. leg.
 06.10.1954, 1/0 NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 01.11.1950, 0/1 NOW. leg.
 NT18SO KN, Konstanz, Staad, 06.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
 15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach,
 26.03.1934, 0/1, BAL. leg.


Trapezonotus (Trapezonotus) ullrichi (Fieber, 1836)

Erstnachweis für Baden-Württemberg! Die unten stehenden Funde sind dem bisher bekannten Verbreitungsgebiet im unteren Maintal (Singer, 1952) benachbart. Weiterhin aus Rheinhessen bekannt (Günther, 1987).

- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt
 12.10.1949, 1/1 in *Prunus spinosa*-Streu, BAL. leg.
 14.10.1949, 1/1 in *Prunus spinosa*-Streu, BAL. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 Wiese, 19.07.1935, 2/3 auf Boden, BAL. leg.
 Wiese, 21.07.1935, 2/0 auf Boden, BAL. leg.
 Wiese, 23.07.1935, 1/1 auf Boden, BAL. leg.
 22.08.1941, 0/1, BAL. leg.
 18.10.1949, 0/1 in Walddaub, BAL. leg.

Pyrrhocoridae*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)

- Schwäbische Alb, 25.03.1886, 0/1 "Li. Ri."
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 10.06.1933, 2/2 BECKER leg.
 MU11NW FR, Freiburg, April 1934, 1/1 STRITT leg.
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 1/0 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
 1904, 1/0? leg.
 25.05.1926, 0/2 BECKER leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 24.08.1947, 0/1 NOW. leg.
 MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 12.03.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach
 20.09.1949, 7/6 an *Tilia*, BAL. leg.
 20.09.1949, 3/1 an *Liguster*, BAL. leg.
 20.09.1949, 3/0 an *Helianthemum*, BAL. leg.



Karte 17. *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807).
Baden-württembergische
Fundorte in der Samm-
lung des SMNK.

Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 02.06.1897, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 23.06.1929, 1/1 LEININGER leg.
 LU92NO FR, Breisach, Niederrotweil, Faule Waag, 20.06.1953, 1/0 NOW. leg.
 FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 1/0 FRENTZEN leg. Voigt (1970) meldet dieses Tier fälschlicherweise als *D. medius* Muls. & Rey.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 10.06.1933, 1/0 BECKER leg.
 MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“, Aug. 1928, 1/0 BECKER leg.

- MU80SW KN, Engen, 10.06.1926, 2/1 LEININGER leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 05.05.1933, 1/0 LEININGER leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 1899, 1/0 coll. FISCHER.
 MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 02.05.1898, 1/0 coll. FISCHER.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 31.05.1922, 1/0 LEININGER leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 14.05.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 09.07.1952, 1/1 GREMMINGER leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 24.07.1928, 1/0 LEININGER leg.

- 20.07.1929, 2/2 LEININGER leg.
21.05.1931, 1/1 BECKER leg.
09.06.1934, 0/1 LEININGER leg.
09.05.1938, 1/0 LEININGER leg.
17.09.1949, 2/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 2/2 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach, 20.07.1935, 0/1 am Boden, BAL. leg.
- NV27SO MOS, Adelsheim, 28.07.1935, 0/1 auf Landstraße, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 23.07.1935, 0/1 an *Trifolium pratense*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 02.08.1935, 0/1 auf Stoppelacker, BAL. leg.
16.08.1935, 0/1 auf Stoppelacker, BAL. leg.
30.09.1948, 0/1 unter Waldlaub, BAL. leg.
05.11.1948, 1/1 unter Waldlaub, BAL. leg.

Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)

- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 23.06.1929, 0/1 LEININGER leg.
- LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU01SW FR, Freiburg Munzingen, 09.06.1922, 0/1 LEININGER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 11.09.1900, 1/0 coll. FISCHER
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 08.06.1934, 0/1 BAL. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 24.07.1928, 0/1 LEININGER leg.
20.07.1929, 0/1 LEININGER leg.
22.07.1930, 0/1 BECKER leg.
09.06.1934, 0/3 LEININGER leg.
09.05.1936, 0/2 LEININGER leg.
21.06.1936, 1/0 LEININGER leg.
14.07.1946, 3/1 NOW. leg.
19.07.1947, 0/1 NOW. leg.
20.07.1947, 1/0 BECKER leg.
17.09.1949, 0/1 NOW. leg.
HD, Sandhausen, Waldhof
07.07.1923, 1/0 LEININGER leg.
05.07.1933, 1/0 LEININGER leg.

Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)

Die Meldung bei Voigt (1970) vom Kaiserstuhl (Ihringen, Frentzen leg.) beruht auf einer Fehldetermination.

- MU40SW FR, Titisee-Neustadt, Lenzkirch, Haslachthal, 13.05.1951, 1/0 STRITT leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 22.05.1922, 1/0 LEININGER leg.

- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 20.05.1898, 0/1 coll. FISCHER.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 02.04.1934, 0/1 STRITT leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 09.05.1936, 1/0 LEININGER leg.

Coreidae

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- LU92NO FR, Kaiserstuhl, Achkarren, 22.06.1953, 0/1 NOW. leg. (Voigt, 1970).
- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Juni 1922, 1/0 FRENTZEN leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 15.11.1923, 0/1 WALTHER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald 23.06.1950, 3/1 NOW. leg.
19.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 14.06.1950, 1/0 NOW. leg.
Juli 1952, 1/1 NOW. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 20.09.1949, 1/0 an Liguster, BAL. leg.


Gonocerus juniperi juniperi (Herrich-Schaeffer, 1839)

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, Jungwald, 22.06.1931, 1/0 in Gestreu, BAL. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 05.10.1959, 1/0 AMSEL leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach 21.08.1935, 1/2 an *Juniperus*, BAL. leg.
27.08.1936, 1/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
13.08.1937, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg.
30.08.1939, 3/3 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 08.08.1940, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) (Karte 18)

Diese Art ist ebenfalls in der oberrheinischen Tiefebene verbreitet. Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978) und Sandäcker bei Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993) sind die letzten beiden Nachweise aus Baden. Für Würtemberg gibt es in der Literatur zwei Meldungen um die Jahrhundertwende aus der Sammlung Hüeber: Wiblingen bei Ulm und Weinsberg (Rieger, 1972). Die Belege der Meess'schen Angaben (Meess, 1900 & 1907) waren im SMNK nicht mehr auffindbar.

- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 06.10.1931/1 unter *Calluna*, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 16.05.1936, 1/0 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 0/1 NOW. leg.



Karte 18. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
17.08.1949, 4/5 NOW. leg.
16.09.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
12.10.1949, 2/0 NOW. leg.
17.10.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, April 1928, 0/1
LEININGER leg.
- MV63NO KA, Untergrombach, Bahngleise,
22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
1/0 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
25.07.1930, 0/1 LEININGER leg.
21.06.1936, 1/0 LEININGER leg.
17.09.1949, 1/1 NOW. leg.

- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 0/1 NOW.
leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 1/0 NOW. leg.

Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)

Bereits von Voigt (1970) als Neufund für Baden veröffentlicht. Am Scheibenberg zuletzt 1974 gefunden (Voigt, persönl. Mitteilung) seither nicht mehr aufgefunden, im Mittelrheingebiet ist diese Art jedoch verbreitet, aber seltener als in den 30-iger Jahren (Zebe, 1971).

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 21/20 NOW. leg.


Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

- LU90SO FR, Müllheim Buggingen, 04.06.1956, 1/0 NOW. leg.
- LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren, 14.05.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Merdingen, 07.06.1922, 0/1 LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, Juni 1922, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU28SO OG, Achern, Renchen, 05.03.1938, 1/0 Heckengestreu, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau
28.06.1934, 0/1 an *Eryngium*, BAL. leg.
30.06.1934, 1/0 an *Populus alba*, BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, Aug. 1947, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 1899, 1/0 coll. FISCHER.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 13.07.1956, 0/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 03.03.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.07.1946, 0/2 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.10.1952, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 12.05.1948, 0/1 NOW. leg.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Aug. 1928, 0/1 BECKER leg.
- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Merdingen, 09.06.1922, 0/1 LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 04.09.1922, 0/1 LEININGER leg.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 17.09.1941, 0/1 an *Rumex crispus*, BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch
Juni 1922, 2/0 FRENTZEN leg.
28.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
Aug. 1924, 0/1 FRENTZEN leg.
Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
21.06.1921, 1/0? leg.
01.05.1923, 1/0 an Ginsterblüte, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel
02.05.1931, 3/1 an *Quercus*, BAL. leg.
04.05.1931, 1/1 an *Quercus*, BAL. leg.
15.09.1931, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.

- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU55SW FDS, Alpirsbach, Wittichen, 20.06.1925, 0/2 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 0/3 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Exerzierplatz, 11.08.1923, 1/0 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, City, Park
30.04.1922, 0/1 BECKER leg.
15.05.1922, 0/1 FRENTZEN leg.
15.06.1923, 0/1 BECKER leg.
08.05.1925, 1/0 LEININGER leg.
29.06.1926, 0/1 LEININGER leg.
19.09.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
02.05.1928, 0/1 BECKER leg.
Okt. 1963, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Killisfeld, 07.08.1931, 1/0 BECKER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, Saumseen, 01.07.1987, 1/1 KUSSMAUL leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 29.07.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 26.04.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
03.06.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV62NO KA, Karlsruhe, Söllingen, Pfingztal, 17.08.1964, 0/1 MÜLLER leg.
KA, Pfingztal, Tongrube Eder, Heulenberg, 20.08.1987, 2 Larven, KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert
13.05.1885, 1/0? leg., coll. FISCHER.
Juni 1886, 1/0? leg., coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, 11.10.1987, 0/1 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhohle, 07.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 09.05.1936, 0/1 LEININGER leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV82SO PF, Pforzheim, Arlinger, 20.06.1986, 1/0 WALLNER leg.
- MV94SO HN, Heilbronn, Eppingen, 28.08.1924, 0/1 BECKER leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen, Aug. 1929, 1/1 FRENTZEN leg.
- NU07NO TÜ, Tübingen, Neuhalde, 16.06.1981, 1/0 FREY leg.
- NV11NW LB, Ludwigsburg, Favoritenpark, Okt. 1952, 0/1 NOW. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 05.08.1949, 0/1 an *Rumex crispus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
14.08.1937, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
16.08.1937, 0/1 an Luzerne, BAL. leg.
27.08.1949, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg.



Karte 19. *Spathocera dahlmannii* (Schilling, 1829). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 15.05.1940, 0/1 im Flug gekäschert, BAL. leg.

Spathocera dahlmannii (Schilling, 1829) (Karte 19)

Erstnachweis dieser Art für Baden-Württemberg in Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978), inzwischen nochmals auf Sandäckern bei Wiesental gefunden (Voigt & Rietschel, 1993). Nach den untenstehenden Funden ist die Art in der oberrheinischen Tiefebene offenbar verbreitet, in Württemberg nicht gefunden.

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, Okt. 1949, 1/0 NOW. leg.


MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
06.08.1952, 3/13 NOW. leg.
17.09.1952, 1/3 NOW. leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 0/1 coll. FISCHER.

KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 08.11.1949, 1/0 NOW. leg.

MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 26.10.1949, 1/0 NOW. leg.

MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, Sep. 1949, 1/3 NOW. leg.



Karte 20. *Arenocoris falleni* (Schilling, 1829).
Baden-württembergische
Fundorte in der Samm-
lung des SMNK.

Arenocoris falleni (Schilling, 1829) (Karte 20)

Voigt (1977b) veröffentlichte bereits die Funde von Sandhausen und die von Maxau von 1948 als Erstnachweis für Baden-Württemberg, später erst auf Sandäckern bei Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993) nachgewiesen. Die Art sollte in der Oberrheinebene weitverbreitet sein.

- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 2/1 NOW. leg.
MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 2/0 NOW. leg.
MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 20.10.1948, 7/2 NOW. leg.
17.08.1949, 10/13 NOW. leg.
16.09.1953, 1/2 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 1/0 NOW. leg.

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 3/3 NOW. leg.

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

- MU18SW OG, Kehl a. Rh. 27.09.1937, 1/2 unter *Artemisia*, BAL. leg.
29.09.1937, 4/2 unter *Artemisia*, BAL. leg.
MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 1/3 NOW. leg.
MV42SW RA, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 1/0 NOW. leg.
MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1949, 0/1 NOW. leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952, 0/2 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 02.09.1949, 2/0 am Boden, NOW. leg.

- 12.10.1949, 1/0 NOW. leg.
 22.03.1950, 1/0 NOW. leg.
 22.08.1951, 2/2 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 23.07.1952, 0/1 NOW. leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 10.09.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
 17.09.1949, 2/0 NOW. leg.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Seltene xerothermophile Art, die in Baden zuerst vom Kaiserstuhl (Neunlinden: Meess, 1900) (Strohm, 1933), dann vom Isteiner Klotz (Duderstadt, 1974), von Sipplingen a. B. (Wagner, 1938), aus Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978), vom Buchswald bei Grenzach (Schmid, 1979) und von Sandäckern bei Wiesental bekannt wurde (Voigt & Rietschel, 1993). Aus Württemberg liegt nur eine Meldung für Sachsenheim bei Ludwigsburg vor (Schawaller & Schmalfuß, 1983).

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.05.1925, 0/1 LEININGER leg.

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Etwas häufiger als ihre Schwesterart.

- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952,
 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
 08.09.1951, 1/0 NOW. leg.
 03.09.1952, 1/1 NOW. leg.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/0 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 LU92NO FR, Breisach, Kaiserstuhl, Achkarren,
 23.06.1953, 1/1 NOW. leg.
 LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 2/0
 FRENTZEN leg.
 LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Lim-
 burg, 05.05.1923, 5/0 FRENTZEN leg.
 MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Merdingen,
 07.06.1922, 2/0 LEININGER leg.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg
 21.06.1953, 1/0 NOW. leg.
 06.05.1958, 1/0 NOW. leg.
 MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch
 Juni 1922, 1/0 FRENTZEN leg.
 20.04.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
 MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel,
 25.07.1934, 0/1 am Boden, BAL. leg.
 MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 2/0 LEININGER
 leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
 04.07.1948, 1/0 NOW. leg.
 09.07.1951, 1/0 NOW. leg.

- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
 29.05.1922, 3/0 LEININGER leg.
 30.06.1923, 1/0 LEININGER leg.
 MV65SW KA, Waghäusel, 21.05.1921, 1/0
 LEININGER leg.
 MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
 1/0 NOW. leg.
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
 Juli 1946, 2/0 NOW. leg.
 17.09.1949, 1/0 NOW. leg.
 NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg, 16.07.1927,
 1/0 LEININGER leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
 30.08.1948, 1/0 NOW. leg.
 15.06.1949, 2/0 NOW. leg.
 NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 25.07.1934,
 1/0 auf Sandboden, BAL. leg.
 NV16NW MOS, Mosbach, 27.05.1926, 2/1
 LEININGER leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 Wiese, 23.07.1935, 0/1 auf Boden, BAL.
 leg.
 Trift, 08.08.1935, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
 Pinetum, 09.08.1935, 1/1 an Moos, BAL.
 leg.

Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)

Aus Württemberg nicht bekannt, ebenfalls von Meess (1900) und von Burghardt & Rieger (1978) in Sandhausen gefunden, ein weiterer Fundort bei Karlsruhe (Meess, 1907).

- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 12.10.1949, 2/2 NOW. leg.
 MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.08.1900, 1/0
 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
 17.09.1949, 2/2 NOW. leg.

Alydidae*Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 29.08.1930, 0/1
 LEININGER leg.
 MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/0 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 MU70NW TUT, Tuttingen, Geisingen, 03.08.1928,
 1/1 LEININGER leg.
 MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1
 NOW. leg.
 MV41SW RA, Rastatt, 05.07.1932, 1/0 BECKER
 leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
 berg, 17.09.1952, 1/1 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.10.1967, 1/0
 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 03.09.1949, 1/0 am Boden, NOW. leg.

- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 11.08.1946, 1/0 NOW. leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.07.1946, 1/1 NOW. leg.
- NT09SO FN, Überlingen a. B., Hödingen, 10.04.1926, 0/1 LEININGER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 30.08.1948, 1/0 NOW. leg. 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn, 30.07.1938, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental 22.07.1934, 0/1 am Boden, BAL. leg. 29.09.1937, 0/1 unter *Artemisia*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 07.08.1934, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, Ödland, 28.07.1933, 1/0, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 11.08.1932, 0/1 an *Trifolium alpestris*, BAL. leg. Schaftrift, 11.08.1932, 0/2 BAL. leg. 12.08.1932, 1/0 an *Trifolium alpestris*, BAL. leg. 31.08.1932, 1/1 an *Trifolium alpestris*, BAL. leg. 13.07.1934, 1/0 an *Trifolium alpestris*, BAL. leg. Trift, 24.07.1935, 1/0 am Boden, BAL. leg. 10.08.1935, 1/0 BAL. leg.
- Rhopalidae**
- Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)
- LU90SO FR, Müllheim, Buggingen, 07.06.1956, 1/0 NOW. leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg 06.06.1897, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). 21.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch 01.05.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 20.08.1936, 1/0 BECKER leg. KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rappenwörth, 11.05.1968, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 29.06.1965, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 01.06.1925, 1/0 LEININGER leg. 21.08.1927, 1/0 BECKER leg. Juni 1929, 1/0 LEININGER leg. 03.05.1960, 0/1 KORMANN leg. KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 27.09.1947, 1/1 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 08.05.1925, 1/0 BECKER leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 22.08.1900, 0/1 coll. FISCHER. KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 1/0 BECKER leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 15.09.1934, 0/1 BECKER leg.
- MV62NO KA, Pfinztal, Assisi-Teich, 03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg. KA, Pfinztal, Wöschbach, Buschäcker, 09.07.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 15.09.1927, 0/1? leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 12.07.1929, 0/1 BECKER leg. 09.07.1931, 1/1 BECKER leg.
- NT28SO FN, Meersburg, Hagnau, 24.08.1926, 0/1 LEININGER leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, Spitzberg, 21.05.1981, 1/0 WESTRICH leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 15.06.1947, 1/0 NOW. leg. 19.05.1948, 2/1 NOW. leg. 14.06.1949, 1/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 22.08.1931, 1/2 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach, 21.08.1935, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 02.08.1934, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 10.10.1949, 0/1 in *Prunus spi.*-Gestreu, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 26.08.1932, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg. Trift, 24.07.1935, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg. Trift, 03.08.1935, 1/0 an *Ononis*, BAL. leg. Trift, 16.08.1935, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg. 19.08.1935, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg. Trift, 05.08.1949, 2/1 in Streu, BAL. leg. 08.10.1949, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg. 25.07.1950, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg. 26.07.1950, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
- Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)
- Inzwischen gilt *Brachycarenum* wieder als eigene Gattung (Moulet, 1991). Der unten aufgeführte Fund findet sich bereits bei Meess (1907). Inzwischen auch aus Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978), aus Fröhnd bei Schönaum im Südschwarzwald (Bernhardt, 1988) und aus dem Hegau (unveröffentlichte eigene Funde) bekannt geworden. Aus Württemberg nicht bekannt.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 10.06.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).

- Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus* FIEBER, 1836
 NT18SO KN, Konstanz, Staad, 05.06.1928, 1/1
 LEININGER leg.
- Rhopalus (Rhopalus) distinctus* (Signoret, 1859)
 Der Fund aus Sandhausen wurde bereits veröffentlicht (Günther, Rieger & Burghardt, 1982), der Beleg des dort veröffentlichten zweiten Nachweises von Nowotny bei Untergrombach war nicht mehr auffindbar. Der vorherige Nachweis in Freiburg (Meess, 1900) ist fraglich, da die Art erst von Kerzhner (1972) sicher von *Rhopalus conspersus* Fieb. abgegrenzt wurde und der Beleg im SMNK nicht auffindbar war. Die Belege aus der Wuttachschlucht (Kless, 1961) wurden mir freundlicherweise zur Überprüfung geliehen und erwiesen sich als *R. subrufus* Gm. und *R. parumpunctatus* Schill. Mit Stichel (1925-38) waren die Arten der Gattung *Rhopalus* nicht sauber zu trennen, so daß diese Fehldetermination fast zwangsläufig erfolgen mußte. Inzwischen weitere Funde neueren Datums bei Sandhausen (Voigt, 1994).
 MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
 14.07.1946, 1/0 RIEGER det., NOW. leg.
- Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus* (Schilling, 1817)
 Drei der Funde waren in Meess (1900) als *R. rufus* Schill. veröffentlicht, erwiesen sich aber eindeutig als *R. parumpunctatus* (Schill.).
 LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/4 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
 MT89 KN, Singen, Hegau, 13.08.1935, 7/3
 LEININGER leg.
 MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/1 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 MU29SW OG, Achern, Rheinau, 08.09.1931, 1/0 an
Pinus, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, Oberachern, 10.10.1931, 0/1
 an *Calluna*, BAL. leg.
 OG, Oberachern, Bienenbuckel,
 02.10.1933, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
 MU80SW KN, Engen, 07.09.1928, 0/1 LEININGER
 leg.
 MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald
 08.07.1922, 0/1? leg.
 20.07.1922, 1/0? leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg,
 06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, Aug. 1899, 0/1
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 KA, Karlsruhe, Killisfeld, 07.08.1931, 0/1
 BECKER leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
 22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
 23.08.1950, 6/2 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube,
 28.07.1988, 1/3 KUSSMAUL leg.
 MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 01.05.1898, 0/1
 coll. FISCHER.
 KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 10.09.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald,
 03.06.1900, 0/1 coll. FISCHER.
 MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Bahngleise,
 22.07.1988, 2/0 HASSLER leg.
 NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide,
 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 19.08.1935
 1/1 an *Ulmus* u. *Larix*, BAL. leg.
- Rhopalus (Rhopalus) subrufus* (Gmelin, 1780)
 LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 2/0 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 0/1
 FRENTZEN leg.
 LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg,
 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
 MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 01.09.1923, 0/1
 LEININGER leg.
 MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/2 coll.
 FISCHER (Meess, 1900).
 MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/0
 NOW. leg.
 MU29SW OG, Achern, Rheinau, 08.09.1931, 1/0 an
Pinus, BAL. leg.
 MU38NW OG, Achern, Oberachern, 11.05.1931,
 0/1 *Sarothamnus*, BAL. leg.
 12.05.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
 03.06.1931, 1/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
 OG, Oberachern, Bienenbuckel,
 20.10.1933, 1/0 in Waldlaub, BAL. leg.
 MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
 1899, 0/3 coll. FISCHER.
 MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/1 LEININGER
 leg.
 MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg,
 06.08.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.08.1950, 0/3
 NOW. leg.
 KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
 16.07.1950, 0/1 NOW. leg.
 23.08.1950, 0/2 NOW. leg.
 MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 2/0
 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee,
 10.09.1952, 1/0 RIEGER det., NOW. leg.
 MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/0 NOW.
 leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
 07.06.1949, 1/0 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
 05.08.1934, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.

- 19.08.1935, 1/1 an *Hyper. per. u. Larix*, BAL. leg.
02.08.1939, 0/1 an *Eupatorium*, BAL. leg.
- Myrmus miriformis miriformis* (Fallén, 1807)
- MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb. 23.08.1938, 0/1 LEININGER leg.
- MU46NW OG, Bad Griesbach, 16.07.1900, 0/1 (macropter) coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 0/1 (macropter) LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 24.08.1921, 0/2 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 20.07.1927, 1/1 LEININGER leg. 15.08.1947, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 02.07.1922, 0/1 LEININGER leg. 21.09.1922, 0/1 LEININGER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 30.08.1950, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 16.07.1950, 1/0 NOW. leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum 10.09.1988, 0/1 (macropter) KUSSMAUL leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, Schaftrift, 01.08.1937, 0/1 am Boden, BAL. leg.
- Chorosoma schillingii* (Schilling, 1829)
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 16.07.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900). 17.09.1949 1/1 NOW. leg.
- Stictopleurus abutilon abutilon* (Rossi, 1790)
- Die Funde von Fischer sind in Meess (1900 & 1907) unter *S. crassicornis* L. veröffentlicht.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni 1941, 0/1 BECKER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 31.05.1925, 0/1 LEININGER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 29.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg 06.08.1952, 0/5 NOW. leg. 09.07.1958, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 21.10.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). 17.05.1922, 1/0 LEININGER leg. 19.09.1927, 1/0 HOHNENDORF leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 04.07.1947, 0/1 NOW. leg. 30.08.1950, 1/0 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
- 16.07.1950, 0/1 NOW. leg.
09.07.1951, 2/0 NOW. leg.
08.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.06.1900, 2/0 coll. FISCHER.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 3/0 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 0/2 NOW. leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, Spitzberg, 21.05.1981, 1/0 WESTRICH leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 30.08.1948, 1/0 NOW. leg. 15.06.1949, 5/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 28.09.1949, 0/2 an *Betula*, BAL. leg.
- Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1889, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholderweide, 10.09.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)
- Auch hier sind die Funde von Fischer in Meess (1900 & 1907) unter *S. crassicornis* L. veröffentlicht.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, Aug. 1924, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU13SO EM, Emmendingen, Windenreute, Hochburg, 25.04.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 29.09.1937, 1/1 im Sandboden, BAL. leg.
- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel 19.09.1932, 5/7 an *Tanacetum*, BAL. leg. 06.10.1933, 1/2 an *Teucrium*, BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 07.08.1930, 0/1 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 19.06.1950, 0/1 NOW. leg. 10.10.1967, 1/0 angefliegen, NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 2/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 04.07.1947, 3/4 NOW. leg. 02.09.1949, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 08.09.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.08.1900, 1/0 coll. FISCHER.

- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 18.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NO KA, Untergrombach, Habichtsbuckel u. Weihertal, 07.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/2 HASSLER leg.
- MV74NO KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern, 01.10.1988, 0/1 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Duttenthal-hohle
07.05.1988, 0/1 KUSSMAUL leg.
13.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Bruchsal, Rohrbacher Hof, Kreuzhohle, 13.05.1988, 0/1, 1 Ex. KUSSMAUL leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.09.1949, 1/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 2/2 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
02.09.1932, 2/0 an *Artemisia*, BAL. leg.
23.09.1948, 0/1 in Heckengestreu, BAL. leg.
30.09.1948, 0/1 an *Artemisia vulgare*, BAL. leg.
25.08.1949, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
19.08.1950, 1/0 an *Artemisia vulgare* BAL. leg.
10.09.1950, 1/0 in *Pinus*-Grundgestreu, BAL. leg.
18.09.1950, 0/1 in *Pinus*-Gestreu, BAL. leg.
- Juni 1931, 3/0 LEININGER leg.
01.07.1932, 1/0 LEININGER leg.
23.07.1954, 1/0 GREMMINGER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
22.06.1919, 1/2 LEININGER leg.
12.06.1931, 1/0 LEININGER leg.
05.06.1933, 1/0 LEININGER leg.
14.06.1934, 2/6 LEININGER leg.
06.07.1949, 1/1 NOW. leg.
20.06.1950, 4/1 NOW. leg.
18.07.1956, 4/1 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 23.05.1959, 0/4 NOW. leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 1/2 LEININGER leg.
- NT18NO FN, Überlingen a. B., Birnau, Aug. 1950, 1/0 RITZI leg., coll. NOW.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
14.06.1949, 6/4 NOW. leg.
15.06.1959, 3/3 NOW. leg.
- NV06SO MOS, Mosbach, Neckarzimmern, 27.05.1926, 1/1 LEININGER leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 15.07.1933, 2/1 am Boden, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 13.07.1934, 1/1 an *Ononis*, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 05.07.1940, 0/1 an *Hypericum perforatum*, BAL. leg.

Cydnidae

Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866

Der Beleg der Angabe von Meess (1907) war nicht auffindbar.

MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 25.04.1951, 1/0 NOW. leg.

Sehirus morio (Linnaeus, 1761)

Ein Literaturhinweis auf ein Vorkommen in Württemberg findet sich in Hüeber (1891) jedoch ohne Fundortangabe ("Württemberg"). Zuvor wurde sie von Schreckenstein (1802) für die Gegend um Rottweil erwähnt. Stichel (1925-38) führt die Art für Baden auf, in den Lokalfaunen ist sie jedoch nicht zu finden.

MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 0/1 NOW. leg.

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

MU28SO OG, Achern, Renchen, 05.03.1938, 2/0 in Bodenstreu, BAL. leg.

MU28SW OG, Kehl a. R., Legelshurst, 12.04.1937, 0/1 am Boden, BAL. leg.

MU38NW OG, Achern, Oberachern, 04.05.1931, 1/0 an *Lamium album*, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel, 12.05.1931, 0/1 an *Lamium album*, BAL. leg.

Plataspidae

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 0/3 LEININGER leg.

MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 21.08.1938, 0/2 LEININGER leg.

MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
01.08.1928, 6/3 LEININGER leg.
Aug. 1928, 2/3 BECKER leg.

MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg
06.06.1897, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).

21.06.1953, 1/0 NOW. leg.
22.06.1953, 2/0 NOW. leg.

MU29SW OG, Achern, Rheinau
28.05.1934, 0/1, BAL. leg.
30.05.1934, 4/4 an *Eryngium*, BAL. leg.
30.05.1934, 0/1, BAL. leg.
06.06.1934, 0/1 im Quercetum, BAL. leg.

MV52NW KA, Karlsruhe, Rheinhafen
08.07.1922, 1/2 LEININGER leg.
09.07.1922, 1/0 LEININGER leg.

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen

- MU80SW KN, Engen, 10.06.1926, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.07.1927, 1/0 LEININGER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 06.05.1936, 1/0 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 17.03.1954, 5/4 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Grötzingen 20.05.1900, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
12.06.1927, 1/0 LEININGER leg.
17.03.1946, 1/0 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 25.04.1951, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen 07.05.1959, 2/0 KORMANN leg.
22.04.1962, 1/0 KORMANN leg.
KA, Karlsruhe, Weingarten, 27.03.1959, 1/0 KORMANN leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Hagsfeld, 06.05.1931, 0/1 BECKER leg.
- MV76SO HD, Heidelberg, Nußloch, 17.04.1922, 1/0 LEININGER leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 07.04.1934, 1/0 an Kiefernrandmoos, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 10.10.1949, 0/1 an *Prunus spinosa*, NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 07.08.1933, 1/0 an Eiche, BAL. leg.
27.07.1935, 1/0 an Ulme, BAL. leg.
06.08.1936, 2/2 an Esche, BAL. leg.
10.09.1936, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
19.08.1939, 1 0 an *Corylus*, BAL. leg.
07.08.1940, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
17.08.1940, 1/1 an *Corylus*, BAL. leg.
21.04.1948, 0/1 an *Luzula*, BAL. leg.
24.06.1950, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 18.04.1940, 0/1 in Bodenstreu, BAL. leg.

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1842)

- Von dieser streng an *Ballota nigra* L. gebundenen Art gibt es bisher 4 Fundorte in Baden-Württemberg: der Kaiserstuhl (Strohm, 1933), Karlsruhe und Ettlingen (Meess, 1907) und das LSG "Roter Berg" bei Ludwigsburg (Rieger, 1980). Verbreitungsschwerpunkt an Mittelrhein, Nahe und Main (Schoop, 1968; Singer, 1952 und Zebe, 1957). Die Belege der Meess'schen Angabe waren im SMNK nicht mehr auffindbar.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen, 17.03.1946, 1/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.

Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)

- Auch bei dieser Art waren die Belege der Meldungen von Meess (1907) nicht auffindbar.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1957, 0/1 NOW. leg.
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 24.02.1928, 1/0 BECKER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 21.03.1951, 7/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 13.07.1955, 2/0 NOW. leg.
24.08.1955, 0/1 NOW. leg.
17.07.1956, 1/0 NOW. leg.
15.07.1965, 5/13 NOW. leg.

Canthophorus impressus Horváth, 1881


- Bisherige Verbreitung in Rieger & Strauß (1992), hier ein neuer Fundpunkt.
- MT29NW LÖ, Todtnau, Juni 1935, 3/2 O.MÜLLER leg.
- NU07SW TÜ, Tübingen, NSG Spitzberg, 21.05.1981, 0/1 RIEGER det., WESTRICH leg.

Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 22.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 19.06.1956, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 05.11.1955, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 04.03.1948, 1/0 NOW. leg.
11.06.1951, 0/1 NOW. leg.
11.11.1953, 1/0 NOW. leg.
17.03.1954, 0/1 NOW. leg.
24.07.1957, 1/0 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, kl. Bodensee, 01.11.1950, 1/1 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaelsberg 31.05.1950, 0/2 NOW. leg.
20.06.1950, 1/1 NOW. leg.
29.08.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee 17.05.1950, 1/0 NOW. leg.
25.04.1951, 1/0 NOW. leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 05.06.1928, 2/2 LEININGER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 30.08.1948, 0/1 NOW. leg.
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.

Legnotus picipes (Fallén, 1807)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg 22.06.1953, 2/0 NOW. leg.
05.05.1958, 1/0 NOW. leg.



MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
25.05.1947, 2/0 NOW. leg.
26.07.1948, 2/0 NOW. leg.
18.06.1955, 1/1 NOW. leg.

MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaels-
berg
20.06.1950, 0/1 NOW. leg.
31.05.1960, 2/0 NOW. leg.

Aethus flavicornis (Fabricius, 1794)

Von Voigt (1970) wurde diese Art ebenfalls von Sand-
hausen als Erstnachweis für Baden-Württemberg ver-
öffentlicht, ebenfalls in Burghardt & Rieger (1978) vom
gleichen Fundort erwähnt. Keine weiteren Nachweise
für Baden-Württemberg.


MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
17.09.1949, 0/4 NOW. leg.

Aethus nigratus (Fabricius, 1794) (Karte 21)

Zuerst von Meess für Neureut, Rastatt und Fahrnau
beschrieben (1900 & 1907), dann erst wieder von
Voigt (1970) bei Forchheim gefunden. Zuletzt wurde
diese in Sand lebende Art auf Sandäckern bei Wie-
sental nachgewiesen (Voigt & Rietschel, 1993). Aus
Württemberg nicht bekannt.

MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/2
NOW. leg.

MV41SW RA, Rastatt, 22.04.1900, 0/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).
RA, Rastatt, Woogsee, 11.06.1899, 0/1
coll. FISCHER.



Karte 22. *Cydnus aterrimus* (Forster, 1771). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK (sowie der nächstgelegene Fundort in der Pfalz bei Speyer).


- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 13.08.1952, 5/2 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 21.04.1948, 0/1 NOW. leg. 20.10.1948, 1/2 NOW. leg. 17.08.1949, 3/0 NOW. leg. 16.09.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg 06.08.1952, 1/6 NOW. leg. 17.09.1952, 2/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof 02.09.1949, 2/2 NOW. leg. 12.10.1949, 1/0 NOW. leg. 22.03.1950, 0/1 NOW. leg. 18.06.1955, 0/1 NOW. leg. 05.10.1955, 0/1 NOW. leg.

- MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaelsberg, 04.05.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 17.07.1946, 2/0 NOW. leg. 17.09.1949, 1/0 NOW. leg.

Cydnus aterrimus (Forster, 1771) (Karte 22)

Die Belege der Meldungen von Meess bei Karlsruhe und Heidelberg (1900 & 1907) waren im SMNK nicht auffindbar, in der weiteren Literatur nur wenige Fundorte: Holheim (Fischer, 1961), Blaubeuren, Sulz a. N., Ulm (Rieger, 1972: coll. Hüeber um 1900). Der einzige Fundort neueren Datums ist Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978). In der benachbarten Pfalz bei Speyer gefunden (Meess, 1907).

Karte 23. *Eurygaster austriaca* (Schrank, 1778).
Baden-württembergische
Fundorte in der Samm-
lung des SMNK.



LT99NO FR, Müllheim, Dattingen, 11.07.1937, 0/1
LEININGER leg.
MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Tiengen,
09.06.1922, 0/1 LEININGER leg.
MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.08.1920, 0/1
BECKER leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
23.07.1952, 0/2 NOW. leg.
MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaels-
berg
04.05.1949, 1/0 NOW. leg.
11.05.1950, 0/1 NOW. leg.
MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 22.07.1953, 1/0
NOW. leg.
MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
12.07.1929, 1/0 BECKER leg.
22.07.1930, 0/2 BECKER leg.

05.07.1933, 1/0 LEININGER leg.
09.07.1934, 1/0 LEININGER leg.
17.09.1949, 0/1 NOW. leg.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.

Thyreocoridae

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
21.03.1951, 1/0 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
22.03.1950, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
08.04.1954, 1/0 NOW. leg.
MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaelsberg

- 29.03.1950, 0/1 NOW. leg.
31.05.1950, 1/2 NOW. leg.
MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee
April 1948, 0/1 NOW. leg.
25.01.1951, 0/1 NOW. leg.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
19.05.1948, 0/1 NOW. leg.
NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 12.04.1934,
1/0 an Kiefernmoos, BAL. leg.
NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 06.04.1936,
1/0 in Heckenstreu, BAL. leg.

Scutelleridae

Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg
21.06.1953, 1/3 NOW. leg.
06.05.1958, 1 Larve NOW. leg.
MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
21.04.1948, 1 Larve NOW. leg.
17.08.1949, 1 Larve NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
30.08.1950, 0/1 NOW. leg.
MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg 18.07.1951, 0/1 NOW. leg.
MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
14.07.1946, 0/1 NOW. leg. (Voigt, 1977b).

Eurygaster austriaca (Schränk, 1778) (Karte 23)

Die Verbreitung dieser ausgesprochen thermophilen Art wird in Rieger (1989a) diskutiert, er gibt dort eine Verbreitungskarte mit 10 Fundpunkten. Inzwischen ein weiterer Fund im Neckartal bei Rangendingen nahe Rotenburg (Bernhardt, 1988). Der neueste Fundort sind die Sandäcker bei Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993). In der Literatur war noch ein weiterer Nachweis von Seebach bei Ottenhöfen (Voigt, 1977 c). Hier kommen nun 7 neue Fundorte hinzu, von denen der Fund aus dem Hegau sowie ein eigener, unveröffentlichter Fund von einem Halbtrockenrasen auf dem Bodanrück für eine zusätzliche postglaziale Wiederbesiedlung über den „Reschenweg“ sprechen könnten. Die Meldungen von *E. hottentota* H.-S. in Meess (1900) betreffen *E. austriaca* Schr., die Belege konnten nicht mehr gefunden werden.

- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 0/4
LEININGER leg.
MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
04.04.1951, 2/0 NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
19.08.1953, 0/1 NOW. leg.
MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
Aug. 1935, 0/1 BECKER leg.
11.04.1951, 0/1 NOW. leg.
23.08.1951, 1/0 NOW. leg.
02.09.1953, 1/1 NOW. leg.

- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 22.07.1953, 0/2
NOW. leg.
MV72SW PF, Pforzheim, Bifflingen, 08.08.1936, 0/1
LEININGER leg.
MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 1/0 NOW.
leg.
NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.03.1948, 1/0 NOW. leg.
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 3/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).
LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R.,
10.07.1933, 0/1 LEININGER leg.
LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Lim-
burg, 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 22.08.1938,
0/1 LEININGER leg.
MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Aug.
1928, 1/0 BECKER leg.
MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 6/1
LEININGER leg.
MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg
04.09.1922, 0/1 LEININGER leg.
23.04.1931, 1/0 GREMMINGER leg.
22.06.1953, 1/1 NOW. leg.
MU10NO FR, Freiburg, Schauinsland, 07.08.1899,
1/0 coll. FISCHER.
MU11NW FR, Freiburg
05.08.1899, 1/4 coll. FISCHER (Meess,
1900).
25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
25.08.1900, 1/0 coll. FISCHER.
MU38NW OG, Achern, Oberachern, 01.08.1930, 1/0
LEININGER leg.
MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“,
15.08.1928, 0/1 BECKER leg.
MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928,
2/0 LEININGER leg.
MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.08.1947, 1/0
NOW. leg.
MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.08.1950, 1/1 NOW. leg.
19.03.1952, 0/1 NOW. leg.
MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
21.09.1927, 0/2 LEININGER leg.
Aug. 1935, 0/1 BECKER leg.
16.04.1949, 0/2 NOW. leg.
20.06.1950, 0/1 NOW. leg.
29.08.1951, 1/0 NOW. leg.
28.09.1951, 1/0 NOW. leg.
MV63NW KA, Karlsruhe, Friedrichstal, 05.08.1923,
0/1 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Stutensee
04.08.1948, 1/0 NOW. leg.
12.09.1951, 1/0 NOW. leg.
MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953,
0/1 NOW. leg.

- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne, 17.07.1946, 0/1 NOW. leg.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee, 04.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 30.08.1948, 1/0 NOW. leg.
14.06.1949, 1/0 NOW. leg.
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 08.08.1931, 1/0 BAL. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt 28.08.1931, 1/0 auf Getreideacker, BAL. leg.
05.09.1933, 0/1 BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 06.09.1934, 0/1 an Roggen, BAL. leg.
Trift, 24.07.1935, 0/1 BAL. leg.
29.07.1935, 0/1 BAL. leg.
05.08.1935, 1/0 auf Boden, BAL. leg.
03.08.1937, 0/2 auf Grasboden, BAL. leg.
25.08.1937, 1/0 auf Boden, BAL. leg.
07.08.1938, 0/1 an Wasserdost, BAL. leg.
Trift, 30.07.1949, 1/0 gestreift, BAL. leg.
27.08.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 20.04.1940, 0/4 unter *Juniperus*, BAL. leg.
- Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)
- Die beiden Meldungen aus Karlsruhe waren als *E. maura* L. veröffentlicht (Meess, 1900).
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 15.08.1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 21.08.1938, 2/0 LEININGER leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht Aug. 1941, 1/0 BECKER
Aug. 1949, 0/1 BECKER leg.
03.06.1950, 1/0 STRITT leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 04.09.1922, 1/0 LEININGER leg.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, 20.08.1934, 0/1 LEININGER leg.
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/1 NOW. leg.
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 2/3 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald, 09.07.1921, 0/1 BECKER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 03.08.1923, 0/1 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell Aug. 1953, 1/0 NOW. leg.
23.06.1960, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Marxzell, Moosalbtal, Aug. 1934, 1/0 LEININGER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen, 25.08.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 04.07.1948, 0/1 NOW. leg.
28.06.1951, 0/1 NOW. leg.
08.09.1951, 1/0 NOW. leg.
29.07.1952, 1/0 NOW. leg.
19.08.1953, 1/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.09.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 21.05.1927, 1/3 LEININGER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 16.09.1900, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Berghausen 10.07.1934, 0/1 STRITT leg.
KA, Pfintzal, Assisi-Teich, 03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
KA, Pfintzal, Horster Graben, 03.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Friedrichstal, 26.06.1938, 0/1 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Stutensee, Juli 1949, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen, 30.08.1958, 0/4 KORMANN leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener Moor, 18.06.1960, 0/1 1 Larve NOW. leg.
- MV65SW KA, Waghäusel, Waghäusel, 21.05.1921, 3/1 LEININGER leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 0/1 coll. MÜLLER.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee 04.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
01.08.1930, 1/1 LEININGER leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Hegne, 29.07.1930, 0/2 LEININGER leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 06.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- NU42NW BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Moosburg, 07.08.1980, 0/1 FREY leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 30.08.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 20.07.1934, 1/0 an *Larix*, BAL. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 05.09.1933, 0/1 an *Cirsium palustre*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 03.08.1937, 0/2 auf Grasboden, BAL. leg.
21.08.1937, 0/1 an *Eupatorium cannabin.*, BAL. leg.
25.08.1937, 1/0 BAL. leg.
28.08.1937, 1/0 an *Eupatorium cannabin.*, BAL. leg.
30.08.1937, 3/3 an Wasserdost, BAL. leg.
22.08.1938, 1/0 an Wasserdost, BAL. leg.
15.09.1939, 2/2 an Wasserdost, BAL. leg.
25.08.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.
27.08.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.

Pentatomidae*Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein
03.08.1919, 1/0 FRENTZEN leg.
29.08.1930, 2/3 LEININGER leg.
19.06.1931, 1/3 LEININGER leg.
12.07.1933, 1/1 LEININGER leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Sasbach,
Aug. 1924, 2/0 FRENTZEN leg.
- MT39SO WT, St. Blasien, Schwarzatal, 29.08.1934
1/1 STRITT leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
Juni 1931, 4/2 KNEUCKER leg.
11.08.1934, 0/1 STRITT leg.
Aug. 1938, 0/1 STRITT leg.
Mai 1939, 4/4 BECKER leg.
Aug. 1941, 4/2 BECKER leg.
06.08.1942, 0/1 STRITT leg.
14.07.1944, 0/1 STRITT leg.
28.05.1950, 1/2 STRITT leg.
03.06.1950, 1/0 STRITT leg.
- MT69NO VS, Blumberg, Juni. 1934, 4/2 STRITT
leg.
- MT79SO KN, Singen, Binningen, 07.07.1929, 1/0
LEININGER leg.
- MT89 KN, Singen, Hegau, 11.08.1931, 1/3
LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 14.07.1933, 0/2
LEININGER leg.
- MU03SW EM, Emmendingen, Endingen, Silberbrun-
nen, 05.08.1922, 2/1 FRENTZEN leg.
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz
Juni 1922, 0/1 FRENTZEN leg.
Aug. 1924, 1/1 FRENTZEN leg.
Aug. 1926, 3/2 FRENTZEN leg.
13.08.1932, 0/1 LEININGER leg.
20.08.1934, 2/1 LEININGER leg.
- MU12SO EM, Denzlingen, 09.06.1946, 2/0
LEININGER leg.
- MU40SW FR, Titisee-Neustadt, Lenzkirch
Aug. 1934, 1/1 STRITT leg.
31.05.1950, 1/0 STRITT leg.
- MU56SO FDS, Freudenstadt, Loßburg, Schömburg,
23.08.1934, 0/1 LEININGER leg.
- MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“,
Aug. 1928, 2/1 BECKER leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Aseffingen, 09.06.1938,
1/3 STRITT leg.
- MU69SW CW, Wildbad, Sprollenhaus, 24.06.1955,
0/1 NOW. leg.
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen
03.08.1928, 1/1 LEININGER leg.
01.07.1934, 0/2 STRITT leg.
- MU80NW TUT, Immendingen, Hattingen,
07.07.1929, 1/0 LEININGER leg.
- MU80SW KN, Engen
10.06.1928, 1/2 LEININGER leg.
07.08.1928, 1/4 LEININGER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg
01.09.1987, 3/0 KUSSMAUL leg.
06.08.1952, 1/2 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
01.08.1948, 1/3 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 04.06.1900 1/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Berghausen,
30.07.1936, 0/1 STRITT leg.
KA, Pfinztal, Garten, 15.07.1988, 0/1 an
Petersilie, ZÖLLER leg., coll.
KUSSMAUL.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach,
18.06.1930, 2/0 BECKER leg.
KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
28.08.1951, 2/0 NOW. leg.
19.06.1957, 0/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee
28.07.1948, 0/2 NOW. leg.
22.07.1953, 0/2 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen,
24.07.1963, 0/1 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Weingarten, 29.06.1963,
2/4 KORMANN leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener
Moor
20.05.1953, 0/2 NOW. leg.
18.06.1958, 1/0 NOW. leg.
18.06.1960, 1/1 NOW. leg.
- MV66NO HD, Schwetzingen, Oftersheim,
08.07.1953, 1/0 LEININGER leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV74SW KA, Bruchsal, Ramberg, Auwegohle,
13.05.1988, 2/1 KUSSMAUL leg.
- NU42SO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Taubes
Ried, 13.06.1981, 0/1 FREY leg.
- Podops (Podops) inuncta* (Fabricius, 1775)
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 2/0
NOW. leg.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlich-
wald, 02.11.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
06.04.1949, 0/1 NOW. leg.
05.10.1955, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
03.09.1952, 1/1 NOW. leg.
01.11.1952, 1/0 NOW. leg.
19.06.1953, 1/0 NOW. leg.
28.10.1953, 1/0 NOW. leg.
11.11.1953, 0/3 NOW. leg.
06.10.1954, 0/1 NOW. leg.
27.11.1957, 0/3 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 18.09.1898, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg
09.02.1899, 0/1 coll. FISCHER.

- 12.03.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee
30.03.1949, 1/0 NOW. leg.
25.04.1951, 3/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener Moor, Sep. 1950, 0/1 NOW. leg.
- MV64SW KA, Karlsruhe, Graben, 18.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee, 04.06.1928, 1/0 LEININGER leg.
- Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans* (Fabricius, 1794)
- Auch hier waren die Meess'schen Belegexemplare nicht auffindbar.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Durmersheim, Rottlichwald, 02.11.1949, 1/1 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau
20.10.1948, 0/1 NOW. leg.
17.08.1949, 1/5 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 26.05.1947, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof
06.04.1949, 0/4 NOW. leg.
02.09.1949, 0/2 NOW. leg.
12.10.1949, 3/0 NOW. leg.
30.08.1950, 3/4 NOW. leg.
22.08.1951, 1/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.07.1952, 0/1 NOW. leg.
19.08.1953, 2/0 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
08.09.1949, 1/2 NOW. leg.
29.03.1950, 1 0 NOW. leg.
20.06.1950, 0/1 NOW. leg.
02.09.1953, 1 0 NOW. leg.
21.09.1955, 0/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 04.08.1948, 0/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
17.07.1946, 0/1 Now. leg.
17.09.1949, 0/2 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/1 NOW. leg.
- Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus* Flor, 1860
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 1/1 NOW. leg., RIEGER det.
- Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- LU90SO FR, Müllheim Buggingen, 01.06.1956, 0/2 NOW. leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht,
29.05.1950, 1/0 STRITT leg.
- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 21.09.1938, 1/0 unter Ginster, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau
28.05.1934, 0/3 BAL. leg.
29.05.1934, 2/1 an Gräsern, BAL. leg.
04.06.1935, 1/0 BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 24.08.1921, 0/1 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rappenwörth
22.05.1920, 0/1 LEININGER leg.
22.05.1926, 1/0 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Daxlanden, Rheinwald, Okt. 1920, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 4/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
22.06.1925, 1/0 LEININGER leg.
10.08.1927, 0/2 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.08.1950, 1/0 NOW. leg.
17.06.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 02.09.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.05.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 22.06.1897, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen
05.07.1922, 1/0 LEININGER leg.
31.05.1951, 0/1 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
11.09.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
05.10.1927, 1/0 LEININGER leg.
31.05.1950, 1/1 NOW. leg.
20.06.19940, 0/1 BAL. leg.
- Aelia klugi* Hahn, 1831
- MV67NO MA, Mannheim, Friedrichsfeld
11.06.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
13.05.1899, 0/1 RIEGER det., coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal, 09.06.1934, 0/1 an *Sedum acre*, BAL. leg.

Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)
(Karte 24)

Aus Württemberg ist bisher ein einziger Fundort bei Weinsberg um 1900 bekannt (Rieger, 1972). Neben den Meess'schen Angaben (1900 & 1907) in Baden vom Isteiner Klotz (Duderstadt, 1974) aus Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978) und später erst von Sandäckern bei Waghäusel/Wiesental (Voigt & Riet-schel, 1993) bekannt geworden. Ist aber anscheinend in der oberrheinischen Tiefebene häufig.


- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 20.06.1953, 0/1 NOW. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 28.05.1934, 3/1 BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 05.08.1933, 0/1 LEININGER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 06.08.1952, 4/2 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 22.06.1925, 2/0 LEININGER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 1/0 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald 23.06.1950, 3/3 NOW. leg.
10.11.1950, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 22.08.1951, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 23.08.1950, 1/0 NOW. leg.
15.06.1951, 1/1 NOW. leg.
09.07.1951, 3/7 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.08.1900, 2/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Mörsch, Allmendäcker, Sandgrube, 28.07.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 16.04.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg, 02.09.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV68SO MA, Mannheim, Käfertal 08.06.1934, 1/1 Grasstreife, BAL. leg.
08.06.1934, 0/1 BAL. leg.
- MV68SW MA, Mannheim, City, 09.06.1934, 0/1 Grasstreife, BAL. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne 09.06.1934, 1/2 LEININGER leg.
14.07.1946, 2/1 NOW. leg.
17.09.1949, 1/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 12.05.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 05.09.1950, 0/1 an Waldgras, BAL. leg.
MOS, Osterburken, Marienhöhe, 13.08.1935, 0/1 BAL. leg.

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789)

- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, 05.10.1949, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 15.06.1951, 0/1 NOW. leg.
21.07.1951, 0/1 NOW. leg.
11.11.1953, 0/2 NOW. leg.
08.04.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 05.05.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg, 05.06.1962, 1/1 NOW. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 10.08.1934, 1/0 auf Waldboden, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
Trift, 10.08.1935, 1/0 unter *Eupat. cann.*, BAL. leg.
13.08.1935, 1/0 an Kiefernmoos, BAL. leg.
22.08.1935, 1/0 an Kiefernmoos, BAL. leg.
03.04.1936, 1/0 in Heckengestreue, BAL. leg.
08.09.1939, 1/0 an *Scrophularia*, BAL. leg.
15.09.1939, 1/0 BAL. leg.

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

- MU11NW FR, Freiburg, Juni 1905, 0/2 ROEWER leg.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier 21.07.1938, 0/1 auf Wiese, BAL. leg.
16.09.1941, 1/0 am Waldrand, BAL. leg.
17.09.1941, 0/2 Grasstreife, BAL. leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 17.09.1941, 1/0 an Gras, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern
29.05.1931, 0/1 an Wiesengatter, BAL. leg.
14.07.1932, 1/0 im Salicetum, BAL. leg.
10.09.1932, 1/0 BAL. leg.
OG, Achern, Oberachern
11.05.1931, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
19.06.1931, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel
19.09.1932, 1/1 an *Tanacetum*, BAL. leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 24.08.1921, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 11.06.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 20.08.1925, 0/1 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen
12.03.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
01.10.1900, 0/3 coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 30.08.1950, 0/1 NOW. leg.



Karte 24. *Neottiglossa leporina* (Herrich-Schaeffer, 1830). Baden-württembergische Fundorte in der Sammlung des SMNK.

	KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald	NV27SW	MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
	04.07.1948, 1/1 NOW. leg.		21.07.1934, 0/1 an Linde, BAL. leg.
	11.06.1949, 0/1 NOW. leg.	NV36NO	KÜN, Schöntal, Oberkessach, Wald,
	08.04.1954, 1/0 NOW. leg.		12.04.1934, 2/0 an Kiefernrandmoos,
	17.07.1957, 1/0 NOW. leg.		BAL. leg.
MV52SW	KA, Karlsruhe, Hardtwald, 19.08.1900, 0/1	NV37SW	KÜN, Schöntal, Hopfengarten
	coll. FISCHER (Meess, 1900).		01.04.1932, 0/1 auf Moos, BAL. leg.
MV53NO	KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.08.1900,		04.04.1932, 1/0 unter Moos, BAL. leg.
	1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).		08.03.1934, 1/1 an Waldmoos, BAL. leg.
MV53SW	KA, Karlsruhe, Mühlburg, 22.09.1898, 1/0		31.07.1935, 0/1 BAL. leg.
	coll. FISCHER (Meess, 1900).		09.08.1935, 0/1 an Gras, BAL. leg.
	KA, Karlsruhe, Neureut, 18.09.1898, 1/2		19.08.1935, 1/2 an <i>Scrophularia</i> , BAL. leg.
	coll. FISCHER (Meess, 1900).		03.04.1936, 1/1 in Heckengestreu, BAL.
NV16NO	MOS, Mosbach, Katzental, 15.08.1935,		leg.
	1/0 an <i>Mentha aquatica</i> , BAL. leg.		25.08.1937, 0/1 an <i>Corylus</i> , BAL. leg.
NV27NO	MOS, Osterburken, Hemsbach,		08.09.1939, 2/4 an <i>Scrophularia</i> , BAL. leg.
	30.08.1939, 1/0 an <i>Juniperus</i> , BAL. leg.		23.08.1949, 1/0 an <i>Corylus</i> , BAL. leg.

- 25.08.1949, 1/0 an Hasel, BAL. leg.
28.08.1949, 1/0 an Hasel, BAL. leg.
MOS, Osterburken, Dörnishof,
03.04.1934, 1/0 an Waldmoos, BAL. leg.
- Eysarcoris fabricii* Kirkaldy, 1904
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 10.06.1933, 1/1
BECKER leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
11.05.1931, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg.
12.05.1931, 1/3 an *Urtica*, BAL. leg.
18.05.1931, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 17.06.1900, 0/2
coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
09.06.1962, 0/1 NOW. leg.
30.07.1963, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Killisfeld, 30.05.1963, 0/1
KORMANN leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 20.08.1950, 8/6
NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
16.07.1950, 1/0 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlacher Wald,
21.05.1898, 0/2 coll. FISCHER (Meess,
1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
31.05.1950, 0/1 NOW. leg.
20.06.1950, 1/0 NOW. leg.
16.06.1951, 0/2 NOW. leg.
29.08.1951, 0/4 NOW. leg.
19.06.1957, 1/2 NOW. leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Blankenloch, 16.06.1958,
1/0 KORMANN leg.
KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener
Moor, 18.06.1958, 1/2 NOW. leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 1/1 coll. MÜLLER.
- MV77SO HD, Heidelberg, City, Juni 1899, 1/1 coll.
FISCHER (Meess, 1900).
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 2/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
24.05.1934, 2/4 an *Stachys silvatica*, BAL.
leg.
19.08.1935, 0/1 an *Hypericum*, BAL. leg.
29.07.1937, 2/3 an *Stachys silvatica*, BAL.
leg.
25.08.1938, 0/1 an Luzerne, BAL. leg.
29.07.1939, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg.
08.09.1939, 2/0 an *Scrophularia*, BAL.
leg.
16.09.1939, 1/1 an *Urtica*, BAL. leg.
21.08.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
26.08.1950, 2/0 (1 Ex. an *Urtica*), BAL.
leg.
02.09.1950, 2/3 an *Stachys* u. *Urtica* BAL.
leg.
05.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- Stagonomus pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1830)
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900,
0/1 coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, 05.08.1933, 3/0 LEININGER
leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 17.07.1952,
0/1 NOW. leg.
- Staria lunata* (Hahn, 1835)
- Schon von Meess (1900 & 1907) und Strohm (1933)
für den Kaiserstuhl beschrieben; die Meess'schen
Belege waren nicht mehr auffindbar. In Baden-Würt-
temberg sonst nur noch vom Isteiner Klotz bekannt
(Duderstadt, 1974).
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 21.06.1953, 4/3
NOW. leg.
- Rubiconia intermedium* (Wolff, 1811)
- MU11NW FR, Freiburg
05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
25.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU55SW FDS, Alpirsbach, Wittichen, 20.06.1925,
1/0 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 28.08.1953, 0/1
NOW. leg.
- Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)
- "Z.W. Gm.", 11.04.1885, 1/0 coll. Fischer.
- MT39SO WT, St. Blasien, Schwarzatal, 29.08.1934,
0/1 STRITT leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht,
18.05.1951, 1/0 STRITT leg.
- MU18SO OG, Kehl a. R., Bodersweier, 16.09.1941,
1/2 an *Corylus* u. *Cornus*, BAL. leg.
OG, Kehl a. R., Hanauer Land,
22.05.1957, 1/0 BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch,
21.05.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern
12.09.1931, 1/0 BAL. leg.
30.05.1932, 1/0 BAL. leg.
19.08.1933, 1/0 BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel,
25.04.1932, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 19.07.1900,
0/1 coll. FISCHER.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug.
1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU49NW BAD, Baden-Baden, Varnhalt,
29.08.1938, 0/1 LEININGER leg.
- MU56SO FDS, Freudenstadt, Loßburg, Schömberg,
23.08.1934, 0/1 LEININGER leg.
- MV51NW KA, Malsch, Sulzbach, 30.08.1982, 1/0
EBERT leg.
KA, Malsch, Sulzbach, Wohnung,
01.03.1993, 1/0 EBERT leg.

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 29.05.1959, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
05.09.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
29.10.1899, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
Okt. 1920, 1/0 LEININGER leg.
Juli 1934, 0/1 LEININGER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 13.05.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald
19.09.1951, 0/3 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
01.06.1947, 1/0 NOW. leg.
28.06.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 12.03.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 02.05.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Berghausen,
31.05.1934, 0/1 LEININGER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 04.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
04.09.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
27.09.1927, 1/0 LEININGER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach,
11.10.1987, 0/1 HASSLER leg.
KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg,
21.09.1927, 0/1 LEININGER leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen,
17.06.1923, 1/0 LEININGER leg.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener Moor,
13.09.1950, 1/0 NOW. leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Hegne, 29.07.1931, 0/1 LEININGER leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
15.06.1944, 0/1 NOW. leg.
19.05.1948, 1/0 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckarmühlbach,
17.06.1929, 0/1 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
14.08.1937, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
26.08.1939, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
Wald, 14.10.1948, 1/0 an *Gras*, BAL. leg.
22.08.1949, 1/1 an *Erle* u. *Betula*, BAL. leg.
09.09.1949, 2/0 an *Hasel*, BAL. leg.
30.05.1950, 1/0 an *Urtica*, BAL. leg.
06.09.1950, 0/1 an *Galeopsis*, BAL. leg.
- Palomena viridissima* (Poda, 1761)
- LT99NO FR, Müllheim, Dattingen, 11.07.1937, 0/1 LEININGER leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 17.09.1941, 1/0 an *Cornus*, BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
30.05.1931, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
06.10.1933, 0/1 BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 13.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, Aug. 1933, 0/1 BECKER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Moosalbtal,
02.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
16.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
15.08.1934, 1 Larve BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 01.10.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
06.05.1936, 1/0 LEININGER leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
07.09.1933, 1/0 LEININGER leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark, 13.10.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 30.04.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Berghausen,
04.09.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
01.08.1930, 1/0 BECKER leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
03.04.1886, 0/1? leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg,
23.04.1958, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen
02.05.1959, 2/0 KORMANN leg.
07.05.1959, 0/1 KORMANN leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV86SW HD, Wiesloch Baiertal, 15.06.1934, 1/1 BECKER leg.
- NA50NW TBB, Tauberbischofsheim, Wenkheim,
17.07.1927, 0/1 LEININGER leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen,
Aug. 1929, 0/1 FRENTZEN leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
30.08.1948, 0/1 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckarmühlbach,
17.06.1929, 1/0 LEININGER leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzentäl, 10.08.1931, 0/1 an *Medicago sativa*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
20.08.1932, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
31.08.1932, 1/1 an *Pinus*, BAL. leg.
25.04.1934, 0/1 an *Fagus*, BAL. leg.
19.08.1936, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.

- Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794)
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 12.06.1953, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 1897, 0/1 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
31.05.1950, 3/1 NOW. leg.
20.06.1950, 2/1 NOW. leg.
16.06.1954, 1/0 NOW. leg.
21.09.1955, 0/1 NOW. leg.
18.07.1956, 1/0 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- Dryocoris vernalis* (Wolff, 1804)
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Aug. 1941, 1/0 BECKER leg.
- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Merdingen, 07.06.1922, 1/0 LEININGER leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, 03.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 12.05.1931, 1/4 an *Quercus*, BAL. leg.
OG, Oberachern, Bienenbuckel
02.10.1933, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
06.10.1933, 0/1 an *Teucrium*, BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen
10.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
07.08.1928, 2/1 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, 27.05.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
23.08.1950, 0/3 NOW. leg.
06.09.1950, 2/1 NOW. leg.
23.06.1954, 1/0 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV61SW KA, Karlsruhe, Marxzell, Ittersbach, 02.07.1930, 0/1 LEININGER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 06.08.1944, 1/0 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
31.05.1950, 1/3 NOW. leg.
20.06.1950, 1/2 NOW. leg.
18.07.1951, 0/1 NOW. leg.
28.09.1951, 0/1 NOW. leg.
19.06.1957, 0/1 NOW. leg.
05.06.1958, 1/0 NOW. leg.
05.08.1958, 0/1 NOW. leg.
20.06.1960, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal
19.05.1948, 1/0 NOW. leg.
15.06.1949, 0/2 NOW. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 06.09.1932, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelshheim, Leibenstadt,
27.07.1935, 1/0 an *Cirsium*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
19.08.1935, 0/2 an *Betula*, BAL. leg.
27.08.1937, 0/1 an *Eupatorium cannab.*, BAL. leg.
31.08.1949, 0/1 an Hasel, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 08.07.1940, 0/1 an Linde, BAL. leg.
- Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758)
- Die Belege von Meess (1907) waren nicht auffindbar.
- NV17SO MOS, Mosbach, Rittersbach, 08.08.1940, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel
08.08.1940, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg.
08.08.1941, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg.
- Chlorochroa pinicola* (Mulsant & Rey, 1852)
- Auch hier waren die Belege von Meess (1907) nicht mehr auffindbar.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 14.06.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV53SO KA, Karlsruhe, Wildpark
12.10.1920, 1 Ex. LEININGER leg.
17.03.1923, 0/2 LEININGER leg.
- Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 19.06.1931, 0/2 LEININGER leg.
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R.
23.06.1929, 0/4 LEININGER leg.
10.07.1933, 2/1 LEININGER leg.
- LU92SW FR, Breisach, 06.06.1925, 0/1 LEININGER leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
EM, Emmendingen, Endingen, Sasbach, Aug. 1924, 0/2 FRENTZEN leg.
- MT59NO WT, Bonndorf, Wutachgeb., 21.08.1938, 1/0 LEININGER leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Juni 1941, 1/0 BECKER leg.
- MT69NW VS, Blumberg, Achdorf, Aug. 1924, 0/1 LEININGER leg.
- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 2/2 LEININGER leg.
- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Tiengen, 04.06.1927, 0/1 LEININGER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 3/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, 20.08.1924, 0/1 LEININGER leg.
- MU40SW FR, Titisee-Neustadt, Lenzkirch, 03.08.1934, 1/0 STRITT leg.
- MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“, Aug. 1926, 1/1 BECKER leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Aeselfingen, 15.08.1938, 5/1 FRENTZEN leg.
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 2/2 LEININGER leg.

- MU80SW KN, Engen
11.06.1928, 2/1 LEININGER leg.
07.08.1928, 2/2 LEININGER leg.
- MV30NO RA, Rastatt, Iffezheim, 13.07.1934, 0/1
BECKER leg.
- MV40SW BAD, Baden-Baden („Ba.“), 23.06.1886,
2/0 an *Verbascum*, coll. FISCHER.
28.06.1886, 3/1 an *Verbasc.* u. *Scrophu-
lo.*, coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, Aug. 1933, 5/3 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheiben-
berg
09.07.1958, 1/0 NOW. leg.
01.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 1/1
NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
05.09.1899, 2/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
11.09.1922, 1/0 LEININGER leg.
02.08.1923, 1/0 LEININGER leg.
04.10.1927, 0/1 LEININGER leg.
19.04.1934, 1/0 STRITT leg.
05.08.1959, 0/1 KORMANN leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 21.06.1934,
1/0 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Daxlanden, 25.06.1987,
0/2 KUSSMAUL leg.
KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
21.09.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut, 15.08.1934, 1/0
BECKER leg.
- MV62NO KA, Karlsruhe, Durlach, Berghausen,
06.07.1942, 1/0 KES. leg.
KA, Pfinztal, Lehmgrube Eder,
24.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach
04.09.1898, 2/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
11.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
07.07.1934, 1/0 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
20.05.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
KA, Karlsruhe, Durlach, Rittnert,
13.05.1885, 0/3? leg., coll. FISCHER.
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
11.09.1910, 1/0 coll. FISCHER (Meess,
1900).
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
05.10.1927, 0/1 LEININGER leg.
Aug. 1935, 0/1 BECKER leg.
29.08.1951, 0/1 NOW. leg.
KA, Untergrombach, Michaelsberg,
"Grund", 26.05.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
KA, Untergrombach, Habichtsbuckel u.
Weihertal, 07.05.1988, 0/1 KUSSMAUL
leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee
04.06.1948, 1/0 NOW. leg.
04.08.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 1/2
HASSLER leg.
KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen
22.05.1958, 1/0 KORMANN leg.
17.08.1958, 1/0 KORMANN leg.
30.08.1958, 1/0 KORMANN leg.
07.05.1959, 1/0 KORMANN leg.
02.04.1960, 0/1 KORMANN leg.
KA, Karlsruhe, Weingarten
Mai 1921, 0/1 LEININGER leg.
Juni 1931, 0/1 LEININGER leg.
Juli 1934, 1/0 LEININGER leg.
05.06.1959, 1/0 KORMANN leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 1/0 coll. MÜLLER.
- MV74NO KA, Bruchsal, Ubstadt, Zeutern,
01.10.1988, 1/0 HASSLER leg.
- MV74SW KA, Bruchsal, 27.06.1988, 1/0 HASSLER
leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
22.07.1930, 0/1 BECKER leg.
- MV81NW PF, Pforzheim, Niefern, 19.08.1933, 1/0
LEININGER leg.
- MV83NW KA, Bretten, Gochsheim, Aug. 1935, 0/12
BECKER leg.
- MV94SO HN, Heilbronn, Eppingen, 23.08.1934, 1/0
BECKER leg.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee,
04.06.1928, 1/2 LEININGER leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Hegne, 29.07.1930, 0/1
LEININGER leg.
KN, Konstanz, Wollmatinger Ried,
31.07.1930, 0/3 LEININGER leg.
- NT09SO FN, Überlingen a. B., Hödingen
10.08.1926, 1/0 LEININGER leg.
25.08.1926, 1/0 LEININGER leg.
- NT18SW KN, Konstanz, Wollmatingen, 10.08.1928,
0/1 LEININGER leg.
KN, Konstanz
01.06.1928, 1/0 LEININGER leg.
01.06.1929, 0/1 LEININGER leg.
- NT28SO FN, Meersburg, Hagnau, 10.08.1926, 1/1
LEININGER leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmehausen,
Aug. 1929, 0/1 FRENTZEN leg.
- NU07SW Tü, Tübingen, Spitzberg, 27.05.1982, 1/0
Wik. leg.
- NU51NO BC, Oberessendorf, Wildes Ried,
07.08.1980, 0/1 FREY leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Hohenstein, Wacholder-
weide, 10.09.1988, 0/2 KUSSMAUL leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
19.05.1948, 1/2 NOW. leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelsheim, Neckar-
mühlbach, 17.06.1929, 0/1 LEININGER
leg.
- NV06SO MOS, Mosbach, Neckarzimmern,
27.05.1926, 1/1 LEININGER leg.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1849)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, Aug. 1926, 0/1 FRENTZEN leg.
- MT19NW FR, Freiburg, Staufen, Belchen, 1925, 0/1 ZIMBER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg
04.09.1922, 2/2 LEININGER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch,
25.08.1923, 1/1 LEININGER leg.
- MV40NW BAD, Rastatt, Sandweier, Aug. 1935, 0/2 BECKER leg.
- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg
09.07.1958, 1/0 NOW. leg.
01.09.1987, 0/1 KUSSMAUL leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 1/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
Okt. 1920, 0/1 LEININGER leg.
08.04.1925, 1/0 LEININGER leg.
30.08.1927, 1/0 BECKER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, Okt. 1950, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 27.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 30.08.1906, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 09.05.1923, 1/0 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
01.08.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg,
14.09.1909, 0/1 coll. FISCHER.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
16.08.1922, 1/0 LEININGER leg.
11.04.1951, 0/1 NOW. leg.
02.09.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee
09.06.1948, 1/0 NOW. leg.
04.08.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
24.07.1928, 1/0 LEININGER leg.
20.07.1929, 0/1 LEININGER leg.
25.08.1930, 5/1 BECKER leg.

Carpocoris pudicus (Poda, 1761)

Seltene Art von der aus Württemberg nur ein einziger Fundort bekannt ist: das Lautertal bei Ulm (Rieger, 1972) - die Art ist dort jedoch regelmäßig anzutreffen. In Baden nur von Sandäckern bei Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993) bekannt. Die Angabe in Handke & Schreiber (1985) möchte ich anzweifeln, da in der Artenliste nur *C. pudicus* Pd. und kein Exemplar von

C. purpureipennis De G. auftaucht. Frühere Meldungen sind unzuverlässig, da bei beiden Arten nur die Männchen sicher zu unterscheiden sind (Tamanini, 1958), vom gleichen Fundort lassen sich auch die Weibchen im Vergleich abgrenzen.

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Mai 1939, 1/1 BECKER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/1 coll. FISCHER.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 1/1 coll. FISCHER.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 2/1 KUSSMAUL leg.

Anthemina lunulata (Goeze, 1778)

Seltene xerothermophile Art deren Verbreitungsschwerpunkt im Mittelrheingebiet liegt und in den Oberrhein ausstrahlt. Weitere Fundorte sind Tübingen (Fischer, 1970), Karlsruhe und Mannheim (Meess, 1907). Auch hier sind die Meess'schen Belege nicht auffindbar.


- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne
28.07.1929, 1/0 LEININGER leg.
15.09.1947, 0/2 NOW. leg.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein, 03.08.1899, 1/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R.
23.06.1929, 0/1 LEININGER leg.
23.06.1929, 0/1 LEININGER leg.
- LU92SO FR, Breisach, Ihringen, 02.06.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, Aug. 1926, 3/0 FRENTZEN leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
Aug. 1928, 1/1 BECKER leg.
Aug. 1940, 0/2 BECKER leg.
- MT69NO VS, Blumberg, 30.06.1934, 0/1 STRITT leg.
- MU01NW FR, Breisach, Tuniberg, Wolkental,
07.06.1922, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, 20.08.1934, 0/2 LEININGER leg.
- MU13NW EM, Emmendingen, Malterdingen,
08.05.1923, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh.
01.07.1939, 0/1 BAL. leg.
03.06.1941, 0/1 HEDERICH leg., coll. BAL.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Aug. 1924, 1 Ex. FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern
01.05.1931, 0/1 an *Betula virescens*, BAL. leg.
10.05.1932, 0/1 an Esche, BAL. leg.

- MU38NW OG, Oberachern, Bienenbuckel, 18.05.1931, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU49SO RA, "Herrw." (vermutlich Herrenwies), 22.09.1886, 0/1 coll. FISCHER.
- MU60SW VS, Blumberg, Achdorf, Eichberg, Aug. 1924, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“, Aug. 1928, 3/0 BECKER leg.
- MU69NW CW, Wildbad, Wildseemoor, 16.06.1886, 0/1 WALLNER leg.
- MU70NW TUT, Tuttlingen, Geisingen, 03.08.1928, 1/2 LEININGER leg.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 2/0 LEININGER leg.
- MV40SW BAD, Baden-Baden („Ba.“), 18.06.1886, 1/0 an *Verbascum*, ? leg., coll. FISCHER 23.06.1886, 1/0 an *Verbascum*, ? leg., coll. FISCHER 25.05.1887, 1/0 an „*Euphor*.“? leg., coll. FISCHER
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 20.06.1928, 0/1 BECKER leg.
- MV42SW RA, Karlsruhe, Au am Rhein, 09.05.1925, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 19.09.1925, 0/1 LEININGER leg.
- MV51NW KA, Rastatt, Malsch, Sulzbach, 18.08.1883, 1/0? leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 1924, 1/1? leg. 19.07.1925, 1/1 LEININGER leg. 20.04.1960, 2/1 KORMANN leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden 13.05.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). 25.06.1987, 2/0 KUSSMAUL leg. KA, Karlsruhe, Rheinhafen, 09.08.1921, 0/1 LEININGER leg. KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 10.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 23.08.1950, 1/0 NOW. leg. 06.09.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 25.09.1898, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach 04.09.1898, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900). 19.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg. KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen 04.05.1906, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). KA, Karlsruhe, Durlach, Turmberg, 14.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, 05.10.1927, 0/1 HOHNDORF leg. KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg 10.10.1921, 0/1 LEININGER leg. 05.10.1927, 0/1 LEININGER leg.
- MV63SO KA, Bruchsal, Todtschlag, 22.07.1988, 0/1 HASSLER leg. KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen 18.05.1924, 2/0 LEININGER leg. 02.04.1960, 1/0 KORMANN leg. KA, Karlsruhe, Weingarten, 14.06.1930, 0/1 LEININGER leg.
- MV64SW KA, Karlsruhe, Graben 22.04.1885, 1/0? leg. 18.06.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 0/1 coll. MÜLLER.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1953, 0/1 NOW. leg.
- NA40SW TBB, Wertheim, Apfelberg, 13.07.1927, 1/0 LEININGER leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen, Aug. 1929, 0/1 FRENTZEN leg.
- NU07NO TÜ, Tübingen, Schachbaumwiesen, 14.05.1981, 1/0 WESTRICH leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 1/1 KUSSMAUL leg.
- NV05NO MOS, Mosbach, Gundelshheim, Neckarmühlbach, 17.06.1929, 1/1 LEININGER leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 09.08.1941, 1/0 BAL. leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach, 19.08.1941, 1/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt 05.08.1949, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg. 14.10.1949, 1/0 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 14.08.1937, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg. 25.08.1941, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg. 01.08.1949, 1/0 an *Betula*, BAL. leg. 22.08.1949, 1 Ex. an Hasel, BAL. leg. 25.08.1949, 0/1 an *Daucus*, BAL. leg. 05.04.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 30.08.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg. 05.09.1950, 0/1 an *Urtica*, BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim 18.04.1940, 1/0 in Bodenstreu, BAL. leg. 05.07.1940, 0/1 an *Galium*, BAL. leg.
- Eurydema dominulum* (Scopoli, 1763)
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht Juni 1931, 0/1 KNEUCKER leg. 11.08.1934, 0/1 STRITT leg. Juni 1941, 0/1 BECKER leg.
- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 0/1 LEININGER leg.

- MU12NO EM, Denzlingen, Buchholz, 16.06.1932, 0/1 LEININGER leg.
- MU20SO FR, Todtnau, Feldberg, Juni 1952, 1/1 NOW. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch April 1920, 2/1 FRENTZEN leg. Aug. 1922, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU27NW OG, Offenburg, Appenweier, 01.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern, 08.10.1931, 1/0 an Fichte, BAL. leg. OG, Oberachern, Bienenbuckel, 09.09.1933, 1/0 an Tanne, BAL. leg.
- MU38SO OG, Achern, Kappelrodeck, Brandmatt, 18.09.1933, 1 Ex. an Fichte, BAL. leg.
- MU40SW FR, Titisee-Neustadt, Lenzkirch, 06.08.1934, 1/0 STRITT leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach Aug. 1899, 2/2 coll. FISCHER. 16.07.1900, 1/3 coll. FISCHER. 16.09.1902, 1/0 coll. FISCHER.
- MU58SO FDS, Freudenstadt, Huzenbach, 12.06.1965, 0/1 NOW. leg.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV40SW BAD, Baden-Baden ("Ba."), 03.04.1886, 0/1 an 4j. Ki., ? leg., coll. FISCHER.
- MV50SO RA, Gernsbach, Teufelsmühle, Juni 1952, 0/1 NOW. leg.
- MV50SW RA, Gernsbach/Murgtal, 29.04.1934, 0/1 BECKER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell 28.08.1953, 0/1 NOW. leg. Aug. 1954, 0/2 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Marxzell, Moosalbtal 17.05.1921, 2/2 LEININGER leg. 21.05.1921, 0/1 LEININGER leg. 15.08.1934, 1/0 LEININGER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 01.06.1947, 0/1 NOW. leg. 23.06.1954, 0/1 NOW. leg.
- MV61NW KA, Karlsruhe, Waldbronn, Albtal, 17.04.1901, 1/0 coll. FISCHER.
- MV63SW KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener Moor, 01.06.1955, 1/0 NOW. leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 0/2 coll. MÜLLER.
- NT08NW KN, Radolfzell, Möggingen, Mindelsee, 11.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- NT18SO KN, Konstanz, Staad, 06.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- Eurydema oleraceum* (Linnaeus, 1758)
- LT87NO LÖ, Lörrach, Istein 03.08.1899, 3/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). 07.08.1919, 1/0 FRENTZEN leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht 11.08.1934, 1/0 STRITT leg. Juni 1941, 0/1 BECKER leg. Aug. 1941, 0/1 BECKER leg.
- MT89 KN, Singen, Hegau, 14.08.1935, 2/3 LEININGER leg.
- MU26NW OG, Offenburg, Ortenberg, 21.10.1938, 0/1 unter Ginster, BAL. leg.
- MU29SW OG, Achern, Rheinau 26.06.1934, 0/1 BAL. leg. 30.06.1934, 1/0 BAL. leg.
- MU38NW OG, Achern 11.06.1931, 2/1 auf Wiese, BAL. leg. 18.08.1933, 1/1 BAL. leg. 18.08.1935, 1/0 BAL. leg. OG, Achern, Oberachern, Rebgelände, 25.06.1923, 1/1 an Brombeere, BAL. leg. OG, Oberachern, Bienenbuckel, 04.10.1933, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 1/1 coll. FISCHER.
- MU55SW FDS, Alpirsbach, Wittichen, 20.06.1925, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU80SW KN, Engen, 07.08.1928, 2/3 LEININGER leg.
- MV41SW RA, Rastatt 23.06.1931, 0/1 LEININGER leg. Aug. 1933, 1/1 BECKER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau 03.09.1928, 1/0 LEININGER leg. 20.10.1948, 0/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park 05.09.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). 05.07.1916, 0/1 KNEUCKER leg. 08.05.1922, 1/2 LEININGER leg. Juli 1925, 1/0 LEININGER leg. 03.05.1927, 0/1 LEININGER leg. 13.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg. 19.06.1950, 2/0 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden 13.05.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). 09.09.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900). 17.07.1952, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald 08.05.1925, 2/4 (1/1 in copula) BECKER leg. 20.08.1925, 0/1 BECKER leg. 20.08.1936, 4/1 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 01.08.1948, 1/0 NOW. leg. 22.04.1949, 1/0 (f. *annulata*) NOW. leg. 24.04.1949, 0/1 NOW. leg. 23.09.1953, 0/1 NOW. leg. 20.10.1955, 0/1 NOW. leg.
- MV52SW KA, Karlsruhe, Hardtwald, 03.06.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).



MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein
12.08.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
29.05.1922, 1/0 LEININGER leg.
KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
14.08.1927, 1/0 BECKER leg.

MV53SW KA, Karlsruhe, Neureut
25.07.1897, 0/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
01.05.1898, 1/1 coll. FISCHER (Meess,
1900).
30.06.1928, 1/0 BECKER leg.

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach
15.09.1927, 0/1 LEININGER leg.
02.05.1937, 2/2 STRITT leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen
09.05.1922, 0/1 LEININGER leg.

27.05.1922, 1/0 LEININGER leg.
21.05.1934, 0/1 STRITT leg.

MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, Wolfartsweier,
06.05.1922, 1/0 FRENTZEN leg.

MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaels-
berg
Aug. 1935, 0/1 BECKER leg.
04.08.1949, 1/1 (f. *atava*) NOW. leg.
13.08.1949, 1/0 NOW. leg.
01.04.1953, 1/0 NOW. leg.

MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen,
10.05.1964, 1/0 KORMANN leg.

MV63SW KA, Karlsruhe, Weingarten, Weingartener
Moor, 22.04.1953, 4/1 NOW. leg.

MV64SW KA, Karlsruhe, Graben, 18.06.1899, 0/1
coll. FISCHER (Meess, 1900).

- MV66NO HD, Schwetzingen, Oftersheim, 08.07.1953, 0/1 LEININGER leg.
- MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 2/1 coll. MÜLLER.
- MV72SW PF, Pforzheim, Remchingen, Königsbach, 11.09.1916, 0/1 KNEUCKER leg.
- NT08SO KN, Konstanz, Wollmatinger Ried, 28.07.1930, 0/1 LEININGER leg.
- NT18SW KN, Konstanz, Wollmatingen 06.06.1928, 0/1 LEININGER leg. 10.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
- NT29SW FN, Überlingen a. B., Mimmenhausen Aug. 1927, 0/1 FRENTZEN leg. Aug. 1928, 0/1 FRENTZEN leg. Aug. 1929, 2/0 FRENTZEN leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal 15.06.1942, 1/0 NOW. leg. 19.05.1948, 0/1 NOW. leg. 15.06.1949, 1/0 NOW. leg.
- NV16NO MOS, Mosbach, Katzental, 06.08.1931, 1/0 BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel, 20.07.1934, 0/1 auf Ackerboden, BAL. leg.
- NV28NW MOS, Buchen, Hainstadt, 04.09.1933, 0/1 an Zwetschgenbaum, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach, 27.03.1934, 2/0 an Kiefernrandmoos, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt, 12.10.1949, 1/0 an *Prunus spinosa*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 19.08.1930, 0/1 an *Artemisia*, BAL. leg. 05.08.1931, 0/1 an *Cirsium*, BAL. leg. 09.08.1935, 0/1 auf Wiese, BAL. leg. 26.08.1937, 3/0 an *Corylus*, BAL. leg. 10.06.1949, 0/1 auf Wiese, BAL. leg. 15.06.1949, 1/0 auf Wiese, BAL. leg. 19.08.1949, 0/1 an Salat, BAL. leg. 19.08.1950, 0/2 an *Urtica*, BAL. leg. 18.09.1950, 0/1 BAL. leg.
- NV49NO TBB, Tauberbischofsheim, 02.07.1940, 1/0 an Luzerne, BAL. leg.
- Eurydema ornatum* (Linnaeus, 1758) (Karte 25)
Xerothermophile Art mit Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland im Mittel- und Oberrheingebiet. Neuere Nachweise sind nur Sandhausen (Burghardt & Rieger, 1978) und die Sandäcker bei Waghäusel/Wiesental (Voigt & Rietschel, 1993). Inzwischen läßt sich diese Art auch äußerlich einfach von *E. ventralis* Klt. trennen (Rieger & Bernhardt, 1994).
- LT99NW FR, Müllheim, Neuenburg a. R., 23.06.1929, 1/3 LEININGER leg.
- LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Ruine Limburg, 05.05.1923, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU01NW FR, Freiburg, Tuniberg, Meringden, 05.06.1922, 1/1 LEININGER leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg 04.06.1925, 1/0 LEININGER leg. 22.06.1953, 1/1 NOW. leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 16.09.1953, 1/1 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 11.06.1925, 1/0 LEININGER leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 08.05.1925, 0/1 BECKER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof, 27.04.1947, 0/1 NOW. leg. KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 16.07.1950, 0/1 NOW. leg. 24.08.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen, 11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Grötzingen 01.08.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907). Mai 1953, 2/0 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg 04.08.1949, 1/2 NOW. leg. 13.08.1949, 3/1 NOW. leg. 31.05.1950, 6/3 NOW. leg. 11.04.1951, 1/0 NOW. leg. 29.08.1951, 1/1 NOW. leg. 02.09.1953, 1/3 NOW. leg.
- MV64SW KA, Karlsruhe, Graben, 17.07.1926, 0/1 LEININGER leg.
- MV66SO HD, Hockenheim, Talhaus, 05.08.1953, 0/1 NOW. leg.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 15.06.1949, 0/2 NOW. leg.
- NV06SO MOS, Mosbach, Neckarzimmern, 27.05.1926, 0/1 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten, 13.05.1948, 1/0 HEDERICH leg., coll. BAL.
- Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, 03.06.1950, 1/0 STRITT leg.
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 06.06.1897, 1/0 coll. FISCHER.
- MU10NO FR, Freiburg, Schauinsland, 21.05.1899, 0/1 coll. FISCHER.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/3 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, 20.04.1923, 0/2 FRENTZEN leg.
- MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt 26.08.1933, 0/1 an *Sarothamnus*, BAL. leg. 12.09.1933, 2/0 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, 16.07.1900, 0/1 coll. FISCHER.
- MV41SW RA, Rastatt, 05.08.1933, 0/1 LEININGER leg.

- MV50SW RA, Gaggenau, Hörden, NSG Scheibenberg, 01.09.1987, 1/0 KUSSMAUL leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
Aug. 1930, 0/1 LEININGER leg.
18.09.1939, 1/0 STRITT leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt,
10.05.1922, 0/2 coll. FISCHER (Meess, 1900).
Wald, 28.05.1952, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen
03.03.1946, 1/0 NOW. leg.
Nov. 1946, 0/1 NOW. leg.
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 15.03.1984, 0/1 ROESLER leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
20.05.1904, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62SW KA, Karlsruhe, Durlach, Stupferich
18.03.1984, 2/3 FALKNER leg.
25.03.1984, 1/5 FALKNER leg.
01.04.1984, 16/17 FALKNER leg.
04.04.1984, 4/12 FALKNER leg.
15.04.1984, 5/19 FALKNER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
20.06.1950, 0/1 NOW. leg.
12.10.1950, 1/0 NOW. leg.
29.08.1951, 1/0 NOW. leg.
20.06.1960, 0/1 NOW. leg.
- MV76SO HD, Sandhausen, Flugsanddüne,
05.07.1937, 0/1 LEININGER leg.
- NU66NO UL, Kl. Lautertal, Riedelhalde, Xerobrometum, 10.09.1988, 1/0 KUSSMAUL leg.
- Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)
- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 10.06.1933, 0/1 BECKER leg.
- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Juni 1920, 1/0 FRENTZEN leg.
- MU38NW OG, Achern, Oberachern
12.05.1931, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
01.10.1931, 1/0 an Hauswand, BAL. leg.
- MV41SW RA, Rastatt, 16.05.1931, 0/1 LEININGER leg.
- MV42NO KA, Karlsruhe, Forchheim, 08.09.1934, 0/1 LEININGER leg.
- MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, 20.10.1948, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Bulach, Beierteimer Wäldchen, 07.03.1951, 1/0 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, City, Park
04.04.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
20.10.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
29.10.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
04.06.1923, 1/0 LEININGER leg.
13.04.1928, 0/1 BECKER leg.
10.05.1928, 0/1 BECKER leg.
- 24.09.1962, 0/1 NOW. leg.
29.09.1962, 0/1 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibhardt, Wald
04.04.1951, 0/1 NOW. leg.
19.09.1951, 0/2 NOW. leg.
28.05.1952, 2/0 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, 01.06.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV53NO KA, Karlsruhe, Leopoldshafen,
11.08.1927, 0/1 BECKER leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 15.03.1984, 0/1 ROESLER leg.
KA, Karlsruhe, Durlach, Grötzingen,
20.05.1904, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MV62SW KA, Karlsruhe, Durlach, Stupferich
18.03.1984, 2/3 FALKNER leg.
25.03.1984, 1/5 FALKNER leg.
01.04.1984, 16/17 FALKNER leg.
04.04.1984, 4/12 FALKNER leg.
15.04.1984, 5/19 FALKNER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
29.08.1951, 1/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 30.03.1949, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen
18.09.1959, 0/1 KORMANN leg.
28.09.1959, 3/0 KORMANN leg.
28.03.1960, 0/1 KORMANN leg.
02.04.1960, 1/0 KORMANN leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 06.05.1957, 1/0 NOW. leg.
- NA31SO TBB, Wertheim, 02.07.1899, 1/0 coll. FISCHER.
- NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal,
15.06.1949, 0/1 NOW. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
07.03.1950, 1/0 in Zimmer, BAL. leg.
16.03.1950, 0/1 in Zimmer, BAL. leg.
18.09.1950, 1/0 BAL. leg.
- Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)
- MT19NW FR, Freiburg, Staufen, Belchen, 1928, 0/1 ZIMMER leg.
- MT29NO WT, Todtnau, Bernau, 09.08.1934, 1/0 STRITT leg.
- MT39SO WT, St. Blasien, Schwarzatal, 28.08.1934, 1/0 STRITT leg.
- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht
01.08.1928, 0/1 LEININGER leg.
11.08.1934, 0/1 STRITT leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh., 17.09.1941, 0/1 an *Salix*, BAL. leg.
- MU22NW EM, Emmendingen, Waldkirch, Aug. 1922, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU46NO FDS, Freudenstadt, Kniebis, 12.07.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU46NW OG, Oppenau, Bad Griesbach, Aug. 1899, 2/0 coll. FISCHER.

- MU47NW OG, Oberkirch, Allerheiligen, 20.07.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU59SW RA, Gernsbach, Forbach, 08.07.1900, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- MU61 VS, Donaueschingen, „Aus der Baar“, Aug. 1928, 1/2 BECKER leg.
- MU69NW VS, Blumberg, Aselfingen, Aug. 1938, 0/1 FRENTZEN leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park
15.09.1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
Sep. 1932, 1/0 LEININGER leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Seehof,
04.07.1947, 0/1 NOW. leg.
KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald,
23.07.1952, 2/2 NOW. leg.
- MV54NO KA, Karlsruhe, Rußheim, 17.07.1986, 1/0 WALLNER leg.
- MV61NW KA, Karlsbad, Langensteinbach,
02.09.1916, 0/1 an *Angelica*, KNEUCKER leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach,
30.09.1953, 0/1 NOW. leg.
- MV63NW KA, Karlsruhe, Friedrichstal, 11.07.1922, 1/0 LEININGER leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen,
17.10.1962, 0/1 KORMANN leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/2 NOW. leg.
- NT28SO FN, Meersburg, Hagnau, 13.08.1926, 3/0 LEININGER leg.
- NV07NO MOS, Eberbach, Strümpfelbrunn,
30.07.1938, 1/0 *Rhamnus*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
06.08.1936, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.
08.08.1936, 3/3 an *Corylus*, BAL. leg.
25.08.1938, 0/1 an Kartoffelblatt, BAL. leg.
02.08.1939, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
01.08.1940, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
07.08.1940, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
17.08.1941, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
29.08.1948, 1/0 an Hasel, BAL. leg.
22.08.1949, 1/0 an *Alnus*, BAL. leg.
- Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1787)
Sehr seltene Art von der in Württemberg zwei Fundorte bekannt sind: neueren Datums der Tübinger Spitzberg und um 1900 bei Weinsberg (Schwoerbel, 1966), aus Baden gibt Meess (1907) 2 Fundorte bei Karlsruhe bekannt, Hüber (1891-93) erwähnt noch Badenweiler als Fundort.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Ettlingen, Nov. 1946, 0/1 NOW. leg.
- Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)
MU38NW OG, Achern
12.08.1931, 2/0 BAL. leg.
12.08.1931, 1/0 im Salicetum, BAL. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Knielingen, 29.08.1927, 0/1 HOHNDORF leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg, 17.04.1956, 1/0 NOW. leg.
- MV78NO HD, Weinheim/B., 27.08.1952, 0/1 NOW. leg.
- NU42NW BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Moosburg, 08.08.1980, 0/1 FREY leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach
26.07.1941, 2/2 an *Juniperus*, BAL. leg.
19.08.1941, 0/3 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV36NW MOS, Adelsheim, Leibenstadt
05.08.1949, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.
08.08.1949, 0/1 an *Betula*, BAL. leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
07.08.1935, 0/1 an Kiefernmoos, BAL. leg.
13.08.1935, 0/1 an *Ononis*, BAL. leg.
01.08.1939, 0/1 an *Juncus*, BAL. leg.
- NV59SW TBB, Lauda, Galgenberg, 19.09.1980, 2/2 an *Dasychira sel.*, EBERT: Belegphotos.
- Troilus luridus* (Fabricius, 1775)
MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, Aug. 1940, 0/1 BECKER leg.
- MU38NW OG, Achern, 16.09.1933, 0/1 an Erle, BAL. leg.
- MU38SO OG, Kappelrodeck, Brandmatt,
12.09.1933, 1/2 an *Sarothamnus*, BAL. leg.
- MU80SW KN, Engen, 10.06.1928, 0/1 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.
- MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald,
29.06.1950, 0/1 NOW. leg.
- MV53SW KA, Karlsruhe, Mühlburg, 02.05.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV61NW KA, Karlsruhe, Waldbronn, Albtal,
17.05.1901, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1907).
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 06.04.1979, 1 Ex.? leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Weingarten, 25.04.1926, 0/1 LEININGER leg.
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
17.08.1940, 1/0 an *Corylus*, BAL. leg.
15.07.1950, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
- Arma custos* (Fabricius, 1794)
LU93SO EM, Emmendingen, Endingen, Sasbach, Aug. 1924, 0/1 FRENTZEN leg.
- MU02SW FR, Breisach, Wasenweiler, 29.08.1933, 2/0 BAL. leg.
- MU18SW OG, Kehl a. Rh.,
28.10.1937, 1/1 an Hauswand, BAL. leg.
04.11.1937, 2/0 an Hauswand, BAL. leg.
- MU28SW OG, Kehl a. R., Legelshurst, 09.04.1937, 1/0 an *Salix caprea*, BAL. leg.

- MU38NW OG, Achern, 16.09.1933, 3/0 an *Alnus*, BAL. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Daxlanden, 09.09.1900, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1907).
 KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 19.09.1951, 0/3 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 06.09.1950, 3/0 NOW. leg.
 MV53NO KA, Karlsruhe, Eggenstein, 12.08.1906, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV63NW KA, Karlsruhe, Stutensee, 12.09.1951, 1/0 NOW. leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 19.08.1935, 1/0 an *Betula*, BAL. leg.
 14.04.1950, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
 06.09.1950, 1/0 an *Galeopsis*, BAL. leg.

Rhacognatus punctatus (Linnaeus, 1758)

Auch von dieser seltenen Art sind im SMNK keine Belegexemplare der Meess'schen Meldungen (Meess, 1907) auffindbar.

- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 18.08.1930, 1/0 LEININGER leg.

Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)

Meess (1907) führt diese seltene xerotherme Art für Neureut an, der Beleg ist im SMNK jedoch nicht auffindbar. Dann erst wieder am Eichberg an der Wutach (Schmid, 1965a) gefunden. In Württemberg 2 Funde bei Ulm in der Sammlung Hüeber um 1900 (Rieger, 1972), später erst bei Salmendingen (Schmid, 1965b) gefunden.

- MU02NW FR, Kaiserstuhl, Badberg, 23.04.1931, 3/0 GREMMINGER leg.

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

- MU11NW FR, Freiburg, 05.08.1899, 0/1 coll. FISCHER (Meess, 1900).
 MV43SO KA, Karlsruhe, Maxau, Aug. 1953, 1/0 NOW. leg.
 MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954 1/1 NOW. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen 23.09.1900 1/1 coll. FISCHER.
 19.03.1952, 1/0 NOW. leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Scheibenhardt, Wald, 28.03.1953, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald 12.02.1948, 1/0 NOW. leg.
 20.08.1952, 1/0 NOW. leg.
 27.07.1955, 1/0 NOW. leg.
 NV01NW LB, Markgröningen, Glemstal, 19.05.1948, 0/1 NOW. leg.

Acanthosomatidae*Acanthosoma haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)

- „Bu.-Mitte“, 13.05.1885, 0/1? leg.
 MU38NW OG, Achern, 19.06.1931, 0/1, BAL. leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 08.07.1923, 0/1 LEININGER leg.
 MV52NW KA, Karlsruhe, Flugplatz, 21.06.1947, 0/1 NOW. leg.
 MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 09.06.1934, 0/1 STRITT leg.
 MV63NO KA, Bruchsal Untergrombach, Michaelsberg 14.06.1934, 0/1 LEININGER leg.
 22.08.1951, 0/1 NOW. leg.
 16.06.1954, 1/1 NOW. leg.
 10.05.1955, 1/0 NOW. leg.
 MV63SO KA, Karlsruhe, Weingarten, 09.06.1930, 1/0 LEININGER leg.
 MV71NO PF, Pforzheim, 1930, 2/0 coll. MÜLLER.
 MV83NO KA, Bretten, Zaisenhausen, 20.05.1934, 1/0 BECKER leg.
 NU42SO BC, Bad Buchau, NSG Federsee, Station, 04.08.1980, 1/0 FREY leg.
 NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten 18.04.1934, 1/0 BAL. leg.
 28.05.1949, 0/1 an *Cornus*, BAL. leg.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, 22.05.1934, 0/1 STRITT leg.
 MT69NO VS, Blumberg, 30.06.1934, 0/1 STRITT leg.
 MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 20.07.1967, 1/0 NOW. leg.
 MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald, 21.11.1956, 0/1 NOW. leg.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

- MT59NW WT, Bonndorf, Wutachschlucht, 22.05.1934, 0/1 STRITT leg.

Elasmucha fieberi Jakovlev, 1864

- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell, Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Das Exemplar aus Heidelberg wurde von Meess (1900) als *E. interstinctus* L. gemeldet.

- MU38NW OG, Achern, 19.05.1926, 0/1 BAL. leg.
 OG, Achern, Oberachern 24.04.1931, 1/0 an *Prunus padus*, BAL. leg.
 02.10.1931, 1/0 an Tanne, BAL. leg.
 25.04.1932, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
 OG, Oberachern, Bienenbuckel, 13.09.1933, 1/0 an *Quercus*, BAL. leg.

- MV41SW RA, Rastatt, 16.05.1936, 0/1 LEININGER leg.
- MV51SO KA, Karlsruhe, Marxzell
Aug. 1951, 0/1 NOW. leg.
Aug. 1954, 0/1 NOW. leg.
25.05.1955, 0/1 NOW. leg.
26.10.1955, 1/0 NOW. leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, City, Park, 27.07.1969, 0/1 NOW. leg.
- MV52SO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Wald
04.07.1948, 0/1 NOW. leg.
11.06.1949, 0/3 NOW. leg.
10.08.1951, 0/1 NOW. leg.
02.07.1952, 10/7 NOW. leg.
- MV63NO KA, Bruchsal, Untergrombach, Michaelsberg
29.08.1951, 1/0 NOW. leg.
12.03.1952, 1/0 NOW. leg.
- MV63SO KA, Karlsruhe, Walzbachtal, Jöhlingen,
28.08.1927, 1/0 HOHNDORF leg.
- MV77SO HD, Heidelberg, City, Juni 1899, 1/0 coll. FISCHER (Meess, 1900).
- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten
09.08.1933, 0/1 an *Sambucus*, BAL. leg.
18.04.1934, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
25.04.1934, 1/0 an *Buche*, BAL. leg.
23.07.1935, 0/1 an *Corylus*, BAL. leg.
25.08.1941, 0/1 an *Pinus*, BAL. leg.
14.07.1950, 1/1 an *Corylus*, BAL. leg.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

- MU29SW OG, Achern, Rheinau, 28.05.1934, 1/0 an *Pinus*, BAL. leg.
- MU38SO OG, Achern, Kappelrodeck, Brandmatt,
18.09.1933, 2/2 BAL. leg.
- MV50SW RA, Gernsbach/Murgtal, 20.04.1934, 0/1 BECKER leg.
- MV52NO KA, Karlsruhe, Rüppurr, Höhen,
27.10.1951, 0/1 NOW. leg.
- MV62NW KA, Karlsruhe, Durlach, 01.12.1960, 1/0 AMSEL leg.
- NV27NO MOS, Osterburken, Hemsbach
26.07.1934, 3/0 an *Juniperus*, BAL. leg.
30.08.1939, 2/3 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV27SW MOS, Oberschefflenz, Ginsterhügel,
26.07.1934, 0/1 an *Juniperus*, BAL. leg.
- NV36NO KÜN, Schöntal, Oberkessach,
23.08.1935, 1/0 an *Juniperus*, BAL. leg.

Unklare Arten

Carpocoris melanocerus Mulsant, 1852

Von dieser Art meldet Voigt (1977c) ein Exemplar vom Feldberg aus der Coll. Nowotny mit Beleg im SMNK. Von *Carpocoris* existiert im SMNK jedoch kein einziges Exemplar von diesem Fundort, ebenso kein Exemplar von *C. melanocerus* Muls. Das Exemplar war vorhanden und richtig determiniert (C. Rieger, persönl. Mitteilung). Wahrscheinlich beruht die Erwähnung des Vorkommens dieser Art im Schwarzwald (Wagner, 1966) auf diesem Exemplar, welches sich dann evtl. in der Coll. Wagner befindet.

Bei den beiden folgenden Arten handelt es sich eventuell um Fundortverwechslungen. Dem widerspricht aber, daß sich in der Sammlung Balles in obiger Artenliste einige andere Arten mit gleichem Fundort und Datum und der gleichen Bezettelung befinden. In der gesamten Coll. Balles befindet sich kein einziges Tier mit der Beschriftung „Balles leg.“ außerhalb Deutschlands. Fast alle Funde außerhalb Deutschlands in der Coll. Balles stammen von Singer und sind vollständig original bezettelt.

Das einzige Argument für eine Fundortverwechslung wäre, daß die meisten Singer'schen Funde der Coll. Balles aus Ungarn stammen.

Ich möchte beide Arten mit größter Vorsicht erwähnen und weitere faunistische Untersuchungen sollten abgewartet werden, da mir eine Fundortverwechslung trotz aller Argumente als die vernünftigste Erklärung erscheint.

Conostethus hungaricus E. Wagner, 1941

Matocq (1991) synonymisiert 2 *Conostethus*-Arten, bestätigt aber *C. hungaricus* E. Wgn. als „gute Art“ Das vorliegende Exemplar gleicht exakt Funden vom Neusiedler See, so daß eine Fundortverwechslung die wahrscheinlichste Erklärung ist.

- MV68SW MA, Mannheim, City, 21.06.1934, 0/1 BAL. leg.

Eurygaster schreiberi Montandon, 1885

Für diese eumediterrane Art gibt es in Mitteleuropa keinen Nachweis.

- NV37SW KÜN, Schöntal, Hopfengarten,
25.08.1937, 0/1 am Boden, BAL. leg.

7. Literatur

- ANDERSEN, N. M. (1982): The Semiaquatic Bugs (Hemiptera, Gerromorpha) Phylogeny, Adaptations, Biogeography and Classification. – Entomograph, **3**: 1-455; Klampenborg/Denmark (Scand. Sci. Press.).
- ANDERSEN, N. M. (1990): Phylogeny and taxonomy of water striders, genus *Aquarius* Schellenberg (Insecta, Hemiptera, Gerridae), with a new species from Australia. – Steenstrupia, **16**: 37-81; Copenhagen.
- AUKEMA, B. (1981): A survey of the Dutch species of the subgenus *Hyllopsallus* of *Psallus* (Hemiptera-Heteroptera, Miridae). – Tijdschr. Entomol., **124** (1): 1-25; Amsterdam.
- AUKEMA, B. (1988): *Conostethus venustus* fauna nov. spec. en *C. roseus* weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Miridae). – Entomol. Ber., **48**: 1-7; Amsterdam.
- AUKEMA, B. (1989): Annotated checklist of Hemiptera-Heteroptera of the Netherlands. – Tijdschr. Entomol., **132**: 1-104; Amsterdam.
- AUKEMA, B. & RIEGER, C. eds. (1995): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 1. – 26+222 S.; Wageningen.
- BERNHARD, K.-G. (1988): Wanzen. – In: Handke, K., ed.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachflächen in Baden-Württemberg. – Arb.-ber. Lehrstuhl Landschaftsökol. Münster, **8**: 163-169; Münster.
- BERNHARDT, K.-G. (1992): Ergänzungen zum Verzeichnis der für die Westfälische Bucht, das Emsland und den Landkreis Osnabrück nachgewiesenen Wanzenarten (Heteroptera). – Osnabrück. naturwiss. Mitt., **18**: 95-102; Osnabrück.
- BILLEN, W. (1985): Die Platanen-Netzwanze *Corytucha ciliata* Say (Hemiptera: Tingidae) nun auch in der Bundesrepublik Deutschland. – Gesunde Pflanzen, **37** (12): 530-531; Berlin.
- BURGHARDT, G. (1977): Faunistisch-ökologische Studien an Heteropteren im Vogelsberg. – Beitr. Naturkde. Osthessen, 12 Suppl.: 1-166; Fulda.
- BURGHARDT, G. & RIEGER, C. (1978): Die Wanzenfauna der Sandhausener Flugsanddünen – unter besonderer Berücksichtigung des NSG „Pferdstriebdüne“ – (Insecta, Heteroptera). – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **47/48**: 393-413; Karlsruhe.
- CARVALHO, J. C. M. & WAGNER, E. (1957): A World Revision of the Genus *Trigonotylus* Fieber (Hemiptera-Heteroptera, Miridae). – Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro, **43**: 121-156; Rio de Janeiro.
- DECKERT, J. (1985): Über *Lygaeus simulans* spec. nov. und *L. equestris* (Linnaeus, 1758), zwei nahe verwandte paläarktische Lygaeinae (Het., Lygaeidae). – Mitt. zool. Mus. Berlin, **61** (2): 273-278; Berlin.
- DRAPOLYUK, I. S. (1993): Review of the capsid bugs of the genus *Lepidargyrus* (Heteroptera: Miridae). – Zool. syst. Rossica, **2**: 107-119; St. Petersburg.
- DUDERSTADT, R. (1974): Untersuchungen zur Wanzenfauna des Isteiner Klotzes. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz, n.F. **11** (2): 147-180; Freiburg.
- EHANNO, B. (1987): Les Hétéroptères Mirides de France II B: Inventaire biogéographique et Atlas. – Mus. Nat. Hist. Natur., Inv. Faune Flore, **42**: 647-1075; Paris.
- ENGEL, H. & WEIDNER, H. (1952): Eine botanisch-zoologische Exkursion in den Kaiserstuhl. – Entomol. Mitt. zool. Staatsinst. Mus. Hamburg, **1**: 1-54; Hamburg.
- FISCHER, H. (1961): Die Tierwelt Schwabens, 1. Teil: Die Wanzen. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **13** (72): 1-32; Augsburg.
- FISCHER, H. (1970): Die Tierwelt Schwabens, 19. Teil: Die Schildwanzen mit Verbreitungsatlas. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **25** (136-137): 3-166; Augsburg.
- GÖLLNER-SCHIEDING, U. (1978): Bemerkungen zu der Gattung *Rhopalus* Schilling einschliesslich *Brachycarenus* Fieber (Heteroptera, Rhopalidae). – Mitt. zool. Mus. Berlin, **54** (2): 313-331; Berlin.
- GÖLLNER-SCHIEDING, U. (1991): Neufunde von Heteropteren für den östlichen Teil Deutschlands (Insecta, Heteroptera: Miridae et Microphysidae). – Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden, **18**: 91-92; Dresden.
- GRIMM, D. (1995): Faunistische und ökologische Untersuchungen an den Ruderwanzen (Corixidae) im Naturschutzgebiet Federsee. – Jh. Ges. Naturkde. Württemberg, 150: 157-189; Stuttgart.
- GÜNTHER, H. (1981): Neue und seltene Wanzenarten (Hemiptera, Heteroptera) im Mittelrheingebiet. – Mainzer naturwiss. Archiv, **19**: 101-112; Mainz.
- GÜNTHER, H. (1987): Die Wanzen (Hemiptera – Heteroptera) des NSG Mainzer Sand. – Mainzer naturwiss. Archiv, **25**: 253-271; Mainz.
- GÜNTHER, H., MUNK, C. & SCHUHMACHER, H. (1987): *Conostethus venustus* Fieber (Heteroptera: Miridae) in Deutschland. – Decheniana, **140**: 94-95; Bonn.
- GÜNTHER, H., RIEGER, C. & BURGHARDT, G. (1982): Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes "Mainzer Sand" und benachbarter Sandgebiete (Insecta: Heteroptera). – Mainzer naturwiss. Archiv, **20**: 1-36; Mainz.
- GÜNTHER, H. & SCHUSTER, G. (1990): Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Heteroptera). – Dtsch. entomol. Zeitschr., n.F. **37**: 361-396; Berlin.

- HANDKE, K. & SCHREIBER, K.-F. (1985): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf unterschiedlich gepflegten Parzellen einer Brachfläche im Taubergebiet. – In: SCHREIBER, K.-F.: Sukzession auf Grünlandbrachen. – Münster. geogr. Arb., **20**: 155-186; Paderborn.
- HECKMANN, R. (1987): Wanzen (Heteroptera). – In: DIENST, M. & JACOBY, H., Jber. Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee, 1987: 38-40; Konstanz.
- HECKMANN, R. (1989): Wanzen (Heteroptera). – In: DIENST, M. & JACOBY, H., Jber. Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee, 1988: 21-26; Konstanz.
- HECKMANN, R. (1990): Wanzen (Heteroptera). – In: DIENST, M. & JACOBY, H., Jber. Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee, 1989: 22-25; Konstanz.
- HECKMANN, R. (1991): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Wanzen (Heteroptera) im "NSG Mindelsee" – Auftragsber. Bezirksstelle Natursch. Landschaftspflege Freiburg: 97 S.; unveröff.
- HECKMANN, R. (1993): Wanzen. – In: JACOBY, H. & KÖRNER, T., Jber. Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee, 1992: 25-29; Konstanz.
- HEISS, E. & PÉRICART, J. (1983): Revision of Palaearctic Piesmatidae (Heteroptera). – Mitt. Münch. entomol. Ges., **73**: 61-171; München.
- HENRY, T. J. & FROESCHNER, R. C. (1988): Catalog of the Heteroptera, or True Bugs of Canada, and the Continental United States. – 958 S.; Leiden, New York, Kopenhagen, Köln.
- HOFFMANN, H.-J. (1990): Zur Ausbreitung der Rhododendronzikade *Graphocephala fennahi* Young (Homoptera, Cicadellidae) in Deutschland, nebst Anmerkungen zu anderen Neueinwanderern bei Wanzen und Zikaden. – Verh. westdt. Entomol. Tag, 1989: 285-301; Düsseldorf.
- HOFFMANN, H.-J. (1992): Zur Wanzenfauna (Hemiptera-Heteroptera) von Köln. – Decheniana, Beiheft 31: 115-164; Bonn.
- HOFMÄNNER, B. (1928): Beiträge zur Kenntnis der thurgauischen Halbflügler (Hemipteren). – Mitt. thurgau. naturforsch. Ges., **27**: 49-64; Frauenfeld.
- HOPP, I. (1984): Die Platanen-Netzwanze *Corytucha ciliata* (Say) nun auch in der Bundesrepublik Deutschland. – Entomol. Zeitschr., **94**: 60-63; Essen.
- HÜEBER, T. (1891): Roser's Württembergische Hemipteren-Fauna. – Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **47**: 149-169; Stuttgart.
- HÜEBER, T. (1891-93): Fauna Germanica. Die Wanzen (Hemiptera heteroptera). Systematisches Verzeichnis der bis jetzt in Deutschland aufgefundenen Wanzen, nebst Angabe ihrer Synonyme, Litteratur und Fundorte. – Jh. Ver. Math. Naturwiss. Ulm, **3-5**: 1-520; Ulm.
- HÜEBER, T. (1894-1914): Synopsis der deutschen Blindwanzen (Hemiptera heteroptera, Fam. Capsidae). – Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ., **50**: 142-169, **52**: 36-74, **54**: 228-302, **55**: 280-365, **56**: 407-469, **57**: 112-188, **58**: 86-148, **59**: 187-226, **62**: 201-262, **63**: 197-256, **64**: 102-186, **65**: 171-240, **66**: 239-309, **67**: 393-479, **68**: 175-236, **69**: 111-199, **70**: 113-168; Stuttgart.
- JANSSON, A. (1986): The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. – Acta entomol. Fennica, **47**: 1-94; Helsinki.
- JOSIFOV, M. (1989): Beitrag zur Taxonomie der europäischen *Pilophorus*-Arten (Insecta, Heteroptera: Miridae). – Reichenbachia, **27** (2): 5-12; Dresden.
- JOSIFOV, M. (1981): Der verkannte *Dichrooscytus valesianus* Fieber, 1861 und der übersehene *Dichrooscytus gustavi* sp. n. aus Mitteleuropa (Het., Miridae). – Reichenbachia, **19** (7): 43-45; Dresden.
- KERZHNER, I. M. (1972): New and little known Heteroptera from Mongolia and adjacent regions of the USSR. I. – Insects of Mongolia, **1**: 349-378; Leningrad.
- KERZHNER, I. M. (1984): New and little known Heteroptera from Mongolia and adjacent regions of the USSR. IV. Miridae. – Insects of Mongolia, **9**: 35-72; Leningrad.
- KLESS, J. (1961): Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz, n.F. **8** (1): 79-152; Freiburg.
- KÖGEL, F. (1983): Neue und seltene Wasserwanzen (Heteroptera: Amphibiocorisae und Hydrocorisae) aus dem nördlichen Oberrheintiefland. – Carolinea, **41**: 101-104; Karlsruhe.
- LAMPERT, K. (1895): Tierreich. – In: Beschreibung des Oberamts Cannstatt: 138; Stuttgart (Kgl. Statist. L.-amt).
- LAMPERT, K. (1897): Das Tierreich, Hemiptera Heteroptera. – In: Beschreibung des Oberamts Ulm: 339-341; Stuttgart (Kgl. Statist. L.-amt).
- LAUTERBORN, R. (1926): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 6 Reihe. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz, n.F. **2**: 3-12; Freiburg.
- LÖDERBUSCH, W. (1984): Wasserkäfer und Wasserwanzen als Besiedler neuangelegter Kleingewässer im Raum Sigmaringen. – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **59/60**: 421-456; Karlsruhe.
- LÖDERBUSCH, W. (1989): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Wasserkäfern und Wasserwanzen in den Naturschutzgebieten Federsee und Wurzacher Ried. – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **64/65**: 323-384; Karlsruhe.
- MANCINI, C. (1963): Emitteri Eterotteri della Liguria. – Ann. Mus. Civ. Storia Natur., **74**: 30-121; Genova.

- MATOCQ, A. (1991): Contribution à l' étude de genre *Conostethus* Fieber, avec la description d' une espèce nouvelle de France (Heteroptera, Miridae). – N. Rev. Entomol., n. s., **8**: 135-148; Toulouse.
- MEESS, A. (1900): Erster Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens. – Mitt. bad. zool. Ver., **2**: 37-43, 56-61, 71-75, 91-94; Karlsruhe.
- MEESS, A. (1907): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens. – Mitt. bad. zool. Ver., **18**: 130-151; Karlsruhe.
- MOULET, P. (1991): Notes, typifications et remarques sur quelques Coreoidea. II. (Hemiptera Heteroptera). – N. Rev. Entomol., n.s., **8**: 407-415; Toulouse.
- MUMINOV, N. N. (1962): *Lepidargyrus* gen.n. (Heteroptera, Miridae) from the south of Middle Asia and Northeastern Iran. – Doklad. Acad. Nauk tadjh. SSR, **5**: 43-47; Stalinabad.
- NOWOTNY, H. (1953): Kleine Mitteilungen, *Dinarda dentata*. – Entomol. Bl., **49**: 120-121; Krefeld.
- OSSIANNILSSON, F. (1953): *Psallus (Hylopsallus) wagneri* n. sp. A new Mirid (Hemipt. Heteropt.) from Sweden. – Opusc. entomol., **18**: 122-123; Lund.
- PÉRICART, J. (1965): Contribution à la faunistique de la Corse: Hétéroptères Miridae et Anthocoridae. – Bull. Soc. Linn., **34** (9): 377-384; Lyon.
- PÉRICART, J. (1972): Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. – Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen, **7**: 402 S.; Paris.
- PÉRICART, J. (1978): Révision systématique des Tingidae ouest-paléarctiques. 5. Contribution à la connaissance du genre *Acalypta* Westwood (Hemiptera). – Ann. Soc. entomol. France, n.s. **14** (4): 683-701; Paris.
- PÉRICART, J. (1983): Hémiptères Tingidae Euro-méditerranéens. – Faune de France, **69**: 618 S.; Paris.
- PÉRICART, J. (1984): Hémiptères Berytidae Euro-méditerranéens. – Faune de France, **70**: 172 S.; Paris.
- PÉRICART, J. (1987): Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb. – Faune de France, **71**: 186 S.; Paris.
- PÉRICART, J. (1990): Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb. Faune de France, **77**: 238 S.; Paris.
- PÉRICART, J. (1994): Les Drymini euro-méditerranéens. Notes systématiques et synonymiques (Heteroptera, Lygaeidae). – Bull. Soc. entomol. France, **99**: 403-418; Paris.
- POISSON, R. (1957): Hétéroptères Aequatiques. – Faune de France, **61**: 263 S.; Paris.
- POLHEMUS, J. T., NIESER, N. & KEFFER, S. L. (1994): Synonymical notes on the *Nepa cinerea* Linnaeus complex (Nepidae: Heteroptera). – Tijdschr. Entomol., **137**: 331-336; Amsterdam.
- PUTSHKOV, P. V. (1982): Unterscheidungsmerkmale der Arten aus der Subapterusgruppe (Heteroptera, Reduviidae). – Vestn. Zool., **14**: 45-50; Kiew.
- REHMANN, W. A. (1830): Hemiptera. – In: Rippoldsau und seine Heilquellen: 295-296; Donaueschingen.
- REIBER, F. & PUTON, A. (1875-76): Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères de l'Alsace et de la Lorraine. – Bull. Soc. Hist. natur. Colmar, **16-17**: 1-40; Colmar.
- REICHLING, L. (1984): Hétéroptères du Grand-Duche de Luxembourg. 1. *Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani* n. sp. (Miridae, Phyllinae) et espèces apparantes. – Trav. Sci. Mus. Hist. Natur. Luxembourg, **3**: 3-18; Luxembourg.
- REICHLING, L. (1994): Notes hétéroptérologiques II. – Bull. Soc. natur. luxemb., **95**: 253-272; Luxembourg.
- REMANE, R. (1955): *Lygus (Exolygus) wagneri* nov. spec., eine weitere europäische Exolygusart. – Zool. Anz., **155** (5-6): 115-119; Leipzig.
- REMANE, R. (1964): Weitere Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Nabis* Latr. (Hem. Het., Nabidae). – Zool. Beitr., n.F. **10**: 253-314; Berlin.
- RIBES, J. & SCHMITZ, G. (1992): Révision du genre *Brachynema* Mulsant & Rey, 1852 Heteroptera, Pentatomidae, Pentatominae. – Bull. Ann. Soc. roy. belge Entomol., **128**: 105-166; Bruxelles.
- RIEGER, C. (1972): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **127**: 120-172; Stuttgart.
- RIEGER, C. (1974): *Notonecta maculata* F., *Notonecta glauca* L. und *Notonecta viridis* Delc. in Baden-Württemberg (Heteroptera, Notonectidae). – Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **42**: 58-65; Ludwigsburg.
- RIEGER, C. (1975): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen). 3 Nachtrag. – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **43**: 161-169; Ludwigsburg.
- RIEGER, C. (1978): Zur Verbreitung von *Trigonotylus coelestialium* (Kirkaldy), 1902 (Heteroptera, Miridae). – Nachr.-bl. bayer. Entomol., **27** (5): 83-90; München.
- RIEGER, C. (1979): Vorschlag für eine Rote Liste der Wanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera). – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **49/50**: 259-269; Karlsruhe.
- RIEGER, C. (1980): Zur Wanzenfauna des LSG "Roter Berg" bei Ludwigsburg-Poppenweiler (Insecta, Heteroptera). – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart, **15**: 1-7; Stuttgart.
- RIEGER, C. (1981a): Ergänzungen zur Faunistik und Biologie einiger Netzwanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera, Tingidae). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **136**: 231-240; Stuttgart.

- RIEGER, C. (1981b): Die Kirschbaumschen Arten der Gattung Psallus (Heteroptera, Miridae). – Nachr.-bl. bayer. Entomol., **30** (5): 92-96; München.
- RIEGER, C. (1985): Zur Systematik und Faunistik der Weichwanzen *Orthops kalmi* K. und *Orthops basalis* Costa (Heteroptera, Miridae). – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **59/60**: 457-465; Karlsruhe.
- RIEGER, C. (1987): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **142**: 277-285; Stuttgart.
- RIEGER, C. (1989a): Die Wanzen der Schopflocher Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung des "NSG Schopflocher Moor" auf der Schwäbischen Alb (Insecta, Heteroptera). – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **64/65**: 385-408; Karlsruhe.
- RIEGER, C. (1989b): Wanzen aus dem Gebiet des Belchen im Südschwarzwald. – In: Der Belchen – Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, **13**: 959-963; Karlsruhe.
- RIEGER, C. (1994): Ein Fund von *Nezara viridula* (Linnaeus 1758) in Süddeutschland (Heteroptera: Pentatomidae). – Entomol. Zeitschr., **104** (24): 469-472; Essen.
- RIEGER, C., BURGHARDT, G. & REMANE, R. (1980): Zoogeographische Erfassung der Heteropteren deutscher Mittelgebirge. – Acta Musei Reginaehradecensis, Ser. A, Suppl.: 81-89; Hradec Králové.
- RIEGER, C. & GÜNTHER, H. (1982): Bemerkungen zur Gattung *Temnostethus* Fieber 1860 in Mitteleuropa (Heteroptera: Anthocoridae). – Caroleina, **40**: 100-101; Karlsruhe.
- RIEGER, C. & STRAUSS, G. (1992): Neunachweise seltener und bisher nicht bekannter Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **147**: 247-263; Stuttgart
- RIEGER, C. & BERNHARDT, K.-G. (1994): *Eurydema ventralis* (Kolenati, 1846) in Deutschland (Heteroptera, Pentatomidae). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **150**: 281-284; Stuttgart.
- ROTH v. SCHRECKENSTEIN, F. v. (1802): Verzeichniss der Halbkaefer, Netzflügler, Wespen, ungeflügelten Insekten, Wanzen und Fliegen, welche um den Ursprung der Donau und des Nekars, dann um den untern Theil des Bodensees, vorkommen. – 67 S.; Tübingen (Cotta).
- ROUBAL, J. (1965): *Chiragra*-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung *Megalonotus* Fieber 1860 aus dem europäischen Festland. – Ein Versuch um die taxonomische Lösung. – Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae, **36**: 555-588; Praha.
- RUDY, H. (1924): *Copium teucryi* Host, eine für das Rheingebiet neue Gallenwanze. – Mitt. bad. entomol. Ver., **1**: 144-145; Freiburg.
- SCHÄFER, H. (1966): Schnabelkerfe. – In: Der Isteiner Klotz – Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, **4**: 339-340; Freiburg.
- SCHAWALLER, W. & SCHMALFUSS, H. (1983): Zur Arthropoden-Fauna des Weinberges "Hoher Spielberg" (Baden-Württemberg, Kreis Ludwigsburg). – Jh. Ges. Naturkde. Württ., **138**: 261-270; Stuttgart.
- SCHMID, G. (1965a): Kleine Nachlese zur Käfer- und Wanzenfauna der Wutachschlucht. – Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **33**: 258-259; Ludwigsburg.
- SCHMID, G. (1965b): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg. – Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **33**: 248-257; Ludwigsburg.
- SCHMID, G. (1967): Wanzen aus Baden-Württemberg. – Veröff. Landesst. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **35**: 89-107; Ludwigsburg.
- SCHMID, G. (1972): Wanzen aus dem LSG "Taubergießen" in Südbaden. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz, n.F. **10** (3): 559-568; Freiburg.
- SCHMID, G. (1979): Wanzen. – In: Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn). Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, **9**: 392-396; Karlsruhe.
- SCHMITZ, G. & PÉRICART, J. (1993): Contribution à une mise en ordre de la nomenclature du genre *Nysius* Dallas (sensu lato) pour la région paléarctique (Hemiptera, Lygaeidae). – N. Rev. Entomol., n.s. **10** (2): 173-186; Paris.
- SCHOOP, A. (1968): Ein Beitrag zur Heteropterenfauna im Nahetal. – Decheniana, **119** (1/2): 39-49; Bonn.
- SCHRECKENSTEIN, F. v.: s. ROTH v. SCHRECKENSTEIN.
- SCHUH, R. T. & STYS, P. (1991): Phylogenetic analysis of cimicomorphan family relationships (Heteroptera). – J. N.Y. entomol. Soc., **99**: 298-350; New York.
- SCHUSTER, G. (1979): Wanzen aus Südbayern. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **34** (166): 1-55; Augsburg.
- SCHUSTER, G. (1981): Wanzenfunde aus Bayern, Württemberg und Nordtirol. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **36** (175): 1-50; Augsburg.
- SCHUSTER, G. (1986): Zur Wanzenfauna Schwabens und der Schwäbischen Alb. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **42** (182): 1-36; Augsburg.
- SCHUSTER, G. (1990): Beitrag zur Wanzenfauna Schwabens (Insecta, Heteroptera). – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg, **50** (192): 1-35; Augsburg.
- SCHWOERBEL, W. (1966): Ökologie und Faunistik der Wanzen und Zikaden auf dem Tübinger Spitzberg. – In: Der Spitzberg bei Tübingen. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, **3**: 759-854; Ludwigsburg.

- SEIDENSTÜCKER, G. (1954): Ein neuer *Brachynotocoris* aus Syrien (Hemiptera Heteroptera: Miridae). – Beitr. Entomol., **4**: 78-84; Berlin.
- SINGER, K. (1952): Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, n.F. **5**: 1-128; Aschaffenburg.
- STICHEL, W. (1925-38): Illustrierte Bestimmungstabellen der Deutschen Wanzen. – 499 S.; Berlin-Hermsdorf (Selbstverlag).
- STICHEL, W. (1955-62): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. – 1-4: 838 S.; Berlin-Hermsdorf (Selbstverlag).
- STRAUSS, G. (1987): Wanzen aus Oberschwaben. – Ber. naturf. Ges. Augsburg, **46** (187): 1-48; Augsburg.
- STROHM, K. (1933): Die Insekten des Kaiserstuhls: Heteroptera, Wanzen. – In: Der Kaiserstuhl: 350-356.; Freiburg (Bad. Landesver. Naturkd. Naturschutz).
- STUKE, J.-H. (1993): Bemerkenswerte Schwebfliegen-Nachweise aus dem Naturkundemuseum Freiburg im Breisgau (Diptera: Syrphidae). – Entomol. Zeitschr., **103** (9): 158-164; Essen.
- TAMANINI, L. (1951): Valore sistematico del *Lygus basalis* Costa e caratteri che lo differenziano dal *L. kalmi* e *L. campestris* L. (Hemipt. Heteropt., Miridae). – Ann. Inst. Mus. Zool. Univ. Napoli, **3** (4): 1-18; Napoli.
- TAMANINI, L. (1955): Gen. *Velia* Lt. – In: STICHEL, W.: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa, **1** (8-10): 125-148; Berlin-Hermsdorf.
- TAMANINI, L. (1958): Revisione del genere *Carpocoris* Klti. – Mem. Mus. Civ. Stor. natur. Verona **6**: 333-388; Verona.
- VOIGT, K. (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden. – Beitr. naturkd. Forsch. Südw.Dtl., **29** (2): 147-150; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1971): Wasserläufer – neu für Baden-Württemberg. – Beitr. naturkd. Forsch. Südw.Dtl., **30** (2): 153-154; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1977a): Wanzen vom NSG "Rußheimer Altrhein" – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **44/45**: 369-373; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1977b): Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Baden-Württemberg, mit einem Erstnachweis für Deutschland. – Beitr. naturkd. Forsch. Südw.Dtl., **36**: 153-158; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1977c): Wanzenfauna des Schwarzwaldes I. – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **46**: 103-111; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1978): Die Wanzen des Rußheimer Altrheingebiets. – In: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ., **10**: 407-444; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1983): Erstnachweis einiger Wanzenarten für Baden-Württemberg (Hemiptera, Heteroptera). – Caroloinea, **41**: 130-131; Karlsruhe.
- VOIGT, K. (1994): Die Wanzen der Sandhausener Dünengebiete. – Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **80**: 153-185; Karlsruhe.
- VOIGT, K. & RIETSCHEL, S. (1993): Zur Wanzenfauna der Sandäcker bei Wiesental/Baden. – Caroloinea, **51**: 112-114; Karlsruhe.
- WACHMANN, E. (1989): Wanzen beobachten – kennenlernen. – 274 S.; Melsungen (Neumann-Neudamm).
- WAGNER, E. (1952a): Blindwanzen oder Miriden. – In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, **41**: 218 S.; Jena (G. Fischer).
- WAGNER, E. (1952b): Die Europäischen Arten der Gattung *Orius* Wff. (Hem. Het. Anthocoridae). – Notul. Entomol., **32**: 22-59; Helsingfors.
- WAGNER, E. (1952c): Die nordwestdeutschen Arten der Gattung *Orius* Wff. (Hem. Het. Anthocoridae). – Faun. Mitt. Norddtl., **1** (2): 1-2; Kiel.
- WAGNER, E. (1954): Ein Beitrag zur Systematik der Gattung *Phytocoris* Fall. – Nachr. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, **42**: 1-44; Aschaffenburg.
- WAGNER, E. (1958): Der *Nysius*-Komplex in der Paläarktis. – Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol., **19** (2): 1-54; Helsingfors.
- WAGNER, E. (1961): Heteroptera – Hemiptera. – In: BROHMER-EHRMANN-ULMER, Tierwelt Mitteleuropas, **4**: 1-173; Leipzig.
- WAGNER, E. (1966): Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. – In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, **54**: 235 S.; Jena (G. Fischer).
- WAGNER, E. (1967): Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. – In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, **55**: 179 S.; Jena (G. Fischer).
- WAGNER, E. (1970-71): Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 1. – Entomol. Abh. Staatl. Mus. Tierkde., **37**, Suppl.: 484 S.; Dresden.
- WAGNER, E. (1973): Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 2. – Entomol. Abh. Staatl. Mus. Tierkde., **39**, Suppl.: 421 S.; Dresden.
- WAGNER, E. (1975): Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 3. – Entomol. Abh. Staatl. Mus. Tierkde., **40**, Suppl. 1: 483 S.; Dresden.
- WAGNER, W. & WAGNER, E. (1938): Hemipterenfunde aus Baden. – Mitt. bad. L.-Ver. Naturkde. Naturschutz, n.F. **3** (27/28): 402-405; Freiburg.

- WAGNER, E. & WEBER, H. (1964): Hétéroptères Miridae. – Faune de France, **67**: 592 S.; Paris.
- WEIDNER, H. (1958): Eine Excursion nach Schwaben. – Entomol. Mitt. zool. Staatsinst. Mus. Hamburg, **1**: 389-432; Hamburg.
- ZEBE, V. (1957): Zur Hemipterenfauna des Mittelrheingebietes I. – Nachr. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, **57**: 75-91; Aschaffenburg.
- ZEBE, V. (1971): Heteropteren im Mittelrheingebiet. – Decheniana, **124** (1): 39-65; Bonn.

Publikationen des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

carolinea, Beihefte

Monografische Arbeiten, Kataloge, Tagungsberichte etc., in unregelmäßiger Folge

5. U. FRANKE: Katalog zur Sammlung limnischer Copepoden von Prof. Dr. F. KIEFER. – 433 S., 2 Abb.; 1989 DM 36,-
6. R. WOLF & F.-G. LINK: Der Füllmenbacher Hofberg – ein Rest historischer Weinberglandschaft im westlichen Stromberg – 84 S., 35 Abb.; 1990 DM 20,-
7. Gesamtverzeichnis der Aufsätze der Publikationsreihen des Naturkundemuseums und des Naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe 1864 – 1993; in Vorbereitung
8. E. FREY & B. HERKNER (Eds.): Artbegriff versus Evolutionstheorie? – 86 S., 3 Abb; 1993 DM 15,-
9. HAVELKA, P.: Auswilderung, Gefangenschaftsvermehrung und Erhaltung bedrohter Tierarten – eine Aufgabe des Naturschutzes. – 64 S., 75 Abb; 1995 DM 20,-
10. HECKMANN, R.: Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). – 146 S., 25 Karten; 1996 DM 25,-

carolinea

setzt mit Band 40 die von 1936 bis 1980 mit 39 Bänden erschienenen "Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland" fort. Jahresbände mit naturkundlichen Arbeiten und Mitteilungen aus dem südwestdeutschen Raum und aus dem Museum am Friedrichsplatz in allgemeinverständlicher Form.

- Band 40: 128 S., 96 Abb.; 1982 DM 43,-
Band 41: 152 S., 96 Abb., 1 Taf.; 1983 DM 48,-
Band 42: 148 S., 67 Abb., 2 Taf.; 1985 DM 48,-
Band 43: 132 S., 105 Abb., 1 Farbtaf.; 1985 DM 48,-
Band 44: 183 S., 109 Abb., 1 Taf., 7 Farbtaf.; 1986 DM 48,-
Band 45: 168 S., 92 Abb., 4 Farbtaf.; 1987 DM 48,-
Band 46: 160 S., 77 Abb.; 1988 DM 48,-
Band 47: 192 S., 135 Abb., 5 Taf. (Beilage), 8 Farbtaf.; 1989 DM 60,-
Band 48: 176 S., 112 Abb., 3 Taf., 2 Farbtaf.; 1990 DM 56,-
Band 49: 172 S., 101 Abb., 8 Farbtaf.; 1991 DM 56,-
Band 50: 208 S., 97 Abb., 5 Farbtaf.; 1992 DM 60,-
Band 51: 160 S., 76 Abb.; 1993 DM 50,-
Band 52: 152 S., 68 Abb., 2 Farbtaf.; 1994 DM 50,-
Band 53: 288 S., 127 Abb., 8 Farbtaf.; 1995 DM 80,-

andrias

unregelmäßig erscheinende Einzelbände zu Themen aus naturkundlichen Forschungsgebieten

1. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 102 S., 37 Abb.; 1981 DM 34,-
 2. Vegetationskunde und Lichenologie. – 64 S., 17 Abb.; 1983 DM 28,-
 3. Morphologie und Taxonomie von Insekten. – 104 S., 172 Abb.; 1983 DM 40,-
 4. Fossilfundstätte Messel. – 171 S., 49 Abb., 17 Taf.; 1985 DM 60,-
 5. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 224 S., 114 Abb.; 1986 DM 65,-
 6. Fossilfundstätte Höwenegg. – 128 S., 96 Abb., 6 Taf., 1 Falttaf.; 1989 DM 56,-
 7. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 172 S., 79 Abb; 1990 DM 52,-
 8. Fossilfundstätte Höwenegg. – 64 S., 30 Abb.; 1991 DM 28,-
 9. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 210 S., 127 Abb.; 1992 DM 60,-
 10. Fossilfundstätte Höwenegg. – in Vorbereitung
 11. Taxonomie und Phylogenie von Nematoden. – 90 S., 24 Abb., 81 Taf.; 1993 DM 52,-
 12. Taxonomie und Phylogenie von Arthropoden. – 94 S., 48 Abb.; 1994 DM 30,-
 13. Taxonomie und Ökologie tropischer Invertebraten. – DM 70,-
224 S., 82 Abb., 16 Farbtaf.; 1994
- Vom Naturalienkabinett zum Naturkundemuseum 1785-1985 – Geschichte der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe; 1985 DM 5,-

Bestellungen an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe, Postfach 6209, D-76042 Karlsruhe.

Zu den angegebenen Preisen wird bei Versand ein Betrag von DM 3,50 für Porto und Verpackung in Rechnung gestellt. Bestellungen unter DM 20,- nur gegen Vorkasse.

Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e. V. erhalten auf die Zeitschriften andrias und carolinea, auf die Beihefte und auf ältere Bände der "Beiträge" einen Rabatt von 30%.